

CENSIMENTO DELLE SPECIE COLONIALI

(Threskiornithidae – Ardeidae – Phalacrocoracidae)

NIDIFICANTI NEL TRIVENETO

(VENETO, PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO, FRIULI-VENEZIA GIULIA)

ANNO 2021



www.birdingveneto.eu



CENSIMENTO DELLE SPECIE COLONIALI NIDIFICANTI NEL TRIVENETO
 (Threskiornithidae – Ardeidae – Phalacrocoracidae)
 ANNO 2021



nome della garzaia			
località e provincia			
coordinate GPS			
tipologia di garzaia			
specie osservata e numero minimo e massimo di coppie censite o stimate	specie	cpp. min/max	grado di certezza
note			
rilevatore/i			

CRITERI minimi di CERTEZZA nell'accertamento della nidificazione

Nidificazione certa:

nido con uova e/o pulli
giovani non volanti adulto
in cova
coppia al nido
suoni di pulli

Nidificazione probabile:

adulto che entra nella garzaia con materiale nel becco
adulto che entra/si posa ripetutamente in un punto specifico (ad es: aironi rossi nel canneto o garzetta tra le fronde)

Nidificazione possibile:

adulto in periodo riproduttivo all'interno di una garzaia

TIPOLOGIA della GARZAIA

Isole/barene lagunari
Canneti e bonelli lagunari
Valli da pesca e da caccia
Saliceti fluviali (su isole, golene, lanche, sponde, greti, ec ...)
Altri boschi/cespuglieti fluviali
Zone umide minori della pianura (cave, gorgi, stagni, relitti palustri, ecc.)
Sponde di laghi
Formazioni arboreo-arbustive planiziali
Siepi agrarie
Parchi di ville/giardini
Formazioni arboreo-arbustive collinari
Formazioni di conifere
Formazioni arboreo-arbustive miste di montagna
Altro (specificare)