

## CRITERI minimi di CERTEZZA nell'accertamento della nidificazione

### Nidificazione certa:

nido con uova e/o pulli giovani non volanti adulto in cova  
coppia al nido  
suoni di pulli

### Nidificazione probabile:

adulto che entra nella garzaia con materiale nel becco  
adulto che entra/si posa ripetutamente in un punto specifico (ad es: aironi rossi  
nel canneto o garzetta tra le fronde)

### Nidificazione possibile:

adulto in periodo riproduttivo all'interno di una garzaia

## TIPOLOGIA della GARZAIA

Isole/barene lagunari  
Canneti e bonelli lagunari  
Valli da pesca e da caccia  
Saliceti fluviali (su isole, golene, lanche, sponde, greti, ecc...)  
Altri boschi/cespuglieti fluviali  
Zone umide minori della pianura (cave, gorgi, stagni, relitti palustri, ecc...)  
Sponde di laghi  
Formazioni arboreo-arbustive planiziali  
Siepi agrarie  
Parchi di ville/giardini  
Formazioni arboreo-arbustive collinari  
Formazioni di conifere  
Formazioni arboreo-arbustive miste di montagna  
Altro (specificare)





## censimento delle specie coloniali 2019

<b>nome della garzaia</b>			
<b>località e provincia</b>			
<b>coordinate GPS</b>			
<b>tipologia di garzaia</b> (vedi elenco)			
<b>specie e numero di coppie</b> <b>censite o stimate</b>  in tal caso indicare barrare con una [X] nella colonna [cpp.]  (ardeidi coloniali, marangone minore, cormorano, mignattaio, spatola, ibis sacro)	<u>specie</u>	<u>cpp.</u>	<u>grado di certezza</u>
<b>note</b>			
<b>rilevatore/i</b>			