

# Conteggio di Natale Veneto 2023



Emanuele Stival (red.)  
Via Ca'Solaro. 4 – 30173 Venezia

## Rilevatori:

Luca Bassetto, Davide Bergamo, Michele Cassol, Stefano Castelli, Carla Chiappisi, Martina Contro, Samuel Faggian, Luisa Koehler, Roberto Lerco, Annibale Mazzocco, Maria-Giovanna Mitri, Stefano Morato, Alessandro Paiusco, Fabio Piccolo, Vanni Polo, Barbara Rombolotto, Franco Salvini, Lorena Sartor, Giacomo Sgorlon, Maurizio Sighele, Elena Squizzato, Emanuele Stival, Renzo Storer, Aldo Tonelli, Alessandro Zaninoto, Gabriele Facchin

## Area e Metodi

L'indagine è stata svolta in varee aree geografiche del Veneto tramite l'esecuzione di punti di rilevamento (PDR) della durata ciascuno di 10 minuti, dove venivano rilevati, stando in un punto, tutti gli uccelli visti o sentiti e riportandone la quantità. Complessivamente sono stati eseguiti 3 PDR in provincia di Belluno, 4 per Padova, 39 per Treviso, 48 per Venezia, 8 per Verona e 1 per Vicenza; in totale 103. Nessun PDR è stato eseguito nella provincia di Rovigo. Nella figura 1 è riportata la distribuzione geografica dei PDR. I rilievi si sono svolti in due giornate di Natale e Santo Stefano, 25 e 26/12/2023. I dati registrati dai rilevatori sono stati inseriti nella piattaforma Ornitho ([www.ornitho.it](http://www.ornitho.it)) tramite la compilazione della scheda di rilevamento completa, successivamente estratti e inviati al coordinatore per essere elaborati tramite il programma Excel. L'abbondanza è stata calcolata considerando il numero degli individui registrati rispetto alle ore di osservazione (ind./ore).

## Risultati

Complessivamente i 26 rilevatori hanno riportato 895 dati utili con un totale di 5247 individui conteggiati su un totale di 75 specie durante l'esecuzione di 103 PDR per una durata complessiva di 17,17 ore. La media è risultata di 8,7 specie/PDR e con una abbondanza 296 individui/ora di osservazione. In tabella 1 è riportata l'abbondanza delle specie complessiva per il Veneto in ordine tassonomico secondo la IOC (Gill et al., 2024). Nelle tabelle 2, 3 e 4 è invece riportata l'abbondanza registrata suddivisa per le singole province. In tabella 5 è riportata la diffusione delle varie specie (in ordine

decescente) espressa conteggiando il numero dei PDR nei quali sono state registrate le singole specie. Infine nella tabella 6 è riportato il confronto tra le prime 30 specie, ordinate secondo l'abbondanza, tra le provincie con almeno un'ora totale di osservazione (Treviso, Venezia, Verona). Sono evidenziate con linee colorate le specie comuni alle tre provincie, con linee colorate tratteggiate le specie comuni a solo due provincie.

### **Discussione**

Eseguendo un sommario confronto con la analoga iniziativa svolta nello stesso periodo nel 1993/94, nella stessa regione geografica e con un metodo molto simile (PDR della durata di 8 minuti) (Mezzavilla 1994) emergono varie sensibili differenze. Considerando le 40 specie attualmente rilevate come più abbondanti (vedi tabella 1) vale la pena di sottolineare le differenze più marcate rispetto a quanto rilevato nel 1993/94. Il colombaccio risultava del tutto assente mentre oggi è risultata la seconda specie per abbondanza, e ciò conferma il notevolissimo aumento che questa specie ha avuto negli ultimi decenni. Anche l'ibis sacro era ovviamente assente visto che si tratta di una specie alloctona di recente acquisizione. Il marangone minore, altra specie di recente acquisizione, era mancante. Altre specie che non erano state rilevate sono la taccola, la colombella, la cesena.

Dal lato opposto nel 1993/94 varie specie erano state rilevate con abbondanze molto più elevate rispetto al presente conteggio. Per alcune specie come folaga, germano reale, tuffetto, e altre specie tipiche di habitat acquatici, la considerevole differenza si può spiegare con la scarsa o mancata visita di ambienti con questa tipologia (prevalentemente valli da pesca). La passera mattugia, come pure il cardellino erano risultate più abbondanti, mentre il ciuffolotto risultato presente in collina durante i rilievi del presente lavoro non è stato rilevato.




Figura 1. Distribuzione dei PDR eseguiti nel Veneto

<b>Uccelli Veneto</b>	<b>Ind./ora</b>	<b>Uccelli Veneto</b>	<b>Ind./ora</b>
Cigno reale	0,82	Picchio verde	0,87
Volpoca	0,17	Gheppio	0,29
Germano reale	6,99	Ghiandaia	1,81
Moretta	0,82	Gazza	4,66
Orco marino	0,17	Taccola	9,50
Fagiano comune	0,41	Cornacchia nera	0,06
Piccione di città	44,85	Cornacchia grigia	8,50
Colombella	7,11	Cincia mora	0,70
Colombaccio	38,80	Cincia bigia	0,12
Tortora dal collare	10,02	Cinciarella	1,86
Porciglione	0,06	Cinciallegra	5,88
Gallinella d'acqua	4,08	Rondine montana	0,17
Folaga	5,53	Usignolo di fiume	0,06
Tuffetto	0,76	Codibugnolo	3,15
Svasso maggiore	4,60	Lui piccolo	1,05
Svasso piccolo	0,87	Beccamoschino	0,12
Avocetta	0,06	Capinera	0,47
Chiurlo maggiore	0,12	Occhiocotto	0,06
Piro piro piccolo	0,29	Fiorrancino	0,35
Pantana	0,06	Regolo	1,86
Gabbiano comune	31,92	Scricciolo	0,58
Gabbiano corallino	0,82	Storno	15,84
Gabbiano reale	23,18	Merlo	8,33
Beccapesci	0,06	Cesena	2,85
Marangone minore	1,46	Pettiroso	4,02
Cormorano	6,64	Codiroso spazzacamino	0,35
Ibis sacro	3,96	Passera d'Italia	2,80
Airone guardabuoi	0,47	Passera scopaiola	0,23
Airone cenerino	0,47	Ballerina gialla	0,29
Airone bianco maggiore	0,35	Ballerina bianca	0,41
Garzetta	0,52	Pispola	0,35
Falco di palude	0,06	Fringuello	24,58
Poiana	0,87	Verdone	0,82
Civetta	0,06	Cardellino	1,86
Gufo comune	0,87	Lucherino	0,52
Martin pescatore	0,23	Zigolo muciatto	0,17
Picchio rosso maggiore	0,82	Migliarino di palude	0,70
Picchio nero	0,06		

Tabella 1. Abbondanza complessiva delle specie in questo conteggio, espressa come individui/ore di osservazione.

<b>Belluno</b>		<b>Verona</b>	
<b>Uccelli/provincia</b>	<b>Ind./ora</b>	<b>Uccelli/provincia</b>	<b>Ind./ora</b>
Cardellino	60	Gabbiano comune	37,5
Fringuello	38	Piccione domestico	32,25
Passera d'Italia	30	Taccola	32,25
Cinciallegra	16	Germano reale	21
Merlo	10	Cornacchia grigia	17,25
Verdone	10	Merlo	15
Cinciarella	8	Tortora dal collare	9,75
Cornacchia grigia	6	Colombaccio	9
Zigolo muciatto	6	Gabbiano reale	9
Cesena	4	Pettiroso	8,25
Cincia bigia	4	Cinciallegra	5,25
Passera scopaiola	4	Fringuello	5,25
Tortora dal collare	4	Gazza	4,5
Fagiano comune	2	Passera d'Italia	4,5
Gazza	2	Tuffetto	3,75
Pettiroso	2	Cinciarella	3
Picchio rosso maggiore	2	Cormorano	3
Picchio verde	2	Gallinella d'acqua	3
Storno	2	Airone bianco maggiore	2,25
		Fiorrancino	2,25
		Ibis sacro	2,25
		Lui piccolo	1,5
		Marangone minore	1,5
		Scricciolo	1,5
		Ballerina bianca	0,75
		Capinera	0,75
		Cincia mora	0,75
		Garzetta	0,75
		Gheppio	0,75
		Occhiocotto	0,75
		Passera scopaiola	0,75
		Picchio verde	0,75
		Poiana	0,75
		Porciglione	0,75
		Regolo	0,75
		Storno	0,75
		Verdone	0,75
<b>Padova</b>			
Storno	25,5		
Cinciallegra	16,5		
Codibugnolo	12		
Tortora dal collare	12		
Passera d'Italia	10,5		
Fringuello	7,5		
Airone guardabuoi	6		
Cornacchia grigia	4,5		
Merlo	4,5		
Pettiroso	4,5		
Cardellino	3		
Cinciarella	3		
Codirosso spazzacamino	3		
Ghiandaia	3		
Colombaccio	1,5		
Gazza	1,5		
Lui piccolo	1,5		
Scricciolo	1,5		

Tabella 2. Abbondanza delle specie espressa come individui/ore di osservazione suddivisa nelle province di Belluno, Padova e Verona.

**Treviso**

<b>Uccelli/provincia</b>	<b>Ind./ora</b>
Fringuello	50,15
Colombaccio	32,00
Storno	18,92
Piccione domestico	18,77
Taccola	18,15
Folaga	14,62
Germano reale	11,85
Cornacchia grigia	11,54
Cormorano	11,08
Gabbiano comune	10,77
Merlo	10,62
Gabbiano reale	10,00
Tortora dal collare	9,85
Gallinella d'acqua	9,23
Gazza	5,85
Pettirosso	5,54
Codibugnolo	4,92
Cinciallegra	4,46
Ghiandaia	2,92
Regolo	2,92
Marangone minore	2,62
Moretta	2,15
Cigno reale	2,00
Lui piccolo	1,85
Cincia mora	1,69
Cinciarella	1,54
Ibis sacro	1,38
Picchio verde	1,38
Lucherino	1,23
Passera d'Italia	1,23
Tuffetto	1,23
Picchio rosso maggiore	1,08
Scricciolo	1,08
Capinera	0,92
Pispola	0,92
Airone cenerino	0,77
Ballerina gialla	0,77
Svasso maggiore	0,62
Airone guardabuoi	0,46

**Treviso**

<b>Uccelli/provincia</b>	<b>Ind./ora</b>
Ballerina bianca	0,46
Codiroso spazzacamino	0,46
Fagiano comune	0,46
Garzetta	0,46
Martin pescatore	0,46
Poiana	0,46
Rondine montana	0,46
Fiorrancino	0,31
Verdone	0,31
Airone bianco maggiore	0,15
Cornacchia nera	0,15
Picchio nero	0,15

**Vicenza**

<b>Uccelli/provincia</b>	<b>Ind./ora</b>
Tortora dal collare	30
Cornacchia grigia	12
Capinera	6
Cinciallegra	6
Codibugnolo	6
Codiroso spazzacamino	6
Fringuello	6
Gazza	6
Ghiandaia	6
Lui piccolo	6
Merlo	6
Pettirosso	6

Tabella 3. Abbondanza delle specie espressa come individui/ore di osservazione suddivisa nelle province di Treviso e Vicenza.

<b>Venezia</b>			
<b>Uccelli/provincia</b>	<b>Ind./ora</b>	<b>Uccelli/provincia</b>	<b>Ind./ora</b>
Piccione di città	75,63	Marangone minore	0,75
Colombaccio	55,63	Picchio rosso maggiore	0,75
Gabbiano comune	53,50	Verdone	0,75
Gabbiano reale	40,13	Garzetta	0,63
Storno	16,25	Piro piro piccolo	0,63
Colombella	15,25	Gheppio	0,50
Tortora dal collare	10,00	Picchio verde	0,50
Svasso maggiore	9,38	Airone cenerino	0,38
Fringuello	8,00	Ballerina bianca	0,38
Ibis sacro	7,00	Fagiano comune	0,38
Cesena	5,88	Orco marino	0,38
Cinciallegra	5,63	Volpoca	0,38
Merlo	5,63	Airone bianco maggiore	0,25
Cornacchia grigia	5,00	Beccamoschino	0,25
Cormorano	4,75	Chiurlo maggiore	0,25
Gazza	4,13	Lui piccolo	0,25
Pettiroso	2,13	Taccola	0,25
Germano reale	1,88	Airone guardabuoi	0,13
Gufo comune	1,88	Avocetta	0,13
Svasso piccolo	1,88	Beccapesci	0,13
Gabbiano corallino	1,75	Cigno reale	0,13
Codibugnolo	1,63	Civetta	0,13
Cinciarella	1,50	Falco di palude	0,13
Migliarino di palude	1,50	Fiorrancino	0,13
Passera d'Italia	1,50	Lucherino	0,13
Regolo	1,50	Martin pescatore	0,13
Poiana	1,38	Pantana	0,13
Ghiandaia	1,13	Passera scopaiola	0,13
Gallinella d'acqua	0,75	Usignolo di fiume	0,13

Tabella 4. Abbondanza delle specie espressa come individui/ore di osservazione per la provincia di Venezia.

<b>Specie</b>	<b>N.PDR</b>	<b>Specie</b>	<b>N.PDR</b>
Colombaccio	58	Fagiano comune	5
Merlo	58	Fiorrancino	5
Cornacchia grigia	55	Verdone	5
Gabbiano reale	49	Ballerina gialla	4
Cinciallegra	47	Gheppio	4
Fringuello	47	Martin pescatore	4
Tortora dal collare	47	Passera scopaiola	4
Pettirosso	46	Piro piro piccolo	4
Gazza	43	Svasso maggiore	4
Gabbiano comune	33	Svasso piccolo	4
Piccione domestico	32	Airone guardabuoi	3
Storno	25	Lucherino	3
Ghiandaia	22	Migliarino di palude	3
Gallinella d'acqua	20	Cardellino	2
Cinciarella	17	Cesena	2
Cormorano	17	Colombella	2
Picchio verde	15	Gabbiano corallino	2
Marangone minore	14	Gufo comune	2
Regolo	14	Avocetta	1
Codibugnolo	13	Beccamoschino	1
Picchio rosso maggiore	13	Beccapesci	1
Poiana	12	Chiurlo maggiore	1
Germano reale	11	Cincia bigia	1
Folaga	10	Civetta	1
Lù piccolo	10	Cornacchia nera	1
Scricciolo	9	Falco di palude	1
Garzetta	8	Moretta	1
Passera d'Italia	8	Occhiocotto	1
Taccola	8	Orco marino	1
Airone cenerino	7	Pantana	1
Ibis sacro	7	Picchio nero	1
Tuffetto	7	Pispola	1
Capinera	6	Porciglione	1
Cigno reale	6	Rondine montana	1
Codiroso spazzacamino	6	Usignolo di fiume	1
Airone bianco maggiore	5	Volpoca	1
Ballerina bianca	5	Zigolo muciatto	1
Cincia mora	5		

Tabella 5. Diffusione delle varie specie (in ordine decrescente) espressa conteggiando il numero dei PDR nei quali sono state registrate le singole specie.





Tabella 6. Confronto tra le prima 30 specie, ordinate secondo l'abbondanza, tra le provincie con almeno un'ora totale di osservazione (Treviso, Venezia, Verona). Sono evidenziate con linee colorate le specie comuni alle tre provincie, con linee colorate tratteggiate le specie comuni a solo due provincie.

### **Bibliografia**

Gill F., Donsker D. & Rasmussen P., 2024. IOC World Bird List (v14.1). doi: 10.14344/IOC.ML.14.1 - [www.worldbirdnames.org]

Mezzavilla F., 1994. Christmas Birds Census 1993. *Boll. Cen. Orn. Veneto Or.* 5: 16-21.