Verona birdwatching

BIRDING VENETO

VENEZIA BIRDWATCHING

Guida agli

UCCELLI

del

Veneto

Seconda edizione
Aggiornamento
2023



Emanuele Stival

Tutti i diritti riservati. E' vietata la copia, riproduzione anche parziale, la stampa del presente lavoro senza il consenso dell'autore. E' permesso l'uso personale o scolastico senza fini di lucro.
@ Emanuele Stival

2° edizione – Venezia - marzo 2023 – aggiornato 15/3/2023

Introduzione e metodi

Questa guida riporta tutte le specie di uccelli (388) che sono state osservate in Veneto (Italy) nel 21° secolo (https://www.birdingveneto.eu/atlasven2019/index.html).
Per ogni specie sono riportati il nome volgare, quello scientifico, le dimensioni, una o più fotografie esplicative, gli habitat frequentati, la fenologia, la suddivisione altitudinale e lo status per ciascuna provincia secondo quanto riportato nell'Atlante fotosonoro degli uccelli del Veneto (al quale si rimanda anche per approfondimenti sulle varie specie):
https://www.birdingveneto.eu/atlasven2019/index.html
E' stata inserita anche una specie di dubbia selvaticità o provenienza (anatra marmorizzata) e alcune delle specie aufughe o introdotte.

Crediti fotografici:

a: alto, b: basso, m: mezzo, s: sinistra, d: destra

Stival Emanuele, tutte ad eccezione di quelle riportate di seguito.
Are Roberto cesena fosca ad md. **Barbon Andrea** pellicano rossiccio b. **Bastianelli Umberto** beccaccia ad. **Bison Federico** picchio tridattilo ad. **Boscain Luca** pernice bianca bs, gabbiano di pallas, bigia grossa occidentale, usignolo maggiore b, saltimpalo siberiano b. **Bossi Antonio** beccaccia b, gufo reale as, bigia padovana as, md. **Matteo Cargasacchi** marzaiola americana, barbagianni ad, francolino di monte a, corriere di Leschenault ad. stercorario mezzano am ad, berta grigia a. **Cavalli Alessandro** balia caucasica a. **Ernesto Cavallini** allodola golagialla. **Cimino Fabrizio** gufo reale bd, salciaiola bs ad, coturnice dm, allocco degli urali bs, bigia padovana bs, gipeto as, aquila di mare am, calandrina bs, luì bianco b, monachella dorsonero. **Conca Gianni** schiribilla grigiata. **La Notte Francesco Saverio** fagiano di monte bs bd md, allocco degli urali as ad bd, re di quaglie b ad. **Lerco Roberto** totano zampegialle minore b, gracchio corallino as, dendrocigna fulva a. **Mitri Maria Giovanna** organetto bs bd. **Nardo Angelo** aquila anatraia minore as ad bd, saltimpalo siberiano a. **Nicola Graziano** falco della regina bs ad. **Occhiato Daniele** forapaglie macchiettato b, tordo golanera, cesena fosca bs, calandro maggiore. **Piazza Andrea** strolaga maggiore b, stercorario maggiore a. **Piccolo Fabio** forapaglie macchiettato as, falco della regina bd, corriere di Leschenault b, totano zampegialle minore a, civetta capogrosso as, salciaiola as, pettazzurro as. **Ribaudo Daniela** codazzurro. **Rovelli Enrico** luì di Radde. **Scarton Francesco** gabbiano glauco b. **Sattin Luca** usignolo maggiore a. **Arno Schneider** gabbiano glauco md, piviere orientale a. **Sebastiani Luigi** coturnice as bs, francolino di monte b, aquila reale dm. **Sighele Maurizio e Giacomo** moretta dal collare, gobbo rugginoso, quaglia comune b, gallo cedrone bd, pernice bianca ad, stercorario maggiore b, labbo codalunga, stercorario mezzano dm, sterna codalunga b, pigliamosche pettirosso ad, falaropo beccosottile bs, falaropo beccolargo b, anatra sposa ad, luì forestiero, aquila anatraia minore bs, corriere di Leschenault a, piviere oriantale b, gabbiano di Sabine bs, sterna di Rueppell b, pulcinella di mare a, pellicano comune as, gipeto bd, civetta capogrosso ad b, gracchio corallino bs, calandrina bd, organetto as, prispolone indiano, zigolo della Lapponia. **Tdc Robert** tordo oscuro. **Tonelli Aldo** falco della regina as, lanario. **Tormen Giuseppe** balia caucasica. **Carlo Turchetto** picchio muraiolo as bs bd. **Valdini Clelia** pulcinella di mare b. **Vettorel Michele** sterna di Rueppell a. **Zanatta Franco** pellicano rossiccio.

Legenda

Nella parte in calce relativa ai vari ambienti frequentati, alle fasce altitudinali (montagna, collina, pianura), alla fenologia, alla frequenza di osservazione e allo status sono riportati con un colore con tonalità più scura i dati più significativi e con tonalità più chiare quelli secondari. Nel grafico “raro – frequente” il pallino indica le specie rare e il cerchietto (O) quelle rarissime e la “A” quelle accidentali/irregolari; più numerose sono le barrette verdi e più la specie è frequente.

Ringraziamenti

Desidero ringraziare Maurizio Sighele per i suggerimenti nell'impostazione del lavoro, Tomaso Bisol per la revisione del lavoro e tutti quelli che hanno messo a disposizione le fotografie.

Indice:

Anseriformes
Uccelli di medie e grandi dimensioni normalmente molto legati all'ambiente acquatico di forme compatte (più slanciata nei cigni e nelle oche), becco appiattito e buoni volatori
(pagine 5-44)



Galliformes
Uccelli di medie e grandi dimensioni, terricoli, scarsi volatori e forme compatte
(pagine 45-52)



Caprimulgiformes
Uccelli di piccolo-medie dimensioni, ottimi volatori, notturni e crepuscolari, si cibano di insetti catturati in volo
(pagina 53)



Apodiformes
Uccelli di piccole dimensioni insettivori, di forme un po' slanciate, zampe cortissime e superbi volatori (si posano solo per nidificare)
(pagina 54-56)



Otidiformes
Uccelli di grandi dimensioni, terricoli, corridori, tipici di ampie pianure, steppiche e desertiche
(pagine 57)



Cuculiformes
Uccelli di medie dimensioni insettivori, di forme piuttosto compatte, parassiti nella nidificazione e ottimi volatori
(pagina 58-59)



Columbiformes
Uccelli di medie dimensioni prevalentemente granivori di forme piuttosto compatte, ottimi volatori
(pagine 60-64)



Gruiformes
Uccelli di piccole, medie e grandi dimensioni legati prevalentemente all'acqua di forme compatte (la Gru di forme slanciate e vola con collo teso) e discreti volatori
(pagine 65-72)



Podicipediformes
Uccelli di medie e grandi dimensioni legati all'acqua dove cercano il cibo immergendosi, forme lievemente slanciate e becco appuntito e discreti volatori
(pagine 73-77)



Phoenicopteriformes
Uccelli di grandi dimensioni legati all'acqua poco profonda, forme slanciate con zampe e collo lungo (tenuto disteso in volo) e buoni volatori
(pagine 78-79)



Charadriiformes
Uccelli di piccole, medie e grandi dimensioni legati spesso all'acqua di forme compatte o discretamente slanciate con becco, zampe e collo talvolta lunghi, ottimi volatori
(pagine 80-156)



Gaviiformes
Uccelli di grandi dimensioni, acquatici tuffatori, discreti volatori e forme piuttosto slanciate, becco appuntito
(pagina 157-160)



Procellariiformes
Uccelli di medie e grandi dimensioni, pelagici, ottimi volatori e planatori sul mare, becco dritto con punta uncinata
(pagina 161-163)



Ciconiiformes
Uccelli di grandi dimensioni legati agli ambienti aperti con brughiere e all'acqua di forme slanciate con becco, zampe e collo lunghi (collo tenuto diritto in volo) e buoni volatori
(pagine 164-165)



Suliformes
Uccelli di medie e grandi dimensioni, forme slanciate, ottimi pescatori subacquei e discreti volatori
(pagina 166-169)



Pelecaniformes
Uccelli di medie e grandi dimensioni legati prevalentemente all'acqua di forme slanciate con becco, zampe e collo lunghi (collo tenuto a “S” in volo per gli aironi e tenuto dritto per ibis e pellicani) e buoni volatori
(pagine 170-184)



Accipitriformes
Uccelli di grandi dimensioni legati a vari ambienti, ottimi volatori, forme piuttosto compatte o poco slanciate, grandi ali, becco uncinato e zampe con artigli affusolati
(pagine 185-209)



Strigiformes
Uccelli di medie dimensioni carnivori, di forme compatte, becco uncinato e zampe con artigli affusolati, discreti volatori
(pagine 210-219)



Bucerotiformes
Uccelli di medie dimensioni di forme compatte legati agli ambienti vari con radure dove cercano il cibo e becco curvo e discreti volatori
(pagina 220)



Coraciiformes
Uccelli di piccole e medie dimensioni, di forme compatte, molto colorati e discreti volatori
(pagine 221-223)



Piciformes
Uccelli di piccole e medie dimensioni, di forme compatte, becco robusto spesso atto a scavare, discreti volatori
(pagine 224-231)



Falconiformes
Uccelli di medie dimensioni legati a vari ambienti, ottimi volatori, forme piuttosto compatte o poco slanciate, becco uncinato e zampe con artigli affusolati
(pagine 232-240)



Psittaciformes
Uccelli di piccole e medie dimensioni, di forme slanciate, con becco molto arcuato e compatto, specie acclimatate in Italia a seguito aufughe
(pagine 241-242)



Passeriformes
Uccelli di piccole, medie e grandi dimensioni, di forme compatte, in genere abili nel canto, discreti e buoni volatori (molte specie)
(pagine 243-392)



Specie dubbie
Specie di dubbia selvaticità o provenienza
(pagine 393-394)



Specie aufughe
Specie aufughe o introdotte
(pagine 305-405)



Indice
Indice dei nomi italiani, inglesi e scientifici
(pagine 406-414)

Oca colombaccio - Brent Goose *Branta bernicla*

Dimensioni. Lunghezza 55-66 cm, apertura alare 115-125 cm












AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

A									

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO


Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Oca collorosso - Red-breasted Goose *Branta ruficollis*

Dimensioni. Lunghezza 53-55 cm, apertura alare 115-125 cm







adulto con oche lombardelle

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO


Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Oca del Canada - Canada Goosee *Branta canadensis*

Dimensioni. Lunghezza 90-100 cm, apertura alare 160-175 cm

individuo con oche selvatiche



individui con cigno reale






probabile ibrido con oca selvatica




AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Oca facciabianca - Barnacle Goose *Branta leucopsis*

Dimensioni. Lunghezza 58-71 cm, apertura alare 130-145 cm





individui con oca selvatica










AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Oca selvatica - Greylag Goose *Anser anser*

Dimensioni. Lunghezza 75-95 cm, apertura alare 145-170 cm






adulto con pulli



AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI





QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Oca granaiola della tundra - Tundra Bean Goose *Anser serrirostris*

Dimensioni. Lunghezza 66-84 cm, apertura alare 140-175 cm











AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO


VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Oca lombardella - White-fronted Goose *Anser albifrons*

Dimensioni. Lunghezza 64-78 cm, apertura alare 130-160 cm





giovane e adulto (a dx)










AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO


Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Oca lombardella minore - Lesser White-fronted Goose *Anser erythropus*

Dimensioni. Lunghezza 53-66 cm, apertura alare 120-135 cm





ind. con oca lomb.


immaturo con oche lombardelle




adulti con oche lombardelle

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic


Cigno nero - Black Swan *Cygnus atratus*

Dimensioni. Lunghezza 110-140 cm, apertura alare 160-200 cm






adulto con cigno reale






AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia


gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Cigno reale - Mute Swan *Cygnus olor*

Dimensioni. Lunghezza 145-180 cm, apertura alare 208-238 cm



Adulti in volo




Giovane

Adulti con pulcini



AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI





QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Cigno minore - Bewick's Swan *Cygnus columbianus*

Dimensioni. Lunghezza 85-115 cm, apertura alare 140-180 cm





adulto

immaturo




adulto con cigno reale



adulto

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

A									

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Cigno selvatico - Whooper Swan *Cygnus cygnus*

Dimensioni. Lunghezza 115-140 cm, apertura alare 180-215 cm



adulti con cigno reale




adulti con giovani



AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

A									

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Oca egiziana - Egyptian Goose *Alopochen aegyptiaca*

Dimensioni. Lunghezza 63-73 cm, apertura alare 134-154 cm





individuo con oca selvatica









AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI





QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO


VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Volpoca - Common Shelduck *Tadorna tadorna*

Dimensioni. Lunghezza 58-67 cm, apertura alare 110-135 cm





coppia




giovane

gruppo con pavoncelle e altri anatidi


♂





AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO FREQUENTE

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

Casarca - Ruddy Shelduck *Tadorna ferruginea*

Dimensioni. Lunghezza 55-56 cm, apertura alare 115-140 cm



♀



♂ in abito di transizione









adulto in abito invernale

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI





QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia


gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Anatra mandarina - Mandarin Duck *Aix galericulata*

Dimensioni. Lunghezza 41-49 cm, apertura alare 68-74 cm



♀



coppia



individuo con germano reale







♂

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Marzaiola - Garganey *Spatula querquedula*

Dimensioni. Lunghezza 35-41 cm, apertura alare 60-69 cm



individuo con alzavola (a sx)



♂♂ e ♀




♂ in abito non riproduttivo e ♀



coppia (♂ in primo piano)

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO


VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Marzaiola americana - Blue-winged Teal *Spatula discors*

Dimensioni. Lunghezza 37-41 cm, apertura alare 60-64 cm




♂

coppia



AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

A

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Mestolone - Shoveler *Spatula clypeata*

Dimensioni. Lunghezza 44-52 cm, apertura alare 70-84 cm



♂♂ e ♀





♂ in abito di transizione



♀


♂





AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Canapiglia - Gadwall *Mareca strepera*


Dimensioni. Lunghezza 46-56 cm, apertura alare 80-95 cm



♂ adulto




individuo con fischione




♂ adulto





AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic


Fischione - Eurasian Wigeon *Mareca penelope*

Dimensioni. Lunghezza 45-54 cm, apertura alare 75-88 cm



♂♂ e ♀♀ adulti





♂ adulto in abito eclissale


♀




♂ **adulto in abito nuziale**

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI





QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Germano reale - Mallard *Anas platyrhynchos*

Dimensioni. Lunghezza 50-65 cm, apertura alare 81-98 cm



♂ in abito di transizione



♂ con 2 ♀




♀ con pulcini




♂ adulto

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI





QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Codone - Eurasian Teal *Anas acuta*

Dimensioni. Lunghezza 51-66 cm, apertura alare 80-95 cm



♂♂ adulti



coppia (in alto a dx)



♀ adulta

coppia (♂ a sx)




♀ adulta



AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Alzavola - Eurasian Teal *Anas crecca*


Dimensioni. Lunghezza 34-38 cm, apertura alare 58-64 cm












AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO FREQUENTE

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Fistione turco - Red-crested Pochard *Netta rufina*

Dimensioni. Lunghezza 53-57,5 cm, apertura alare 84-92 cm



gruppo di ♂♂ e ♀♀ adulti



♀ con pulli

coppia in volo (♂ a ds)






probabile giovane ♂

♂




AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Moriglione - Common Pochard *Aythya ferina*

Dimensioni. Lunghezza 42-50 cm, apertura alare 66-82 cm





♀

♀ (a sx) e ♂

♀ con pulcini




coppia (♂ a sx)



AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Moretta tabaccata - Ferruginous Duck *Aythya nyroca*

Dimensioni. Lunghezza 38-43 cm, apertura alare 62-69 cm





♂♂ e ♀♀ adulti





♀ adulta






♂ adulto

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Moretta dal collare - Ring-necked Duck *Aythya collaris*

Dimensioni. Lunghezza 37-46 cm, apertura alare 61-75 cm




♀ con morette



♂

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

A									

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Moretta - Tufted Duck *Aythya fuligula*

Dimensioni. Lunghezza 39-47 cm, apertura alare 67-73 cm







♀ con pulli

♂♂



♂




♀




AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Moretta grigia - Greater Scaup *Aythya marila*

Dimensioni. Lunghezza 40-51 cm, apertura alare 69-84 cm



maschio con fistione turco, folaga e canapiglia



♂ in abito di transizione





coppia



AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI





QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Edredone - Common Eider *Somateria mollissima*

Dimensioni. Lunghezza 50-71 cm, apertura alare 80-108 cm





gruppo con gabbiano reale nordico

♂ in eclisse



♀




♂♂ con ♀

♂ in abito nuziale




AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI

MONTAGNA	COLLINA	PIANURA
		

RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Orco marino - Velvet Scoter *Melanitta fusca*

Dimensioni. Lunghezza 51-61 cm, apertura alare 85-99 cm





individui con svasso maggiore



♂ 1° estate






♂

♀♀ **adulte**

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Orchetto marino - Common Scoter *Melanitta nigra*

Dimensioni. Lunghezza 44-54 cm, apertura alare 79-90 cm



♂ adulto



gruppo




♀




♂ adulto

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI

MONTAGNA	COLLINA	PIANURA
		

RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Moretta codona - Long-tailed Duck *Clangula hyemalis*


Dimensioni. Lunghezza 53-70 cm, apertura alare 66-79 cm




♂ adulto in abito invernale

♀








♂ ad. in abito estivo




♂ ad. in abito invernale

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO


VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Quattrocchi - Goldeneye *Bucephala clangula*

Dimensioni. Lunghezza 48-50 cm, apertura alare 65-80 cm



♂♂ adulti



♀ adulta









♂ adulto

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Pesciaiola - Smew *Mergellus albellus*

Dimensioni. Lunghezza 38-44 cm, apertura alare 55-69 cm



coppia (♂ a sx)



♀




♂ in abito di transizione

coppia (♂ a dx)




AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Smergo maggiore - Goosander *Mergus merganser*

Dimensioni. Lunghezza 58-68 cm, apertura alare 78-94 cm



♀ e ♂



♀

♂





♂ e ♀




giovane con tuffetto



AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Smergo minore - Red-breasted Merganser *Mergus serrator*

Dimensioni. Lunghezza 52-63 cm, apertura alare 70-90 cm





♀




♂ e ♀



AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Gobbo della Giamaica - Ruddy Duck *Oxyura jamaicensis*

Dimensioni. Lunghezza 35-43 cm, apertura alare 53-62 cm



individuo con moriglione





♂


probabile giovane




probabile ♀

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Gobbo rugginoso - White-headed Duck *Oxyura leucocephala*

Dimensioni. Lunghezza 43-48 cm, apertura alare 62-70 cm



♂ in abito di transizione




♀



♂ in abito riproduttivo

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

A									

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Francolino di monte - Hazel Grouse *Tetrastes bonasia*

Dimensioni. Lunghezza 35-37 cm, apertura alare 48-54 cm




♂




AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	**BOSCHI DI CONIFERE**	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Pernice bianca - Rock Ptarmigan *Lagopus muta*

Dimensioni. Lunghezza 34-36 cm, apertura alare 54-60 cm



♂ in abito di transizione



♀ in abito estivo

♂ in abito invernale




♂ in abito di transizione



AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Gallo cedrone - Capercaillie *Tetrao urogallus*

Dimensioni. Lunghezza 60-87 cm, apertura alare 87-125 cm





♂


♀





AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	**BOSCHI DI CONIFERE**	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Fagiano di monte - Black Grouse *Lyrurus tetrix*

Dimensioni. Lunghezza 40-55 cm, apertura alare 65-80 cm





♂




♂






AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	**BOSCHI DI CONIFERE**	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	**VI**	PD	VE	**TV**	**BL**	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	**BL**	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Starna - Grey Partridge *Perdix perdix*

Dimensioni. Lunghezza 28-32 cm, apertura alare 45-48 cm




♂ ♀





AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Fagiano comune - Common Pheasant *Phasianus colchicus*

Dimensioni. Lunghezza 53-89 cm, apertura alare 70-90 cm



♀



coppia




♂



AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Quaglia comune - Common Quail *Coturnix coturnix*


Dimensioni. Lunghezza 16-18 cm, apertura alare 32-35 cm





AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Coturnice - Rock Partridge *Alectoris graeca*

Dimensioni. Lunghezza 32-35 cm, apertura alare 46-53 cm










AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic


Succiacapre - Nightjar *Caprimulgus europaeus*

Dimensioni. Lunghezza 26-28 cm, apertura alare 57-64 cm





♂




♀ / ♂ immaturo autunno




AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Rondone maggiore - Alpine Swift *Tachymarptis melba*

Dimensioni. Lunghezza 20-22 cm, apertura alare 54-60 cm










AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Rondone comune - Common Swift *Apus apus*

Dimensioni. Lunghezza 16-17 cm, apertura alare 42-48 cm











AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Rondone pallido - Pallid Swift *Apus pallidus*

Dimensioni. Lunghezza 16-17 cm, apertura alare 42-46 cm











AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Gallina prataiola - Little Bustard *Tetrax terax*

Dimensioni. Lunghezza 40-45 cm, apertura alare 105-115 cm



♂






♂

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

A									

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Cuculo dal ciuffo - Great Spotted Cuckoo *Clamator glandarius*

Dimensioni. Lunghezza 38-40 cm, apertura alare 58-61 cm





giovane




adulto




AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Cuculo - Cuckoo *Cuculus canorus*

Dimensioni. Lunghezza 32-34 cm, apertura alare 55-60 cm



giovane



♀ in morfismo rossiccio






♂

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Piccione domestico - Feral Pigeon *Columba livia* – for. domestica

Dimensioni. Lunghezza 32-34 cm, apertura alare 59-65 cm



coppia in corteggiamento










AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Colombella - Stock Dove *Columba oenas*

Dimensioni. Lunghezza 32-38 cm, apertura alare 61-71 cm















AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Colombaccio - Wood Pigeon *Columba palumbus*

Dimensioni. Lunghezza 40-45 cm, apertura alare 70-78 cm



adulto in volo



giovane




individui con storni

adulto



AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Tortora selvatica - Turtle Dove *Streptopelia turtur*

Dimensioni. Lunghezza 27-31 cm, apertura alare 50-54 cm



individuo (in alto) con tortora dal collare



giovane




adulto




adulto

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Tortora dal collare - Collared Dove *Streptopelia decaocto*

Dimensioni. Lunghezza 30-35 cm, apertura alare 54-62 cm



individuo con anomalia del piumaggio



adulto

gruppo con cicogna bianca




adulto



AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI





QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Porciglione - Water Rail *Rallus aquaticus*

Dimensioni. Lunghezza 26-29 cm, apertura alare 36-45 cm



adulto






giovane




adulto

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI





QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO


Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Re di quaglie - Corncrake *Crex crex*

Dimensioni. Lunghezza 27-30 cm, apertura alare 46-53 cm






adulto



AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	**AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE**	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	**VI**	PD	VE	TV	**BL**	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	**mag**	**giu**	**lug**	**ago**	**set**	**ott**	nov	dic

Voltolino - Spotted Crake *Porzana porzana*

Dimensioni. Lunghezza 21-25 cm, apertura alare 35-42 cm





individuo con schiribilla









AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	**VE**	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic


Gallinella d'acqua - Moorhen *Gallinula chloropus*

Dimensioni. Lunghezza 31-35 cm, apertura alare 50-58 cm



giovane





adulto con pulcini






adulto

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Folaga - Coot *Fulica atra*

Dimensioni. Lunghezza 36-45 cm, apertura alare 68-80 cm



gruppo




giovane




adulto

adulto con pulcino



AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Schiribilla grigiata - Baillon's Crake *Zapornia pusilla*


Dimensioni. Lunghezza 17-190 cm, apertura alare 33-37 cm





AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

A									

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Schiribilla - Little Crake *Zapornia parva*

Dimensioni. Lunghezza 18-20 cm, apertura alare 29-35 cm





giovane

♀






♂

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Gru - Common Crane *Grus grus*

Dimensioni. Lunghezza 110-120 cm, apertura alare 220-245 cm



Individuo giovane (a sinistra) e adulto






adulti

adulto



AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Tuffetto - Little Grebe *Tachybaptus ruficollis*


Dimensioni. Lunghezza 23-29 cm, apertura alare 40-45 cm



adulto in abito nuziale




giovane



adulti in abito nuziale




adulto in abito invernale



pullo

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia


gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Svasso collorosso - Red-necked Grebe *Podiceps grisegena*

Dimensioni. Lunghezza 40-50 cm, apertura alare 70-85 cm



adulto in abito di transizione



giovane




adulto in abito invernale






AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Svasso maggiore - Great Crested Grebe *Podiceps cristatus*

Dimensioni. Lunghezza 50-56 cm, apertura alare 76-86 cm






giovane



individuo albino







adulto in abito nuziale

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI





QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Svasso cornuto - Slavonian Grebe *Podiceps auritus*

Dimensioni. Lunghezza 31-38 cm, apertura alare 59-65 cm



adulto in abito di transizione




adulto in abito invernale




AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	**VE**	TV	BL	**RO**

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Svasso piccolo - Black-necked Grebe *Podiceps nigricollis*

Dimensioni. Lunghezza 28-34,5 cm, apertura alare 54-56 cm





adulti in abito invernale






adulto in abito nuziale

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO


VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Fenicottero - Greater Flamingo *Phoenicopterus roseus*

Dimensioni. Lunghezza 120-150 cm, apertura alare 135-165 cm



sub adulti



adulti




immaturo a sx
con adulto





AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Fenicottero minore - Lesser Flamingo *Phoeniconaias minor*

Dimensioni. Lunghezza 80-90 cm, apertura alare 90-105 cm




Adulto



Adulto con fenicotteri

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

A									

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Occhione - Stone-curlew *Burhinus oedicnemus*

Dimensioni. Lunghezza 42-45 cm, apertura alare 76-88 cm













AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI





QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Beccaccia di mare - Oystercatcher *Haematopus ostralegus*

Dimensioni. Lunghezza 40-45 cm, apertura alare 80-86 cm





adulti in abito invernale con sterne maggiori

adulti di cui uno leucistico





giovane




adulto




AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

Cavaliere d'Italia - Black-winged Stilt *Himantopus himantopus*

Dimensioni. Lunghezza 35-40 cm, apertura alare 67-83 cm



adulto



giovane

♀ adulta


♂ adulto





AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Avocetta - Pied Avocet *Recurvirostra avosetta*

Dimensioni. Lunghezza 43-47 cm, apertura alare 71-78 cm



adulti



giovane


individui e falco pellegrino





AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Pavoncella - Northern Lapwing *Vanellus vanellus*

Dimensioni. Lunghezza 28-31 cm, apertura alare 82-87 cm



♀ in abito riprodutt.




giovane






♂ in abito riprodutt.




AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Piviere dorato - Golden Plover *Pluvialis apricaria*

Dimensioni. Lunghezza 26-28 cm, apertura alare 54-61 cm








gruppo con pavoncella









AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Piviere orientale - Pacific Golden Plover *Pluvialis fulva*


Dimensioni. Lunghezza 23-26 cm, apertura alare 60-73 cm





AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

A									

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Pivieressa - Grey Plover *Pluvialis squatarola*

Dimensioni. Lunghezza 28-30 cm, apertura alare 59-65 cm



adulti in abito estivo (a sx.) e invernale (a dx.) con piovanelli pancianera



adulti in abito estivo (in alto) e invernale (in basso)

adulto in abito estivo





adulto in abito invernale



AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI





QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	**VE**	TV	BL	**RO**

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Corriere grosso - Common Ringed Plover *Caradrius dubius*

Dimensioni. Lunghezza 17-19,5 cm, apertura alare 35-41 cm





adulto in abito invernale



individuo con corriere piccolo (a dx.)




♀ adulta




♂ adulto

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI





QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Corriere piccolo - Little Ringed Plover *Caradrius dubius*

Dimensioni. Lunghezza 15-17 cm, apertura alare 34-37,5 cm



♀ adulta

giovane






♂ adulto





AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Fratino - Kentish plover *Caradrius alexandrinus*

Dimensioni. Lunghezza 16,5-18 cm, apertura alare 33-36,3 cm





adulto in abito invernale




♂ adulto in abito estivo



AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Corriere di Leschenault - Greater Sandplover *Charadrius leschenaultii*

Dimensioni. Lunghezza 22-25 cm, apertura alare 53-60 cm








gruppo in volo con fratino (a sx)



♂ in abito riproduttivo

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

A									

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Piviere tortolino - Dotterel *Charadrius morinellus*

Dimensioni. Lunghezza 23-26 cm, apertura alare 60-72 cm



♂



probabile ♀


giovane






AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	**AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE**	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Chiurlo piccolo - Whimbrel *Numenius phaeopus*

Dimensioni. Lunghezza 43-50 cm, apertura alare 68-85 cm










AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Chiurlo maggiore - Curlew *Numenius arquata*

Dimensioni. Lunghezza 50-60 cm, apertura alare 80-100 cm







individuo con
chiurlo piccolo (a sx)







individuo
con fischioni e
pivieri dorati

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	**ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA**	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	**VE**	TV	BL	**RO**

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Pittima minore - Bar-tailed Godwit *Limosa lapponica*

Dimensioni. Lunghezza 37-39 cm, apertura alare 70-80 cm






individuo con pivieressa





AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia


gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Pittima reale - Black-tailed Godwit *Limosa limosa*

Dimensioni. Lunghezza 40-48 cm, apertura alare 67-76 cm







individuo con mestolone

adulto in abito di transizione
adulto in abito riproduttivo







individuo con albastrello



AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI





QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Voltapietre - Turnstone *Arenaria interpres*

Dimensioni. Lunghezza 21-24 cm, apertura alare 45-48 cm





giovane



adulto in inverno

probabile ♂





adulto in muta



AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI





QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Piovanello maggiore - Knot *Calidris canutus*

Dimensioni. Lunghezza 23-25 cm, apertura alare 57-61 cm



adulto in abito invernale con pivieresse



adulto in abito invernale




adulto in abito invernale




adulti in abito estivo con piovanelli pancianera

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI





QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Combattente - Ruff *Calidris pugnax*

Dimensioni. Lunghezza 29-42 cm, apertura alare 45-62 cm





♂ adulto con tracce di abito nuziale



adulti in abito invernale (♀ a dx)









adulto in abito invernale

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI

MONTAGNA	COLLINA	PIANURA
		

RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Gambecchio frullino - Broad-billed Sandpiper *Calidris falcinellus*

Dimensioni. Lunghezza 15-18 cm, apertura alare 35-40 cm






individuo con piovanello pancianera
e corriere grosso






AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	**VE**	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Piovanello comune - Curlew Sandpiper *Calidris ferruginea*

Dimensioni. Lunghezza 20-22 cm, apertura alare 37-41 cm



Adulto in abito di transizione



probabile giovane



adulto in abito di transizione





adulto in abito invernale



AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI





QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Gambecchio nano - Temminck's Stint *Calidris temminckii*

Dimensioni. Lunghezza 13-15 cm, apertura alare 34-37 cm





abito riproduttivo



individuo con gambecchio comune (a sx)







adulto in abito invernale

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Piovanello tridattilo - Sanderling *Calidris alba*

Dimensioni. Lunghezza 20-21 cm, apertura alare 40-45 cm

adulto in primavera







adulti in abito invernale




giovane



AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Piovanello pancianera - Dunlin *Calidris alpina*

Dimensioni. Lunghezza 17-20 cm, apertura alare 35-39 cm



adulto in abito riproduttivo



adulti in abito invernale



gruppo





adulto in abito riproduttivo



AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI





QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Piovanello violetto - Purple Sandpiper *Calidris maritima*

Dimensioni. Lunghezza 20-22 cm, apertura alare 42-46 cm





individuo con piovanelli pancianera

adulti in abito invernale








AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Gambecchio comune - Little Stint *Calidris minuta*

Dimensioni. Lunghezza 13,2-15 cm, apertura alare 30 cm



adulto in abito invernale





individuo con gambecchio nano (a dx)

adulto in abito nuziale






adulto in abito invernale



AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Piovanello pettorale - Pectoral Sandpiper *Calidris melanotos*

Dimensioni. Lunghezza 19-23 cm, apertura alare 38-44 cm








individuo con piro piro boschereccio (in alto)

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

A									

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Beccaccia - Woodcock *Scolopax rusticola*

Dimensioni. Lunghezza 33-42 cm, apertura alare 60-66 cm








AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Frullino - Jack Snipe *Lymnocryptes minimus*

Dimensioni. Lunghezza 17-19 cm, apertura alare 38-42 cm









AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Croccolone - Great Snipe *Gallinago media*

Dimensioni. Lunghezza 27-29 cm, apertura alare 47-50 cm













AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Beccaccino - Common Snipe *Gallinago gallinago*

Dimensioni. Lunghezza 26-28 cm, apertura alare 42-46 cm












AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Piro piro del Terek - Terek Sandpiper *Xenus cinereus*

Dimensioni. Lunghezza 22-24 cm, apertura alare 57-59 cm








individuo con piro piro boschereccio




AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Falaropo beccosottile - Red-necked Phalarope *Phalaropus lobatus*

Dimensioni. Lunghezza 18-19 cm, apertura alare 32-41 cm



adulto in abito invernale con alzavola



adulto con gabbiano comune




♀ in abito nuziale





AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

A									

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Falaropo beccolargo - Grey Phalarope *Phalaropus fulicarius*

Dimensioni. Lunghezza 20-22 cm, apertura alare 40-44 cm








individuo in abito invernale



individuo in abito di transizione

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

A									

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Piro piro piccolo - Common Sandpiper *Actitis hypoleucos*

Dimensioni. Lunghezza 19-21 cm, apertura alare 38-41 cm











individui con albastrello

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI





QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Piro piro culbianco - Green Sandpiper *Tringa ochropus*

Dimensioni. Lunghezza 21-23,5 cm, apertura alare 43-47 cm








individuo con piro piro boschereccio (in alto)






AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Totano zampegialle minore - Lesser Yellowlegs *Tringa flavipes*

Dimensioni. Lunghezza 23-25 cm, apertura alare 59-64 cm




individuo con cavaliere d'Italia



AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

A									

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Pettegola - Common Redshank *Tringa totanus*

Dimensioni. Lunghezza 27-30 cm, apertura alare 47-52 cm






individui con totani mori





AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Albastrello - Marsh Sandpiper *Tringa stagnatilis*

Dimensioni. Lunghezza 22-24 cm, apertura alare 55-59 cm





individuo con totano moro




individuo con pantana (a sx)






AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Piro piro boschereccio - Wood Sandpiper *Tringa glareola*

Dimensioni. Lunghezza 19,5-23 cm, apertura alare 38-40 cm










AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Totano moro - Spotted Redshank *Tringa erythropus*

Dimensioni. Lunghezza 29-33 cm, apertura alare 52-56 cm





individui con qualche combattente

adulto in abito invernale





adulto in muta




adulto con piovanelli pancianera




adulto in abito nuziale

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI





QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	**VE**	TV	BL	**RO**

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Pantana - Greenshank *Tringa nebularia*

Dimensioni. Lunghezza 33-37 cm, apertura alare 54-63 cm





individuo con totano moro








AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Pernice di mare - Collared Pratincole *Glareola pratincola*

Dimensioni. Lunghezza 25 cm, apertura alare 60-65 cm



giovane



adulto









adulto

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code del canto

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Pernice di mare orientale - Black-winged Pratincole *Glareola nordmanni*

Dimensioni. Lunghezza 25 cm, apertura alare 60-65 cm






adulto





AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

A									

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Gabbiano tridattilo - Black-legged Kittiwake *Rissa tridactila*

Dimensioni. Lunghezza 38-40 cm, apertura alare 95-120 cm





giovani




adulto in abito estivo




AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	**VE**	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Gabbiano di Sabine - Sabine's Gull *Xema sabini*

Dimensioni. Lunghezza 27-32 cm, apertura alare 90-100 cm












AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

A									

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Gabbiano roseo - Slender-billed Gull *Chroicocephalus genei*

Dimensioni. Lunghezza 39,5-40,5 cm, apertura alare 100 cm



giovane



adulto in estate



individuo con gabbiano comune (in alto)

subadulto




adulto




AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Gabbiano di Bonaparte - Bonaparte's Gull *Chroicocephalus philadelphia*

Dimensioni. Lunghezza 27-32 cm, apertura alare 79-84 cm



Immaturo in primo piano con gabbiano comune




Immaturo



Immaturo in alimentazione tra due gabbiani comuni

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

A

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Gabbiano comune - Black-headed Gull *Larus ridibundus*

Dimensioni. Lunghezza 33-39 cm, apertura alare 84-103 cm



giovane



adulto in abito invernale




adulti con gavine



adulto in abito nuziale

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Gabbianello - Little Gull *Hydrocoloeus minutus*

Dimensioni. Lunghezza 26-29 cm, apertura alare 66-74 cm



giovane



individuo con gabbiano comune



adulto in abito invernale

adulti in abito di transizione





individuo con gabbiano comune






adulto in abito estivo


adulto in abito estivo

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	**VE**	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Gabbiano corso - Audouin's Gull *Ichthyaetus audouinii*

Dimensioni. Lunghezza 48-52 cm, apertura alare 115-140 cm



giovane



2° calend.




adulto



AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

A

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Gabbiano corallino - Mediterranean Gull *Ichthyaetus melanocephalus*

Dimensioni. Lunghezza 40-42 cm, apertura alare 110-130 cm





adulto in abito estivo








sub adulto in abito invernale


adulto in abito nuziale

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Gabbiano di Pallas - Great Black-headed Gull *Ichthyaetus ichthyaetus*

Dimensioni. Lunghezza 57-61 cm, apertura alare 149-170 cm



adulto in abito invernale




adulto in abito invernale



adulti in abito estivo in colonia

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO FREQUENTE

A									

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Gavina - Common Gull *Larus canus*

Dimensioni. Lunghezza 39-45 cm, apertura alare 103-121 cm



giovane



adulto in abito invernale

adulto in abito invernale




individui con gabbiani comuni



AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Gavina americana - Ring-billed Gull *Larus delawarensis*

Dimensioni. Lunghezza 43-47 cm, apertura alare 120-155 cm








AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

A									

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Mugnaiaccio - Great Black-backed Gull *Larus marinus*

Dimensioni. Lunghezza 64-78 cm, apertura alare 150-165 cm






giovane con gabbiano reale nordico adulto






AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Gabbiano glauco - Glaucous Gull *Larus hyperboreus*

Dimensioni. Lunghezza 62-68 cm, apertura alare 150-165 cm



individuo al 2° calendario




individuo al 2° anno



adulto in abito riproduttivo

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

A									

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Gabbiano reale nordico - Herring Gull *Larus argentatus*

Dimensioni. Lunghezza 55-67 cm, apertura alare 125-155 cm





adulto e sub adulto (in alto a ds)



adulto in abito invernale ad. con zafferano







giovane

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI





QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Gabbiano reale pontico - Caspian Gull *Larus cachinnans*

Dimensioni. Lunghezza 56-68 cm, apertura alare 137-145 cm



adulti








adulti (sopra e sotto) e immaturo






AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Gabbiano reale - Yellow-legged Gull *Larus michahellis*

Dimensioni. Lunghezza 55-65 cm, apertura alare 128-150 cm



immaturo e adulto



immaturo




adulto in abito estivo



subadulto

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI





QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Zafferano - Lesser Black-backed Gull *Larus fuscus*

Dimensioni. Lunghezza 49-55 cm, apertura alare 125-142 cm



adulti



individuo (in basso) con mugnaiaccio

adulto





immaturo




giovane




AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Sterna zampenere - Gull-billed Tern *Gelochelidon nilotica*

Dimensioni. Lunghezza 34-39 cm, apertura alare 87-102 cm



adulto in abito estivo



adulto in muta

giovane



adulto in abito estivo






adulto in muta con giovani

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Sterna maggiore - Caspian Tern *Hydroprogne caspia*

Dimensioni. Lunghezza 49-57 cm, apertura alare 127-137 cm



adulto in abito di transizione



adulto in abito riproduttivo







adulto in abito di transizione

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI





QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Sterna di Rueppell - Lesser Crested Tern *Thalasseus bengalensis*

Dimensioni. Lunghezza 35-37 cm, apertura alare 92-105 cm




adulto con beccapesci e sterna comune

adulti in abito riproduttivo



AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

A									

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Beccapesci - Sandwich Tern *Thalasseus sandvicensis*

Dimensioni. Lunghezza 38-43 cm, apertura alare 85-96 cm



adulto in abito invernale



gruppo con fraticelli e sterna comune

beccapesci inseguito da labbo




adulto in abito nuziale





AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI

MONTAGNA	COLLINA	PIANURA
		

RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Fraticello - Little Tern *Sternula albifrons*

Dimensioni. Lunghezza 21-24 cm, apertura alare 48-52 cm



adulto



giovane



adulti con avocetta

adulto




adulto




AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Sterna comune - Common Tern *Sterna hirundo*

Dimensioni. Lunghezza 34-39 cm, apertura alare 73-81 cm



adulto



adulto in abito invernale




adulto con beccapesci (a sx)

adulto con giovane (a destra)



AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Sterna codalunga - Arctic Tern *Sterna paradisaea*

Dimensioni. Lunghezza 33-35 cm, apertura alare 75-85 cm






adulto in abito riproduttivo (sotto) individuo (sopra) al 1° inverno




AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Mignattino piombato - Whiskered Tern *Chlidonias hybrida*

Dimensioni. Lunghezza 23-25 cm, apertura alare 74-78 cm



adulto in abito invernale






adulto in abito estivo






AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI

MONTAGNA	COLLINA	PIANURA
		

RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Mignattino alibianche - White-winged Tern *Chlidonias leucopterus* 150

Dimensioni. Lunghezza 20-23 cm, apertura alare 63-67 cm

adulto in abito di transizione






adulto in abito nuziale





AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO FREQUENTE

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Mignattino comune - Black Tern *Chlidonias niger*

Dimensioni. Lunghezza 23-26 cm, apertura alare 58-65 cm





adulto in abito nuziale



gruppo con gabbiani comuni

giovane




adulto in abito invernale




AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Stercorario maggiore - Great Skua *Stercorarius skua*


Dimensioni. Lunghezza 53-58 cm, apertura alare 132-140 cm





AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

A									

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO


VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Stercorario mezzano - Pomarine Skua *Stercorarius pomarinus*

Dimensioni. Lunghezza 46-51 cm, apertura alare 125-138 cm







adulto morfismo chiaro

individuo al 1° calendario




adulto morfismo scuro




adulto in morfismo chiaro

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO


Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Labbo - Arctic Skua *Stercorarius parasiticus*

Dimensioni. Lunghezza 41-46 cm, apertura alare 110-125 cm





1° calendario

adulto in morfismo chiaro




ind. Insegue beccapesci



AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI

MONTAGNA	COLLINA	PIANURA
		

RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Labbo codalunga - Long-tailed Skua *Stercorarius longicaudus*

Dimensioni. Lunghezza 48-53 cm, apertura alare 105-117 cm



adulto




individuo al 1° calendario




adulto

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI





QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Pulcinella di mare - Puffin *Fratercula arctica*

Dimensioni. Lunghezza 26-29 cm, apertura alare 47-63 cm




adulto



AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

A									

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Strolaga minore - Red-throated Diver *Gavia stellata*

Dimensioni. Lunghezza 53-69 cm, apertura alare 99-116 cm



adulto in abito invernale



adulto in abito estivo







adulti in abito di transizione

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Strolaga mezzana - Black-throated Diver *Gavia arctica*

Dimensioni. Lunghezza 58-77 cm, apertura alare 110-130 cm





adulti in abito invernale






adulto in abito di transizione

adulti in abito invernale




AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Strolaga maggiore - Great Northern Diver *Gavia immer*

Dimensioni. Lunghezza 69-91 cm, apertura alare 127-147 cm



individuo con gabbiano reale

individuo con svasso maggiore






immaturo




adulto in abito nuziale

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Strolaga beccogiallo - Yellow-billed Diver *Gavia adamsii*

Dimensioni. Lunghezza 76-91 cm, apertura alare 137-152 cm








immaturo in inverno



AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

A									

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Berta maggiore - Scopoli's Shearwater *Calonectris diomedea*

Dimensioni. Lunghezza 41-46 cm, apertura alare 95-125 cm








individuo con gabbiano reale





AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

A									

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Berta grigia - Sooty Shearwater *Ardenna grisea*


Dimensioni. Lunghezza 40-51 cm, apertura alare 94-109 cm





AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

A									

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Berta minore - Yelkouan Shearwater *Puffinus yelkouan*

Dimensioni. Lunghezza 30-38 cm, apertura alare 76-89 cm








individuo con gabbiano reale






AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Cicogna nera - Black Stork *Ciconia nigra*

Dimensioni. Lunghezza 95-100 cm, apertura alare 165-180 cm



adulto



giovane




giovane



adulto

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Cicogna bianca - White Stork *ciconia ciconia*

Dimensioni. Lunghezza 100-115 cm, apertura alare 175-195 cm











AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Sula - Northern Gannet *Morus bassanus*

Dimensioni. Lunghezza 87-100 cm, apertura alare 165-180 cm



giovane





adulto




immaturi probabile 2° e 4° calendario



AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO


VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Marangone minore - Pygmy Cormorant *Microcarbo pygmaeus*


Dimensioni. Lunghezza 45-55 cm, apertura alare 75-90 cm





individui con cormorano








AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Cormorano - Great Cormorant *Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758)*

Dimensioni. Lunghezza 80-100 cm, apertura alare 120-150 cm



adulti in volo




giovane



gruppo in pesca collettiva

adulto in abito nuziale






adulto in abito invernale

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Marangone dal ciuffo - Shag *Gulosus aristotelis*

Dimensioni. Lunghezza 65-80 cm, apertura alare 90-105 cm





adulti



giovane







adulti e giovane a sn

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Ibis sacro - Sacred Ibis *Threskiornis aethiopicus*

Dimensioni. Lunghezza 65-75 cm, apertura alare 112-124 cm





individui con mignattaio




individuo con cavaliere d'Italia






AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO


VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Mignattaio - Glossy Ibis *Plegadis falcinellus*

Dimensioni. Lunghezza 53-65 cm, apertura alare 80-95 cm



probabile adulto in abito invernale



adulto



adulto in abito nuziale





giovane



AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI





QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Spatola - Eurasian Spoonbill *Platalea leucorodia*

Dimensioni. Lunghezza 75-90 cm, apertura alare 115-130 cm





giovane



adulto in abito invernale





adulto in abito nuziale



AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI





QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia


gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Tarabuso - Bittern *Botaurus stellaris*

Dimensioni. Lunghezza 65-80 cm, apertura alare 110-135 cm










AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Tarabusino - Little Bittern *Ixobrychus minutus*

Dimensioni. Lunghezza 33-38 cm, apertura alare 51-58 cm



giovane



♂ adulto in volo




♂ adulto




♀ adulta

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI





QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Nitticora - Night Heron *Nycticorax nycticorax*

Dimensioni. Lunghezza 52-65 cm, apertura alare 95-112 cm



giovane in volo



adulto




adulto



immaturo

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Sgarza ciuffetto - Squacco Heron *Ardeola ralloides*

Dimensioni. Lunghezza 44-47 cm, apertura alare 80-92 cm



adulto



giovane / adulto in abito invernale

adulto




adulto in abito nuziale



AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Airone guardabuoi - Cattle Egret *Bubulcus ibis*

Dimensioni. Lunghezza 46-53 cm, apertura alare 90-96 cm





adulto in abito nuziale






giovane

adulto in abito invernale

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Airone cenerino - Grey Heron *Ardea cinerea*

Dimensioni. Lunghezza 90 cm, apertura alare 150-160 cm



giovane o immaturo



adulto




adulto



adulto con falco pellegrino

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI





QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic


Airone rosso - Purple Heron *Ardea purpurea*

Dimensioni. Lunghezza 85-110 cm, apertura alare 120-150 cm





giovane




adulto




adulto in arrivo al nido

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	**ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA**	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Airone bianco maggiore - Great Egret *Casmerodius albus*

Dimensioni. Lunghezza 85-115 cm, apertura alare 140-180 cm



gruppo con airone cenerino



adulto in abito nuziale

adulto in abito nuziale
con zampe rossastre




adulto in abito invernale



AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI





QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Garzetta - Little Egret *Egretta garzetta*

Dimensioni. Lunghezza 55-67 cm, apertura alare 90-100 cm



individuo (in alto) con airone guardabuoi



adulto in abito nuziale




adulto



AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI





QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Airone schistaceo - Western Reef Heron *Egretta gularis*

Dimensioni. Lunghezza 55-68 cm, apertura alare 88-112 cm



adulto




ibrido *E. gularis* x *E. garzetta*






AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Pellicano comune - White Pelican *Pelecanus onocrotalus*

Dimensioni. Lunghezza 140-175 cm, apertura alare 235-310 cm



adulto in abito riproduttivo




adulto



immaturo

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

A									

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Pellicano rossiccio - Pink-backed Pelican *Pelecanus rufescens*


Dimensioni. Lunghezza 125-155 cm, apertura alare 215-290 cm





AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

A									

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Falco pescatore - Osprey *Pandion haliaetus*

Dimensioni. Lunghezza 45-65 cm, apertura alare 145-170 cm






adulto con aquila imperiale






AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	**ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA**	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Nibbio bianco - Black-shouldered Kite *Elanus caeruleus*

Dimensioni. Lunghezza 31-35 cm, apertura alare x cm






adulto






AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Gipeto - Lammergeier *Gypaetus barbatus*

Dimensioni. Lunghezza 100-115 cm, apertura alare 240-300 cm





adulti






adulto



immaturo al 2° calendario

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

A									

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Capovaccaio - Egyptian Vulture *Neophron percnopterus*

Dimensioni. Lunghezza 60-70 cm, apertura alare 155-170 cm








adulto



adulto con corvi imperiali

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

A									

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Falco pecchiaiolo - Honey Buzzard *Pernis apivorus*

Dimensioni. Lunghezza 52-65 cm, apertura alare 120-145 cm

♂ adulto










♂ adulto

♀ adulta

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Grifone - Griffon Vulture *Gyps fulvus*

Dimensioni. Lunghezza 95-105 cm, apertura alare 230-270 cm










immaturo

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO									FREQUENTE
o									

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Avvoltoio monaco - Black Vulture *Aegypius monachus*

Dimensioni. Lunghezza 100-110 cm, apertura alare 250-295 cm





immaturo con grifoni




immaturo con corvo imperiale



adulto

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

A									

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Biancone - Short-toed Eagle *Circaetus gallicus*

Dimensioni. Lunghezza 62-72 cm, apertura alare 170-195 cm











AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Aquila anatraia minore - Lesser Spotted Eagle *Clanga pomarina*

Dimensioni. Lunghezza 62-68 cm, apertura alare 145-165 cm







giovane

immaturo




adulto

giovane

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

A									

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia


gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Aquila anatraia maggiore - Great Spotted Eagle *Clanga clanga*

Dimensioni. Lunghezza 62-68 cm, apertura alare 145-165 cm



immaturo



giovane

adulto


adulto





AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Aquila minore - Booted Eagle *Hieraaetus pennatus*

Dimensioni. Lunghezza 50-57 cm, apertura alare 115-135 cm






adulto in morfismo scuro

adulto in morfismo chiaro



AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE

o									

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Aquila imperiale - Imperial Eagle *Aquila heliaca*

Dimensioni. Lunghezza 72-83 cm, apertura alare 180-215 cm





adulto






individuo al 2° calendario

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Aquila reale - Golden Eagle *Aquila chrysaetos*

Dimensioni. Lunghezza 76-93 cm, apertura alare 190-240 cm



subadulto



immaturo






adulto




AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Sparviere - Sparrowhawk *Accipiter nisus*

Dimensioni. Lunghezza 28-40 cm, apertura alare 55-79 cm





♀ adulta






♂ adulto

giovane ♂



AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Astore - Goshawk *Accipiter gentilis*

Dimensioni. Lunghezza 48-62 cm, apertura alare 95-125 cm





individuo con poiana (in basso)







probabile giovane

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	**BOSCHI DI CONIFERE**	**BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI**	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	**VI**	PD	VE	**TV**	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	**VE**	**TV**	**BL**	RO

Fenologia


gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Falco di palude - Marsh Harrier *Circus aeruginosus*

Dimensioni. Lunghezza 48-56 cm, apertura alare 115-135 cm



♂



probabile giovane


♀





AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Albanella reale - Hen Harrier *Circus cyaneus*

Dimensioni. Lunghezza 44-52 cm, apertura alare 100-120 cm







♀ adulta



♂ ad.




♀ ad.




♂ ad.

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Albanella pallida - Pallid Harrier *Circus macrourus*

Dimensioni. Lunghezza 40-48 cm, apertura alare 100-125 cm



♀ insegue stiaccino

♀ (sotto)






♂

♂ sub adulto (sotto)



AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO


VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Albanella minore - Montagu's Harrier *Circus pygargus*

Dimensioni. Lunghezza 39-50 cm, apertura alare 97-118 cm



juv



♀ adulta

♂ adulto




♂ adulto



AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Nibbio reale - Red Kite *Milvus milvus*

Dimensioni. Lunghezza 60-66 cm, apertura alare 155-180 cm












AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Nibbio bruno - Black Kite *Milvus migrans*

Dimensioni. Lunghezza 48-58 cm, apertura alare 130-155 cm










individuo con gheppio e falco cuculo

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic


Aquila di mare - White-tailed Eagle *Haliaeetus albicilla*

Dimensioni. Lunghezza 70-90 cm, apertura alare 190-250 cm






adulto (anche sotto)




immaturo (a destra)





AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

A									

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Poiana calzata - Rough-legged Buzzard *Buteo lagopus*

Dimensioni. Lunghezza 55-61 cm, apertura alare 130-150 cm





individuo con falco di palude








AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Poiana codabianca - Long-legged Buzzard *Buteo rufinus*

Dimensioni. Lunghezza 57-65 cm, apertura alare 135-160 cm










AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO FREQUENTE

A									

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Poiana - Common Buzzard *Buteo buteo*

Dimensioni. Lunghezza 50-65 cm, apertura alare 113-130 cm





ind. Molto chiaro








AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Barbagianni - Barn Owl *Tyto alba*

Dimensioni. Lunghezza 32-39 cm, apertura alare 91-100 cm











AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Civetta capogrosso - Tengmalm's Owl *Aegolius funereus*

Dimensioni. Lunghezza 24-26 cm, apertura alare 54-62 cm



adulto




giovane




adulto

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Civetta - Little Owl *Athene noctua*

Dimensioni. Lunghezza 22-27 cm, apertura alare 50-61 cm



giovani



individuo visto da dietro








AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Civetta nana - Pygmy Owl *Glaucidium passerinum*

Dimensioni. Lunghezza 16-17 cm, apertura alare 34-36 cm










AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Assiolo - Scops Owl *Otus scops*

Dimensioni. Lunghezza 18-21 cm, apertura alare 47-55 cm











AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Gufo comune - Long-eared Owl *Asio otus*

Dimensioni. Lunghezza 35-39 cm, apertura alare 85-100 cm








giovane




AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Gufo di palude - Short-eared Owl *Asio flammeus*

Dimensioni. Lunghezza 37-39 cm, apertura alare 95-110 cm








individuo con gabbiano reale



AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	**AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE**	**ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA**	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	**VI**	PD	**VE**	TV	BL	**RO**

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Gufo reale - Eagle Owl *Bubo bubo*

Dimensioni. Lunghezza 60-75 cm, apertura alare 160-188 cm











AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Allocco - Tawny Owl *Strix aluco*


Dimensioni. Lunghezza 37-46 cm, apertura alare 87-100 cm



individui in cattività (morfismo rosso e grigio)









individuo riabilitato prima del rilascio

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Allocco degli Urali - Ural Owl *Strix uralensis*

Dimensioni. Lunghezza 60-62 cm, apertura alare 124-134 cm






individuo melanico






AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	**BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI**	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	**apr**	**mag**	giu	lug	ago	set	**ott**	nov	dic

Upupa - Hoopoe *Upupa epops*

Dimensioni. Lunghezza 25-31 cm, apertura alare 44-49 cm








individuo con storno





AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Ghiandaia marina - Roller *Coracias garrulus*

Dimensioni. Lunghezza 29-33 cm, apertura alare 63-67 cm










AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Martin pescatore - Kingfisher *Alcedo atthis*

Dimensioni. Lunghezza 16-17 cm, apertura alare 24-26 cm







♂




♀



AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Gruccione - Bee-eater *Merops apiaster*

Dimensioni. Lunghezza 26-30 cm, apertura alare 34-48 cm





adulti


giovane





AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Torcicollo - Wryneck *Jynx torquilla*

Dimensioni. Lunghezza 17-18,5 cm, apertura alare 26-30 cm










AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Picchio tridattilo - Three-toed Woodpecker *Picoides tridactylus*

Dimensioni. Lunghezza 21-22 cm, apertura alare 32-35 cm






♀




♂



AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Picchio rosso mezzano - Middle Spotted Woodpecker *Dendrocoptes medius*


Dimensioni. Lunghezza 20-22 cm, apertura alare 33-34 cm






♀





AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

A									

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Picchio rosso minore - Lesser Spotted Woodpecker *Dryobates minor*

Dimensioni. Lunghezza 14-15 cm, apertura alare 25-27 cm



♂



♀




♀




AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Picchio rosso maggiore - Great Spotted Woodpecker *Dendrocopos major*

Dimensioni. Lunghezza 21-26 cm, apertura alare 42-43 cm



♂



♂




♀



AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Picchio nero - Black Woodpecker *Dryocopus martius*

Dimensioni. Lunghezza 45-57 cm, apertura alare 64-68 cm



♀






♂

♀




AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Picchio verde - Green Woodpecker *Picus viridis*

Dimensioni. Lunghezza 30-35 cm, apertura alare 48-53 cm



♂



♀

♂




giovane



AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Picchio cenerino - Grey-headed Woodpecker *Picus canus*

Dimensioni. Lunghezza 25-26 cm, apertura alare 38-40 cm





♀

♂







♂

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Grillaio - Lesser Kestrel *Falco naumanni*

Dimensioni. Lunghezza 29-32 cm, apertura alare 60-70 cm



♂ adulto




♀





AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Gheppio - Common Kestrel *Falco tinnunculus*

Dimensioni. Lunghezza 31-37 cm, apertura alare 70-80 cm



♂



♂ adulto

♂ adulto


♀ adulta





AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Falco cuculo - Red-footed Falcon *Falco vespertinus*

Dimensioni. Lunghezza 28-32 cm, apertura alare 65-78 cm





♀ adulta



♂ adulto



♂ adulto




giovane




AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Falco della regina - Eleonora's Falcon *Falco eleonorae*

Dimensioni. Lunghezza 36-40 cm, apertura alare 85-100 cm





adulto in morfismo scuro






adulto in morfismo chiaro

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Smeriglio - Merlin *Falco columbarius*

Dimensioni. Lunghezza 25-33 cm, apertura alare 50-68 cm



♂



♀

♂ con cardellino predato

♀




♂




AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Lodolaio - Hobby *Falco subbuteo*

Dimensioni. Lunghezza 30-36 cm, apertura alare 75-90 cm



adulto



adulto in volo mentre mangia un insetto


adulto





AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	**BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI**	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	**CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA**	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Lanario - Lanner Falcon *Falco biarmicus*

Dimensioni. Lunghezza 40-50 cm, apertura alare 90-115 cm



giovane con gheppio




giovane






AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Sacro - Saker Falcon *Falco cherrug*

Dimensioni. Lunghezza 47-57 cm, apertura alare 105-135 cm




adulto






AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO


VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia


gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Falco pellegrino - Peregrine Falcon *Falco peregrinus*

Dimensioni. Lunghezza 38-49 cm, apertura alare 95-110 cm



adulto con preda





giovane




adulto




AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Parrocchetto monaco - Monk Parakeet *Myiopsitta monachus* 241

Dimensioni. Lunghezza 28-31 cm, apertura alare 48-53 cm








AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Parrocchetto dal collare - Rose-ringed Parakeet *Psittacula krameri*

Dimensioni. Lunghezza 38-42 cm, apertura alare 42-48 cm





♀







♂

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI

MONTAGNA	COLLINA	PIANURA
		

RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Averla piccola - Red-backed Shrike *Lanius collurio*

Dimensioni. Lunghezza 17,5-18,5 cm, apertura alare 28-29 cm



♂ adulto

giovane



♂ adulto




♀ adulta




AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Averla isabellina - Isabelline Shrike *Lanius isabellinus*

Dimensioni. Lunghezza 17,5 cm, apertura alare 25-28 cm










AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

A									

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Averla cenerina - Lesser Grey Shrike *Lanius minor*

Dimensioni. Lunghezza 20 cm, apertura alare 32-34,5 cm



adulto



giovane




adulto



giovane

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Averla maggiore - Great Grey Shrike *Lanius excubitor*

Dimensioni. Lunghezza 24-26 cm, apertura alare 35-37 cm










AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Averla capirossa - Woodchat Shrike *Lanius senator*

Dimensioni. Lunghezza 18 cm, apertura alare 26-28 cm







♀




probabile ♀




♂

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Rigogolo - Golden Oriole *Oriolus oriolus*

Dimensioni. Lunghezza 22-25 cm, apertura alare 43-48 cm



♂



♀



♀? maschio 2cy?

giovane






♂

♀



AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Ghiandaia - Jay *Garrulus glandarius*

Dimensioni. Lunghezza 32-36 cm, apertura alare 53-59 cm










AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Gazza - Magpie *Pica pica*

Dimensioni. Lunghezza 41-43 cm, apertura alare 48-55 cm



gurppo



giovane






individuo con sparviere

adulto

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Nocciolaia - Spotted Nutcracker *Nucifraga caryocatactes*

Dimensioni. Lunghezza 22-33 cm, apertura alare 52-58 cm













AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Gracchio corallino - Red-billed Chough *Pyrrhocorax pyrrhocorax* 252

Dimensioni. Lunghezza 39-40 cm, apertura alare 73-90 cm



adulto con gracchio alpino






adulto

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO FREQUENTE

A

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Gracchio alpino - Alpine Chough *Pyrrhocorax graculus*

Dimensioni. Lunghezza 38 cm, apertura alare 75-85 cm















AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Taccola - Jackdaw *Corvus monedula*

Dimensioni. Lunghezza 30-34 cm, apertura alare 60-75 cm










coppia

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Corvo comune Rook *Corvus frugilegus*


Dimensioni. Lunghezza 43-47 cm, apertura alare 89-99 cm



immaturo



individuo con aquila di mare











adulto

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Cornacchia nera - Carrion Crow *Corvus corone*

Dimensioni. Lunghezza 43-48 cm, apertura alare 90-100 cm





individuo con cornacchie grigie e poiana






ibrido con cornacchia grigia

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Cornacchia grigia - Hooded Crow *Corvus cornix*

Dimensioni. Lunghezza 43-48 cm, apertura alare 90-100 cm

gruppo che insegue una poiana





individuo con gheppio








AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Corvo imperiale - Common Raven *Corvus corax*

Dimensioni. Lunghezza 64 cm, apertura alare 120-150 cm










individuo con falco pecchiaiolo

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO


Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Beccofrusone - Bohemian Waxwing *Bombycilla garrulus*

Dimensioni. Lunghezza 18 cm, apertura alare 32-35,5 cm








adulto

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Cincia mora - Coal Tit *Periparus ater*

Dimensioni. Lunghezza 11-12 cm, apertura alare 18-21 cm







individuo con cinciallegra









AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Cincia dal ciuffo - Crested Tit *Lophophanes cristatus*

Dimensioni. Lunghezza 11,5 cm, apertura alare 17-20 cm



giovane



adulto




adulto



AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	**BOSCHI DI CONIFERE**	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	**VI**	PD	VE	**TV**	**BL**	RO

SVERNAMENTO

VR	**VI**	PD	VE	**TV**	**BL**	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Cincia bigia - Marsh Tit *Poecile palustris*

Dimensioni. Lunghezza 11,5 cm, apertura alare 18-19,5 cm











AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Cincia alpestre - Willow Tit *Poecile montanus*

Dimensioni. Lunghezza 11,5 cm, apertura alare 17-20,5 cm










AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Cinciarella - Blue Tit *Parus caeruleus*

Dimensioni. Lunghezza 11-12,5 cm, apertura alare 19-22 cm







individuo con verdone




individuo con cinciallegra



AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Cinciallegra - Great Tit *Parus major*

Dimensioni. Lunghezza 13-15 cm, apertura alare 21-24 cm



♀





individuo con merlo



♂




giovane



AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Pendolino - Penduline Tit *Remiz pendulinus*

Dimensioni. Lunghezza 11-12 cm, apertura alare 16-18 cm



♀ adulta (in alto) e 1cy





♂ adulto con nido in costruzione





♂



AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI





QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Basettino - Bearded Reedling *Panurus biarmicus*

Dimensioni. Lunghezza 12,5 cm, apertura alare 16-18 cm



coppia



♀







♂ adulto

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI





QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Tottavilla - Woodlark *Lullula arborea*

Dimensioni. Lunghezza 15 cm, apertura alare 27-30 cm













AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Allodola Skylark - *Alauda arvensis*

Dimensioni. Lunghezza 16,5-19,5 cm, apertura alare 32-37 cm










AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Cappellaccia - Crested Lark *Galerida cristata*

Dimensioni. Lunghezza 17-18,3 cm, apertura alare 32-36 cm













AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic

Allodola golagialla - Horned Lark *Eremophila alpestris*


Dimensioni. Lunghezza 14-17 cm, apertura alare 30-35 cm





AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

A									

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Calandrella - Greater Short-toed Lark *Calandrella brachydactyla* 272

Dimensioni. Lunghezza 13-14 cm, apertura alare 25-30 cm













AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI

MONTAGNA	COLLINA	PIANURA
		

RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Calandra - Calandra Lark *Melanocorypha calandra*

Dimensioni. Lunghezza x cm, apertura alare x cm












AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

A									

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Calandrina - Lesser Short-toed Lark *Alaudala rufescens*

Dimensioni. Lunghezza 13-14 cm, apertura alare 24-32 cm








adulto





AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

A									

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Topino - Sand Martin *Riparia riparia*

Dimensioni. Lunghezza 12,5-13 cm, apertura alare 26-29 cm



fotocomposizione di un adulto in volo



giovane






individui con rondini




AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Rondine montana - Crag Martin *Ptyonoprogne rupestris*

Dimensioni. Lunghezza 14-15 cm, apertura alare 32-34,5 cm











AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Rondine - Barn Swallow *Hirundo rustica*

Dimensioni. Lunghezza 18-20 cm, apertura alare 33-35 cm



adulto



pulcini nel nido




giovani



♂ adulto

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Balestruccio - Common House Martin *Delichon urbicum*

Dimensioni. Lunghezza 12,5 cm, apertura alare 26-29 cm











AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Rondine rossiccia - Red-rumped Swallow *Cecropis daurica*

Dimensioni. Lunghezza 16-17 cm, apertura alare 32-34 cm





adulto


adulto con giovane





AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Usignolo di fiume - Cetti's Warbler *Cettia cetti*

Dimensioni. Lunghezza 13-14 cm, apertura alare 15-18 cm



adulto con giovane










AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Codibugnolo - Long-tailed Tit *Aegithalos caudatus*

Dimensioni. Lunghezza 13-16 cm, apertura alare 17-19 cm



gruppo alla mangiatoia








individuo della ssp. *caudatus*

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Luì verde - Wood Warbler *Phylloscopus sibilatrix*

Dimensioni. Lunghezza 12-12,7 cm, apertura alare 21-23 cm











AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Luì bianco - Western Bonelli's Warbler *Phylloscopus bonelli*

Dimensioni. Lunghezza 11,5 cm, apertura alare 16-20 cm










AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Luì di Hume - Hume's Leaf Warbler *Phylloscopus humei*

Dimensioni. Lunghezza 10 cm, apertura alare 14,5-20 cm









AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Luì forestiero - Yellow-browed Warbler *Phylloscopus inornatus*


Dimensioni. Lunghezza 10 cm, apertura alare 14,5-20 cm





AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

A									

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Luì di Pallas - Pallas's Leaf Warbler *Phylloscopus proregulus* 286

Dimensioni. Lunghezza 9 cm, apertura alare 12-16,5 cm









AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic


Luì di Radde - Radde's Warbler *Phylloscopus schwarzi*

Dimensioni. Lunghezza 15-21 cm, apertura alare 12-13 cm



AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

A									

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Luì grosso - Willow Warbler *Phylloscopus trochilus*

Dimensioni. Lunghezza 10,5-11,5 cm, apertura alare 16,5-22 cm










AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Luì piccolo - Chiffchaff *Phylloscopus collybita*

Dimensioni. Lunghezza 11-12 cm, apertura alare 16-18 cm














AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Cannareccione - Great Reed Warbler *Acrocephalus arundinaceus*

Dimensioni. Lunghezza 19-20 cm, apertura alare 28-30 cm






individuo con tarabusino





AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Forapaglie castagnolo - Moustached Warbler *Acrocephalus melanopogon*

Dimensioni. Lunghezza 12-13 cm, apertura alare 15-16,5 cm










AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	**VE**	TV	BL	**RO**

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Forapaglie comune - Sedge Warbler *Acrocephalus schoenobaenus*

Dimensioni. Lunghezza 12,5 cm, apertura alare 18-20 cm












AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Cannaiola comune - Reed Warbler *Acrocephalus scirpaceus*

Dimensioni. Lunghezza 13-13,8 cm, apertura alare 19-21 cm












AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Cannaiola verdognola - Marsh Warbler *Acrocephalus palustris*

Dimensioni. Lunghezza 13 cm, apertura alare 18-21 cm










AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Canapino pallido orientale - Eastern Olivaceous Warbler *Iduna pallida*

Dimensioni. Lunghezza 12 cm, apertura alare 18-21 cm










AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

A

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Canapino comune - Melodious Warbler *Hippolais polyglotta*

Dimensioni. Lunghezza 12,5-13,2 cm, apertura alare 19-20 cm











AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Canapino maggiore - Icterine Warbler *Hippolais icterina*

Dimensioni. Lunghezza 13,5 cm, apertura alare 20,5-24 cm











AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	**BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI**	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	**mag**	giu	lug	**ago**	**set**	ott	nov	dic

Forapaglie macchiettato - Grasshopper Warbler *Locustella naevia*

Dimensioni. Lunghezza 12,5 cm, apertura alare 15-19 cm









AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Salciaiola - Savi's Warbler *Locustella luscinioides*

Dimensioni. Lunghezza 14 cm, apertura alare 18-21 cm









AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Beccamoschino - Zitting Cisticola *Cisticola juncidis*

Dimensioni. Lunghezza 10-11 cm, apertura alare 15-16 cm











AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Capinera - Blackcap *Sylvia atricapilla*

Dimensioni. Lunghezza 14-15 cm, apertura alare 21-24 cm







♀ adulta

♂ adulto








♀

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Beccafico - Garden Warbler *Sylvia borin*

Dimensioni. Lunghezza 14-15,5 cm, apertura alare 22-25 cm













AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Bigia padovana - Barred Warbler *Curruca nisoria*

Dimensioni. Lunghezza 15,5 cm, apertura alare 23-27 cm



♂






adulto

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

A									

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Bigiarella - Lesser Whitethroat *Curruca curruca*

Dimensioni. Lunghezza 12,5-13,5 cm, apertura alare 19-21 cm






pullo






AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Bigia grossa occidentale - Western Orphean Warbler *Curruca hortensis*


Dimensioni. Lunghezza 15 cm, apertura alare 20-25 cm





AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

A									

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Occhiocotto - Sardinian Warbler *Curruca melanocephala*

Dimensioni. Lunghezza 13,2-14 cm, apertura alare 18-20 cm



♂



♀




♂






AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Sterpazzolina comune - Eastern Subalpine Warbler *Curruca cantillans*

Dimensioni. Lunghezza 12 cm, apertura alare 15-19 cm





♀ adulta







♂ adulto

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	**BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI**	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Sterpazzola - Common Whitethroat *Curruca communis*

Dimensioni. Lunghezza 14-14,8 cm, apertura alare 21-25 cm






♂

♀




♂




AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Usignolo del Giappone - Red-billed Leiothrix *Leiothrix lutea*

Dimensioni. Lunghezza 14-15 cm, apertura alare - cm













AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Fiorrancino - Firecrest *Regulus ignicapilla*

Dimensioni. Lunghezza 8-9,5 cm, apertura alare 14-15 cm












AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Regolo - Goldcrest *Regulus regulus*

Dimensioni. Lunghezza 8-10 cm, apertura alare 15-16 cm










AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Scricciolo - Winter Wren *Troglodytes troglodytes*

Dimensioni. Lunghezza 9-10 cm, apertura alare 14-17 cm












AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Picchio muratore - Nuthatch *Sitta europaea*

Dimensioni. Lunghezza 12-14,5 cm, apertura alare 22,5-27 cm



adulto con cinciarella








adulto






AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code del canto

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Picchio muraiolo - Wallcreeper *Tichodroma muraria*

Dimensioni. Lunghezza 16,5 cm, apertura alare 27-32 cm











AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO


Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Rampichino alpestre *Certhia familiaris*

Dimensioni. Lunghezza 12,5 cm, apertura alare 15-21 cm













AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO


Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Rampichino comune - Short-toed Treecreeper *Certhia brachydactyla*

Dimensioni. Lunghezza 12-13,5 cm, apertura alare 19-20 cm











AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Storno roseo - Rosy Starling *Pastor roseus*

Dimensioni. Lunghezza 21-22 cm, apertura alare 37-40 cm











adulti

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Storno - Common Starling *Sturnus vulgaris*

Dimensioni. Lunghezza 21-23 cm, apertura alare 37-41 cm



giovane





stormo




adulto in abito estivo



adulto in abito invernale

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Tordo bottaccio - Song Thrush *Turdus philomelos*

Dimensioni. Lunghezza 21,5-23 cm, apertura alare 35-38,5 cm








giovane





AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Tordela - Mistle Thrush *Turdus viscivorus*

Dimensioni. Lunghezza 27 cm, apertura alare 42-47,5 cm











adulto con merlo dal collare

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Tordo sassello - RedwingRedwing *Turdus iliacus*

Dimensioni. Lunghezza 21-25 cm, apertura alare 33-38 cm











AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Merlo - Blackbird *Turdus merula*

Dimensioni. Lunghezza 24-27 cm, apertura alare 36-41 cm



♀ adulta
♂ adulto



giovane




ind. con anomalia piumaggio



AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic


Tordo oscuro - Eyebrowed Thrush *Turdus obscurus*

Dimensioni. Lunghezza 23 cm, apertura alare 36-38 cm



AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

A									

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Cesena - Fieldfare *Turdus pilaris*

Dimensioni. Lunghezza 26-28 cm, apertura alare 41-47 cm





gruppo con storni




ind. con tordo sassello (in basso a ds)






AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	**BOSCHI DI CONIFERE**	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	**BL**	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Merlo dal collare - Ring Ouzel *Turdus torquatus*

Dimensioni. Lunghezza 24-27 cm, apertura alare 42-48 cm



♂♂ adulti della sottospecie *alpestris*




♂ con tordela






AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Tordo golanera - Black-throated Thrush *Turdus atrogularis*

Dimensioni. Lunghezza 25 cm, apertura alare 37-40 cm




♀



♂

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

A									

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO


Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Cesena fosca - Dusky Thrush *Turdus eunomus*

Dimensioni. Lunghezza 23 cm, apertura alare 36-39 cm

♂








♂

individui con tordo golanera

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

A									

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Pigliamosche - Spotted Flycatcher *Muscicapa striata*

Dimensioni. Lunghezza 14-15,8 cm, apertura alare 23-27 cm



giovane




adulti





AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Pettirosso - European Robin *Erithacus rubecula*

Dimensioni. Lunghezza 13-14,5 cm, apertura alare 22-24 cm



giovane

adulto con cinciarella



adulto






adulto



AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Pettazzurro - Bluethroat *Luscinia svecica*

Dimensioni. Lunghezza 14 cm, apertura alare 20-22,5 cm





♀

♂ ssp. *svecica*




♀




♂ ssp. *cyanecula*

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Usignolo maggiore - Thrush Nightingale *Luscinia luscinia*

Dimensioni. Lunghezza 16,5 cm, apertura alare 24-26,5 cm




adulto inanellato



giovane

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI

MONTAGNA	COLLINA	PIANURA
		

RARO **FREQUENTE**

A									

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Usignolo - Common Nightingale *Luscinia megarhynchos*

Dimensioni. Lunghezza 16-17 cm, apertura alare 22-26 cm










AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Codazzurro - Red-flanked Bluetail *Tarsiger cyanurus*

Dimensioni. Lunghezza 14 cm, apertura alare 21-25 cm






♂



AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

A									

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Balia nera - Pied Flycatcher *Ficedula hypoleuca*

Dimensioni. Lunghezza 13-14 cm, apertura alare 22-24 cm








adulto






AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Balia dal collare - Collared Flycatcher *Ficedula albicollis*

Dimensioni. Lunghezza 13 cm, apertura alare 22,5-24,5 cm





♀







♂

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Balia caucasica - Semicollared Flycatcher *Ficedula semitorquata*


Dimensioni. Lunghezza 13 cm, apertura alare 23,5-24 cm





AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

A									

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Pigliamosche pettirosso - Red-breasted Flycatcherie *Ficedula parva*

Dimensioni. Lunghezza 11,5 cm, apertura alare 18,5-21 cm





♀


♂





AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Codirosso spazzacamino - Black Redstart *Phoenicurus ochruros*

Dimensioni. Lunghezza 14,5 cm, apertura alare 23-26 cm



giovane



♀







♂ adulto

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Codirosso comune - Common Redstart *Phoenicurus phoenicurus*

Dimensioni. Lunghezza 14 cm, apertura alare 20,5-24 cm





♀ ♀




♂ adulto



♂ con piumaggio abraso

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO FREQUENTE

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Codirossone - Rock Thrush *Monticola saxatilis*

Dimensioni. Lunghezza 18,5 cm, apertura alare 33-37 cm



♂



♀



♂



♂

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI

MONTAGNA	COLLINA	PIANURA

RARO — FREQUENTE

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Passero solitario - Blue Rock Thrush *Monticola solitarius*

Dimensioni. Lunghezza 20 cm, apertura alare 33-37 cm





♂

♀







♂

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Stiaccino - Whinchat *Saxicola rubetra*

Dimensioni. Lunghezza 12-14 cm, apertura alare 23-26 cm



♀



♂ con culbianco (a sx)







♂ adulto

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Saltimpalo - Stonechat *Saxixola rubicola*

Dimensioni. Lunghezza 12-13,5 cm, apertura alare 20-22 cm



♂ adulto

giovane






♂ adulto



♀ adulta

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Saltimpalo siberiano - Siberian Stonechat *Saxicola maurus*


Dimensioni. Lunghezza x cm, apertura alare x cm





AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

A									

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Culbianco - Northern Wheatear *Oenanthe oenanthe*

Dimensioni. Lunghezza 14-16 cm, apertura alare 27-30 cm



individuo probabile al 1° anno

♂



♀



♂ adulto in autunno




♂ adulto in primavera



AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Monachella orientale- Eastern Black-eared Wheatear *Oenanthe melanoleuca*

Dimensioni. Lunghezza 14,5 cm, apertura alare 25-27 cm



♂ a gola scura



♂ a gola chiara






♂ a gola chiara

♂ a gola scura

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Monachella dorsonero - Pied Wheatear *Oenanthe pleschanka*

Dimensioni. Lunghezza 14,5 cm, apertura alare 25,5-27,5 cm




♀



♂ in abito riproduttivo

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

A									

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Merlo acquaiolo - White-throated Dipper *Cinclus cinclus*

Dimensioni. Lunghezza 18 cm, apertura alare 25,5-30 cm





adulto con giovane




adulto




giovane

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Fringuello alpino - White-winged Snowfinch *Montifringilla nivalis*

Dimensioni. Lunghezza 17 cm, apertura alare 34-38 cm





adulto in estate







adulto in inverno

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Passera mattugia - Tree Sparrow *Passer montanus*

Dimensioni. Lunghezza 13,5-14 cm, apertura alare 22-24 cm





giovane




ibrido p. montanus x p. italiae



adulto

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Passera sarda - Spanish Sparrow *Passer hispaniolensis*

Dimensioni. Lunghezza 15 cm, apertura alare 23-26 cm



♂

♀











♂

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Passera d'Italia - Italian Sparrow *Passer domesticus italiae*

Dimensioni. Lunghezza 15-16 cm, apertura alare 24-26 cm



♀ e ♂





♀ adulta




giovane ♂



♂ adulto

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Passera oltremontana - House Sparrow *Passer domesticus*

Dimensioni. Lunghezza 14-15 cm, apertura alare 21-25,5 cm



♂ in inverno



♀

♂ in estate








AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Bengalino comune - Red Avadavat *Amandava amandava*

Dimensioni. Lunghezza 9,5 cm, apertura alare 13,5-14,5 cm





♂ in volo (composizione 3 immagini)




probabile ♂ in abito invernale



probabile ♀

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

A									

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Sordone - Alpine Accentor *Prunella collaris*

Dimensioni. Lunghezza 18 cm, apertura alare 30-32,5 cm











AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Passera scopaiola - Dunnock *Prunella modularis*

Dimensioni. Lunghezza 14,5-15,1 cm, apertura alare 20-24 cm








individuo con merlo



AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Cutrettola - Yellow Wagtail *Motacilla flava*

Dimensioni. Lunghezza 16,5-18 cm, apertura alare 24-28 cm



♀



giovane



♂ ssp. *Cinereocapilla*)



♂ ssp. *beema*






♂ ssp. *feldegg*




♂ ssp. *thurnbergi*

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI

MONTAGNA	COLLINA	PIANURA
		

RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Cutrettola testagialla - Citrine Wagtail *Motacilla citreola*

Dimensioni. Lunghezza 17 cm, apertura alare 24-27 cm





♂ in abito estivo


probabile ♀





AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO FREQUENTE

A									

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Ballerina gialla - Grey Wagtail *Motacilla cinerea*

Dimensioni. Lunghezza 19,5-21 cm, apertura alare 25-29 cm



adulto (a sinistra)
che imbecca giovane








adulto

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Ballerina bianca - White Wagtail *Motacilla alba*

Dimensioni. Lunghezza 18-20 cm, apertura alare 26-32 cm



Adulto in volo



giovane




adulto in inverno



adulto in estate

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Calandro maggiore - Richard's Pipit *Anthus richardi*


Dimensioni. Lunghezza 18 cm, apertura alare 29-33 cm





AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

A									

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Calandro - Tawny Pipit *Anthus campestris*

Dimensioni. Lunghezza 16,5 cm, apertura alare 25-28 cm











AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Pispola - Meadow Pipit *Anthus pratensis*

Dimensioni. Lunghezza 14-15,8 cm, apertura alare 25-27 cm















AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Prispolone indiano - Olive-backed Pipit *Anthus hodgsoni*


Dimensioni. Lunghezza 15 cm, apertura alare 25-27 cm





AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

A									

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Prispolone - Tree Pipit *Anthus trivialis*

Dimensioni. Lunghezza 15 cm, apertura alare 25-27 cm













AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Pispola golarossa - Red-throated Pipit *Anthus cervinus*

Dimensioni. Lunghezza 15 cm, apertura alare 25-27 cm



probabile ♀ in abito riproduttivo




individuo con cutrettola



probabile ♂ in abito riproduttivo

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Spioncello - Water Pipit *Anthus spinoletta*

Dimensioni. Lunghezza 16-17,8 cm, apertura alare 28-30 cm



adulto in abito invernale



adulto in abito estivo



adulto in abito invernale






adulto in abito invernale

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Fringuello - Chaffinch *Fringilla coelebs*

Dimensioni. Lunghezza 15,5-17,3 cm, apertura alare 26-29 cm





♀

♀ adulta






♂ adulto

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Peppola - Brambling *Fringilla coelebs*

Dimensioni. Lunghezza 15,5-17,3 cm, apertura alare 26-29 cm



♀

♂



♂ in abito invernale

♂ in abito invernale con fringuello







individuo con cardellino

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Frosone - Hawfinch *Coccothraustes coccothraustes*

Dimensioni. Lunghezza 17-18,5 cm, apertura alare 31-34 cm



coppia di adulti



probabile ♀


♂ adulto





AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Ciuffolotto - Bullfinch *Pyrrhula pyrrhula*

Dimensioni. Lunghezza 14,5-16,5 cm, apertura alare 22-29 cm





♀






♂

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Ciuffolotto scarlatto - Common Rosefinch *Carpodacus erythrinus*

Dimensioni. Lunghezza 14,5-15 cm, apertura alare 24-26 cm



individuo al 1° inverno






♂



♂

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

A									

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Verdone - Greenfinch *Chloris chloris*

Dimensioni. Lunghezza 15 cm, apertura alare 24,5-27,5 cm





♂ in parata (sopra a sx) e ♀









♂ adulto

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Fanello - Linnet *Linaria cannabina*

Dimensioni. Lunghezza 13,5, apertura alare 21-25,5 cm



♀






♂ adulto in abito nuziale




individuo al primo anno

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Organetto - Common Redpoll *Acanthis flammea*

Dimensioni. Lunghezza 11,5-14,5 cm, apertura alare 20-25 cm



♂ al 2° anno








AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Organetto minore - Lesser Redpoll *Acanthis cabaret*

Dimensioni. Lunghezza 11,5-14,5 cm, apertura alare 20-25 cm





♂ in abito riproduttivo




♀




giovane

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Crociere - Common Crossbill *Loxia curvirostra*

Dimensioni. Lunghezza 16,5 cm, apertura alare 27-30,5 cm



coppia



♂



♀







giovane

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Cardellino - Goldfinch *Carduelis carduelis*

Dimensioni. Lunghezza 12,5-14 cm, apertura alare 23-25 cm



adulto con giovane (a sinistra)




adulti





AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Venturone alpino - Citril Finch - *Carduelis citrinella*

Dimensioni. Lunghezza 12 cm, apertura alare 22,5-24,5 cm



♀



♂






♂



AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Verzellino - Serin *Serinus serinus*

Dimensioni. Lunghezza 11,5 cm, apertura alare 20-23 cm



♂



♀



♂




individuo (a sx) con fanelli




pullo

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Lucherino - Siskin *Carduelis spinus*

Dimensioni. Lunghezza 11-12,5 cm, apertura alare 21-23 cm



♀



giovane

♂









♂

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Zigolo della Lapponia - Lapland Bunting *Calcarius lapponicus*

Dimensioni. Lunghezza 15-16 cm, apertura alare 25,5-28 cm



♀ in abito riproduttivo



♂ in abito riproduttivo


♂ in abito riproduttivo





AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

A									

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Zigolo delle nevi - Snow Bunting *Plectrophenax nivalis*

Dimensioni. Lunghezza 23 cm, apertura alare 36-39 cm



coppia in abito invernale
♀ a sx



♀ in alto, ♂ in basso






♂ in abito invernale

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Strillozzo - Corn Bunting *Emberiza calandra*

Dimensioni. Lunghezza 18-19,5 cm, apertura alare 29-33 cm






♂



AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Zigolo giallo - Yellowhammer *Emberiza citrinella*

Dimensioni. Lunghezza 16,5-18,5 cm, apertura alare 26-29 cm








probabile ♀




♂ in estate

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Zigolo golarossa - Pine Bunting *Emberiza leucocephalos*

Dimensioni. Lunghezza 16,5 cm, apertura alare 25-30 cm






♂ adulto




AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Zigolo muciatto - Rock Bunting *Emberiza cia*

Dimensioni. Lunghezza 15,5-17,5 cm, apertura alare 24-27 cm





giovane




♂ estate (sotto)






AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Ortolano - Ortolan Bunting *Emberiza hortulana*

Dimensioni. Lunghezza 16-17 cm, apertura alare 23-29 cm



♂ adulto



♂ adulto







♂ adulto

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Zigolo nero - Cirl Bunting *Emberiza cirlus*

Dimensioni. Lunghezza 16,5-17,2 cm, apertura alare 24-27 cm



coppia



♀ adulta




♂adulto



AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Zigolo minore - Little Bunting *Emberiza pusilla*

Dimensioni. Lunghezza 13-14 cm, apertura alare 20-22,5 cm








AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

A									

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Zigolo capinero - Black-headed Bunting *Emberiza melanocephala*

Dimensioni. Lunghezza 16-17 cm, apertura alare 26-30 cm



♂ adulto con codirossone (sopra)




♂ adulto




AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**



QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Migliarino di palude - Reed Bunting *Emberiza schoeniclus*

Dimensioni. Lunghezza 14-15,8 cm, apertura alare 23-26 cm



♀ adulta
in inverno






♂ adulto in
abito invernale


♂ adulto in
abito estivo



AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI





QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Specie di dubbia selvaticità o provenienza

Anatra marmorizzata - Marbled Teal *Marmaronetta angustirostris*


Dimensioni. Lunghezza 39-42 cm, apertura alare 63-67 cm





AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

o

SPECIE DI DUBBIA SELVATICITÀ O PROVENIENZA

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic


Specie aufughe o introdotte

Pernice rossa - Red-legged Partridge *Alectoris rufa*

Dimensioni. Lunghezza 32-34 cm, apertura alare 47-50 cm








coppia





AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE

SPECIE AUFUGA O INTRODOTTA

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Dendrocigna fulva - Fulvous Whistling Duck *Dendrocygna bicolor*


Dimensioni. Lunghezza 45-53 cm, apertura alare 85-93 cm





AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

A									

SPECIE AUFUGA O INTRODOTTA

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Oca indiana - Bar-headed Goose *Anser indicus*

Dimensioni. Lunghezza 71-76 cm, apertura alare 140-160 cm




adulto con oca selvatica

adulti



AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE

SPECIE AUFUGA O INTRODOTTA

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Anatra muta - Muscovy Duck *Cairina moschata*

Dimensioni. Lunghezza 64-86 cm, apertura alare 140-150 cm




adulto



AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE

SPECIE AUFUGA O INTRODOTTA

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Anatra sposa - Wood Duck *Aix sponsa*

Dimensioni. Lunghezza 47-54 cm, apertura alare 70-73 cm





♀


♂ adulto

♂ adulto




AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



SPECIE AUFUGA O INTRODOTTA

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Fischione del Cile - Chiloe Wigeon *Mareca sibilatrix*

Dimensioni. Lunghezza 46-56 cm, apertura alare 75-86 cm




♂ con germano reale



♂

AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE

SPECIE AUFUGA O INTRODOTTA

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Codone delle Bahamas - White-cheeked Pintail *Anas bahamensis*

Dimensioni. Lunghezza 38-51 cm, apertura alare 55-68 cm




♂



AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE

SPECIE AUFUGA O INTRODOTTA

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Ibis eremita - Northern Bald Ibis *Geronticus eremita*

Dimensioni. Lunghezza 70-80 cm, apertura alare 125-135 cm





giovane con adulto

adulto








AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO **FREQUENTE**

SPECIE AUFUGA O INTRODOTTA

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Calopsitta - Cockatiel *Nymphicus hollandicus*

Dimensioni. Lunghezza 29-33 cm, apertura alare 50 cm











AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



SPECIE AUFUGA O INTRODOTTA

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Pappagallino ondulato - Budgerigar *Melopsittacus undulatus*

Dimensioni. Lunghezza 18-20 cm, apertura alare 20 cm










AMBIENTI FREQUENTATI

ROCCIA, RUDERI	URBANO SUBURBANO PARCHI	BOSCHI DI CONIFERE	BOSCHI DI LATIFOGLIE SIEPI	BOSCHI LITORANEI
ALBERATURE CESPUGLIETI CON RADURE	CAMPAGNA SCARSAMENTE ALBERATA	AREE APERTE ARIDE PRATI RADURE	ZONE UMIDE FIUMI, LAGHI CORSI D'ACQUA	MARE LITORALI



RARO — FREQUENTE



SPECIE AUFUGA O INTRODOTTA

QR code della vocalizzazione

NIDIFICAZIONE

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

SVERNAMENTO

VR	VI	PD	VE	TV	BL	RO

Fenologia

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Airone bianco maggiore 180
Airone cenerino 178
Airone guardabuoi 177
Airone rosso 179
Airone schistaceo 182
Albanella minore 203
Albanella pallida 202
Albanella reale 201
Albastrello 119
Allocco 218
Allocco degli Urali 219
Allodola 269
Allodola golagialla 271
Alzavola 28
Anatra mandarina 20
Anatra marmorizzata 394
Anatra muta 399
Anatra sposa 400
Aquila anatraia maggiore 194
Aquila anatraia minore 193
Aquila di mare 206
Aquila imperiale 196
Aquila minore 195
Aquila reale 197
Assiolo 214
Astore 199
Averla capirossa 247
Averla cenerina 245
Averla isabellina 244
Averla maggiore 246
Averla piccola 243
Avocetta 83
Avvoltoio monaco 191
Balestruccio 278
Balia caucasica 336
Balia dal collare 335
Balia nera 334
Ballerina bianca 360
Ballerina gialla 359
Barbagianni 210
Basettino 267
Beccaccia 108
Beccaccia di mare 81
Beccaccino 111
Beccafico 302
Beccamoschino 300
Beccapesci 145
Beccofrusone 259
Bengalino comune 354
Berta grigia 162
Berta maggiore 161
Berta minore 163
Biancone 192
Bigia grossa occidentale 305
Bigia padovana 303
Bigiarella 304
Calandra 273
Calandrella 272
Calandrina 274
Calandro 362
Calandro maggiore 361
Calopsitta 404
Canapiglia 24
Canapino comune 296
Canapino maggiore 297
Canapino pallido orientale 295
Cannaiola comune 293
Cannaiola verdognola 294
Cannareccione 290
Capinera 301
Capovaccaio 188
Cappellaccia 270
Cardellino 378
Casarca 19
Cavaliere d’Italia 82
Cesena 324
Cesena fosca 327
Chiurlo maggiore 94
Chiurlo piccolo 93
Cicogna bianca 165
Cicogna nera 164
Cigno minore 15
Cigno nero 13
Cigno reale 14
Cigno selvatico 16
Cincia alpestre 263
Cincia bigia 262
Cincia dal ciuffo 261
Cincia mora 260
Cinciallegra 265
Cinciarella 264
Ciuffolotto 371
Ciuffolotto scarlatto 372
Civetta 212
Civetta capogrosso 211
Civetta nana 213
Codazzurro 333
Codibugnolo 281
Codirosso comune 339
Codirosso spazzacamino 338
Codirossone 340
Codone 27
Codone delle Bahamas 402
Colombaccio 62
Colombella 61
Combattente 99
Cormorano 168
Cornacchia grigia 257
Cornacchia nera 256
Corriere di Leschenault 91
Corriere grosso 88
Corriere piccolo 89
Corvo comune 255
Corvo imperiale 258
Coturnice 52
Croccolone 110
Crociere 377
Cuculo 59
Cuculo dal ciuffo 58
Culbianco 345
Cutrettola 357
Cutrettola testagialla 358
Dendrocigna fulva 397
Edredone 35
Fagiano comune 50
Fagiano di monte 48
Falaropo beccolargo 114
Falaropo beccosottile 113
Falco cuculo 234
Falco della regina 235
Falco di palude 200
Falco pecchiaiolo 189
Falco pellegrino 240
Falco pescatore 185
Fanello 374
Fenicottero 78
Fenicottero minore 79
Fiorrancino 310
Fischione 25
Fischione del Cile 401
Fistione turco 29
Folaga 69
Forapaglie castagnolo 291
Forapaglie comune 292
Forapaglie macchiettato 298
Francolino di monte 45
Fraticello 146
Fratino 90
Fringuello 368
Fringuello alpino 349
Frosone 370
Frullino 109
Gabbianello 130
Gabbiano comune 129
Gabbiano corallino 132
Gabbiano corso 131

Gabbiano di Bonaparte 128
Gabbiano di Pallas 133
Gabbiano di Sabine 126
Gabbiano glauco 137
Gabbiano reale 140
Gabbiano reale nordico 138
Gabbiano reale pontico 139
Gabbiano roseo 127
Gabbiano tridattilo 125
Gallina prataiola 57
Gallinella d'acqua 68
Gallo cedrone 47
Gambecchio comune 106
Gambecchio frullino 100
Gambecchio nano 102
Garzetta 181
Gavina 134
Gavina americana 135
Gazza 250
Germano reale 26
Gheppio 233
Ghiandaia 249
Ghiandaia marina 221
Gipeto 187
Gobbo della Giamaica 43
Gobbo rugginoso 44
Gracchio alpino 253
Gracchio corallino 252
Grifone 190
Grillaio 232
Gru 72
Gruccione 223
Gufo comune 215
Gufo di palude 216
Gufo reale 217
Ibis eremita 403
Ibis sacro 170
Labbo 154
Labbo codalunga 155
Lanario 238
Lodolaio 237
Lucherino 381
Luì bianco 283
Luì di Hume 284
Luì di Pallas 286
Luì di Radde 287
Luì forestiero 285
Luì grosso 288
Luì piccolo 289
Luì verde 282
Marangone dal ciuffo 169
Marangone minore 167
Martin pescatore 222
Marzaiola 21
Marzaiola americana 22
Merlo 322
Merlo acquaiolo 348
Merlo dal collare 325
Mestolone 23
Migliarino di palude 392
Mignattaio 171
Mignattino alibianche 150
Mignattino comune 151
Mignattino piombato 149
Monachella dorsonero 347
Monachella orientale 346
Moretta 33
Moretta codona 38
Moretta dal collare 32
Moretta grigia 34
Moretta tabaccata 31
Moriglione 30
Mugnaiaccio 136
Nibbio bianco 186
Nibbio bruno 205
Nibbio reale 204
Nitticora 175
Nocciolaia 251
Oca collorosso 6
Oca colombaccio 5
Oca del Canada 7
Oca egiziana 17
Oca facciabianca 8
Oca granaiola della tundra 10
Oca indiana 398
Oca lombardella 11
Oca lombardella minore 12
Oca selvatica 9
Occhiocotto 306
Occhione 80
Orchetto marino 37
Orco marino 36
Organetto 375
Organetto minore 376
Ortolano 388
Pantana 122
Pappagallino ondulato 405
Parrocchetto dal collare 242
Parrocchetto monaco 241
Passera d'Italia 352
Passera mattugia 350
Passera oltremontana 353
Passera sarda 351
Passera scopaiola 356
Passero solitario 341
Pavoncella 84
Pellicano comune 183
Pellicano rossiccio 184
Pendolino 266
Peppola 369
Pernice bianca 46
Pernice di mare 123
Pernice di mare orientale 124
Pernice rossa 396
Pesciaiola 40
Pettazzurro 330
Pettegola 118
Pettirosso 329
Picchio cenerino 231
Picchio muraiolo 314
Picchio muratore 313
Picchio nero 229
Picchio rosso maggiore 228
Picchio rosso mezzano 226
Picchio rosso minore 227
Picchio tridattilo 225
Picchio verde 230
Piccione di città 60
Pigliamosche 328
Pigliamosche pettirosso 337
Piovanello comune 101
Piovanello maggiore 98
Piovanello pancianera 104
Piovanello pettorale 107
Piovanello tridattilo 103
Piovanello violetto 105
Piro piro boschereccio 120
Piro piro culbianco 116
Piro piro del Terek 112
Piro piro piccolo 115
Pispola 363
Pispola golarossa 366
Pittima minore 95
Pittima reale 96
Piviere dorato 85
Piviere orientale 86
Piviere tortolino 92
Pivieressa 87
Poiana 209
Poiana calzata 207
Poiana codabianca 208
Porciglione 65
Prispolone 365
Prispolone indiano 364
Pulcinella di mare 156
Quaglia 51

Quattrocchi 39
Rampichino alpestre 315
Rampichino comune 316
Re di quaglie 66
Regolo 311
Rigogolo 248
Rondine 277
Rondine montana 276
Rondine rossiccia 279
Rondone comune 55
Rondone maggiore 54
Rondone pallido 56
Sacro 239
Salciaiola 299
Saltimpalo 343
Saltimpalo siberiano 344
Schiribilla 71
Schiribilla grigiata 70
Scricciolo 312
Sgarza ciuffetto 176
Smergo maggiore 41
Smergo minore 42
Smeriglio 236
Sordone 355
Sparviere 198
Spatola 172
Spioncello 367
Starna 49
Stercorario maggiore 152
Stercorario mezzano 153
Sterna codalunga 148
Sterna comune 147
Sterna di Rueppell 144
Sterna maggiore 143
Sterna zampenere 142
Sterpazzola 308
Sterpazzolina comune 307
Stiaccino 342
Storno 318
Storno roseo 317
Strillozzo 384
Strolaga beccogiallo 160
Strolaga maggiore 159
Strolaga mezzana 158
Strolaga minore 157
Succiacapre 53
Sula 166
Svasso collorosso 74
Svasso cornuto 76
Svasso maggiore 75
Svasso piccolo 77
Taccola 254
Tarabusino 174
Tarabuso 173
Topino 275
Torcicollo 224
Tordela 320
Tordo bottaccio 319
Tordo golanera 326
Tordo oscuro 323
Tordo sassello 321
Tortora dal collare 64
Tortora selvatica 63
Totano moro 121
Totano zampegialle minore 117
Tottavilla 268
Tuffetto 73
Upupa 220
Usignolo 332
Usignolo del Giappone 309
Usignolo di fiume 280
Usignolo maggiore 331
Venturone alpino 379
Verdone 373
Verzellino 380
Volpoca 18
Voltapietre 97
Voltolino 67
Zafferano 141
Zigolo capinero 391
Zigolo della Lapponia 382
Zigolo delle nevi 383
Zigolo giallo 385
Zigolo golarossa 386
Zigolo minore 390
Zigolo muciatto 387
Zigolo nero 389

Alpine Accentor 355
Alpine Chough 253
Alpine Swift 54
Arctic Skua 154
Arctic Tern 148
Audouin's Gull 131
Baillon's Crake 70
Bar-headed Goose 398
Barn Owl 210
Barn Swallow 277
Barnacle Goose 8
Barred Warbler 303
Bar-tailed Godwit 95
Bearded Reedling 267
Bee-eater 223
Bewick's Swan 15
Bittern 173
Black Grouse 48
Black Kite 205
Black Redstart 338
Black Stork 164
Black Swan 13
Black Tern 151
Black Vulture 191
Black Woodpecker 229
Blackbird 322
Blackcap 301
Black-headed Bunting 391
Black-headed Gull 129
Black-legged Kittiwake 125
Black-necked Grebe 77
Black-shouldered Kite 186
Black-tailed Godwit 96
Black-throated Diver 158
Black-throated Thrush 326
Black-winged Pratincole 124
Black-winged Stilt 82
Blue Rock Thrush 341
Blue Tit 264
Bluethroat 330
Blue-winged Teal 22
Bohemian Waxwing 259
Bonaparte's Gull 128
Booted Eagle 195
Brambling 369
Brent Goose 5
Broad-billed Sandpiper 100
Budgerigar 405
Bullfinch 371
Calandra Lark 273
Canada Goosee 7
Capercaillie 47
Carrion Crow 256
Caspian Gull 139
Caspian Tern 143
Cattle Egret 177
Cetti's Warbler 280
Chaffinch 368
Chiffchaff 289
Chiloe Wigeon 401
Cirl Bunting 389
Citril Finch 379
Citrine Wagtail 358
Coal Tit 260
Cockatiel 404
Collared Dove 64
Collared Flycatcher 335
Collared Pratincole 123
Common Buzzard 209
Common Crane 72
Common Crossbill 377
Common Eider 35
Common Gull 134
Common Kestrel 233
Common Nightingale 332
Common Pheasant 50
Common Pochard 30
Common Quail 51
Common Raven 258
Common Redpoll 375
Common Redshank 118
Common Restart 339
Common Ringed Plover 88
Common Rosefinch 372
Common Sandpiper 115
Common Scoter 37
Common Shelduck 18
Common Snipe 111
Common Starling 318
Common Swift 55
Common Tern 147
Common Whitethroat 308
Coot 69
Corn Bunting 384
Corncrake 66
Crag Martin 276
Crested Lark 270
Crested Tit 261
Cuckoo 59
Curlew 94
Curlew Sandpiper 101
Dotterel 92
Dunlin 104
Dunnock 356
Dusky Thrush 327
Eagle Owl 217
Eastern Black-eared Wheatear 346
Eastern Olivaceous Warbler 295
Eastern Subalpine Warbler 307
Egyptian Goose 17
Egyptian Vulture 188
Eleonora's Falcon 235
Eurasian Spoonbill 172
Eurasian Teal 28
Eurasian Treecreeper 315
Eurasian Wigeon 25
European Robin 329
Eyebrowed Thrush 323
Feral Pigeon 60
Ferruginous Duck 31
Fieldfare 324
Firecrest 310
Fulvous Whistling Duck 397
Gadwall 24
Garden Warbler 302
Garganey 21
Glaucous Gull 137
Glossy Ibis 171
Goldcrest 311
Golden Eagle 197
Golden Oriole 248
Golden Plover 85
Goldeneye 39
Goldfinch 378
Goosander 41
Goshawk 199
Grasshopper Warbler 298
Great Black-backed Gull 136
Great Black-headed Gull 133
Great Cormorant 168
Great Crested Grebe 75
Great Egret 180
Great Grey Shrike 246
Great Northern Diver 159
Great Reed Warbler 290
Great Skua 152
Great Snipe 110
Great Spotted Cuckoo 58
Great Spotted Eagle 194
Great Spotted Woodpecker 228
Great Tit 265
Greater Flamingo 78
Greater Sandplover 91
Greater Scaup 34
Greater Short-toed Lark 272
Green Sandpiper 116

Green Woodpecker 230
Greenfinch 373
Greenshank 122
Grey Heron 178
Grey Partridge 49
Grey Phalarope 114
Grey Plover 87
Grey Wagtail 359
Grey-headed Woodpecker 231
Greylag Goose 9
Griffon Vulture 190
Gull-billed Tern 142
Hawfinch 370
Hazel Grouse 45
Hen Harrier 201
Herring Gull 138
Hobby 237
Honey Buzzard 189
Hooded Crow 257
Hoopoe 220
Horned Lark 271
House Martin 278
House Sparrow 353
Hume's Leaf Warbler 284
Icterine Warbler 297
Imperial Eagle 196
Isabelline Shrike 244
Italian Sparrow 352
Jack Snipe 109
Jackdaw 254
Jay 249
Kentish Plover 90
Kingfisher 222
Knot 98
Lammergeier 187
Lanner 238
Lapland Bunting 382
Lesser Black-backed Gull 141
Lesser Crested Tern 144
Lesser Flamingo 79
Lesser Grey Shrike 245
Lesser Kestrel 232
Lesser Redpoll 376
Lesser Short-toed Lark 274
Lesser Spotted Eagle 193
Lesser Spotted Woodpecker 227
Lesser White-fronted Goose 12
Lesser Whitethroat 304
Lesser Yellowlegs 117
Linnet 374
Little Bittern 174
Little Bunting 390
Little Bustard 57
Little Crake 71
Little Egret 181
Little Grebe 73
Little Gull 130
Little Owl 212
Little Ringed Plover 89
Little Stint 106
Little Tern 146
Long-eared Owl 215
Long-legged Buzzard 208
Long-tailed Duck 38
Long-tailed Skua 155
Long-tailed Tit 281
Magpie 250
Mallard 26
Mandarin Duck 20
Marbled Teal 394
Marsh Harrier 200
Marsh Sandpiper 119
Marsh Tit 262
Marsh Warbler 294
Meadow Pipit 363
Mediterranean Gull 132
Melodious Warbler 296
Merlin 236
Middle Spotted Woodpecker 226
Mistle Thrush 320
Monk Parakeet 241
Montagu's Harrier 203
Moorhen 68
Moustached Warbler 291
Muscovy Duck 399
Mute Swan 14
Night Heron 175
Nightjar 53
Northern Bald Ibis 403
Northern Gannet 166
Northern Lapwing 84
Northern Wheatear 345
Nuthatch 313
Olive-backed Pipit 364
Ortolan Bunting 388
Osprey 185
Oystercatcher 81
Pacific Golden Plover 86
Pallas's Leaf Warbler 286
Pallid Harrier 202
Pallid Swift 56
Pectoral Sandpiper 107
Penduline Tit 266
Peregrine Falcon 240
Pied Avocet 83
Pied Flycatcher 334
Pied Wheatear 347
Pine Bunting 386
Pink-backed Pelican 184
Pintail 27
Pomarine Skua 153
Puffin 156
Purple Heron 179
Purple Sandpiper 105
Pygmy Cormorant 167
Pygmy Owl 213
Radde's Warbler 287
Red Avadavat 354
Red Kite 204
Red-backed Shrike 243
Red-billed Chough 252
Red-billed Leiothrix 309
Red-breasted Flycatcher 337
Red-breasted Goose 6
Red-breasted Merganser 42
Red-crested Pochard 29
Red-flanked Bluetail 333
Red-footed Falcon 234
Red-legged Partridge 396
Red-necked Grebe 74
Red-necked Phalarope 113
Red-rumped Swallow 279
Red-throated Diver 157
Red-throated Pipit 366
Redwing 321
Reed Bunting 392
Reed Warbler 293
Richard's Pipit 361
Ring Ouzel 325
Ring-billed Gull 135
Ring-necked Duck 32
Rock Bunting 387
Rock Partridge 52
Rock Ptarmigan 46
Rock Thrush 340
Roller 221
Rook 255
Rose-ringed Parakeet 242
Rosy Starling 317
Rough-legged Buzzard 207
Ruddy Duck 43
Ruddy Shelduck 19
Ruff 99
Sabine's Gull 126
Sacred Ibis 170
Saker Falcon 239

Sand Martin 275
Sanderling 103
Sandwich Tern 145
Sardinian Warbler 306
Savi's Warbler 299
Scopoli's Shearwater 161
Scops Owl 214
Sedge Warbler 292
Semicollared Flycatcher 336
Serin 380
Shag 169
Short-eared Owl 216
Short-toed Eagle 192
Short-toed Treecreeper 316
Shoveler 23
Siberian Stonechat 344
Siskin 381
Skylark 269
Slavonian Grebe 76
Slender-billed Gull 127
Smew 40
Snow Bunting 383
Song Thrush 319
Sooty Shearwater 162
Spanish Sparrow 351
Sparrowhawk 198
Spotted Crake 67
Spotted Flycatcher 328
Spotted Nutcracker 251
Spotted Redshank 121
Squacco Heron 176
Stock Dove 61
Stonechat 343
Stone-curlew 80
Tawny Owl 218
Tawny Pipit 362
Temminck's Stint 102
Tengmalm's Owl 211
Terek Sandpiper 112
Three-toed Woodpecker 225
Thrush Nightingale 331
Tree Pipit 365
Tree Sparrow 350
Tufted Duck 33
Tundra Bean Goose 10
Turnstone 97
Turtle Dove 63
Ural Owl 219
Velvet Scoter 36
Wallcreeper 314
Water Pipit 367
Water Rail 65
Western Bonelli's Warbler 283
Western Orphean Warbler 305
Western Reef Heron 182
Whimbrel 93
Whinchat 342
Whiskered Tern 149
White Pelican 183
White Stork 165
White Wagtail 360
White-cheeked Pintail 402
White-fronted Goose 11
White-headed Duck 44
White-tailed Eagle 206
White-throated Dipper 348
White-winged Snowfinch 349
White-winged Tern 150
Whooper Swan 16
Willow Tit 263
Willow Warbler 288
Winter Wren 312
Wood Duck 400
Wood Pigeon 62
Wood Sandpiper 120
Wood Warbler 282
Woodchat Shrike 247
Woodcock 108
Woodlark 268
Wryneck 224
Yelkouan Shearwater 163
Yellow Wagtail 357
Yellow-billed Diver 160
Yellow-browed Warbler 285
Yellowhammer 385
Yellow-legged Gull 140
Zitting Cisticola 300

Acanthis cabaret 376
Acanthis flammea 375
Accipiter gentilis 199
Accipiter nisus 198
Acrocephalus arundinaceus 290
Acrocephalus melanopogon 291
Acrocephalus palustris 294
Acrocephalus schoenobaenus 292
Acrocephalus scirpaceus 293
Actitis hypoleucos 115
Aegithalos caudatus 281
Aegolius funereus 211
Aegypius monachus 191
Aix galericulata 20
Aix sponsa 400
Alauda arvensis 269
Alaudala rufescens 274
Alcedo atthis 222
Alectoris graeca 52
Alectoris rufa 396
Alopochen aegyptiaca 17
Amandava amandava 354
Anas acuta 27
Anas bahamensis 402
Anas crecca 28
Anas platyrhynchos 26
Anser albifrons 11
Anser anser 9
Anser erythropus 12
Anser indicus 398
Anser serrirostris 10
Anthus campestris 362
Anthus cervinus 366
Anthus hodgsoni 364
Anthus pratensis 363
Anthus richardi 361
Anthus spinoletta 367
Anthus trivialis 365
Apus apus 55
Apus pallidus 56
Aquila chrysaetos 197
Aquila heliaca 196
Ardea alba 180
Ardea cinerea 178
Ardea purpurea 179
Ardenna grisea 162
Ardeola ralloides 176
Arenaria interpres 97
Asio flammeus 216
Asio otus 215
Athene noctua 212
Aythya collaris 32
Aythya ferina 30
Aythya fuligula 33
Aythya marila 34
Aythya nyroca 31
Bombycilla garrulus 259
Botaurus stellaris 173
Branta bernicla 5
Branta canadensis 7
Branta leucopsis 8
Branta ruficollis 6
Bubo bubo 217
Bubulcus ibis 177
Bucephala clangula 39
Burhinus oedicnemus 80
Buteo buteo 209
Buteo lagopus 207
Buteo rufinus 208
Cairina moschata 399
Calandrella brachydactyla 272
Calcarius lapponicus 382
Calidris alba 103
Calidris alpina 104
Calidris canutus 98
Calidris falcinellus 100
Calidris ferruginea 101
Calidris maritima 105
Calidris melanotos 107
Calidris minuta 106
Calidris pugnax 99
Calidris temminckii 102
Calonectris diomedea 161
Caprimulgus europaeus 53
Carduelis carduelis 378
Carduelis citrinella 379
Carpodacus erythrinus 372
Cecropis daurica 279
Certhia brachydactyla 316
Certhia familiaris 315
Cettia cetti 280
Charadrius alexandrinus 90
Charadrius dubius 89
Charadrius hiaticula 88
Charadrius leschenaultii 91
Charadrius morinellus 92
Chlidonias hybrida 149
Chlidonias leucopterus 150
Chlidonias niger 151
Chloris chloris 373
Chroicocephalus genei 127
Chroicocephalus philadelphia 128
Chroicocephalus ridibundus 129
Ciconia ciconia 165
Ciconia nigra 164
Cinclus cinclus 348
Circaetus gallicus 192
Circus aeruginosus 200
Circus cyaneus 201
Circus macrourus 202
Circus pygargus 203
Cisticola juncidis 300
Clamator glandarius 58
Clanga clanga 194
Clanga pomarina 193
Clangula hyemalis 38
Coccothraustes coccothraustes 370
Columba livia for. domestica 60
Columba oenas 61
Columba palumbus 62
Coracias garrulus 221
Corvus corax 258
Corvus cornix 257
Corvus corone 256
Corvus frugilegus 255
Corvus monedula 254
Coturnix coturnix 51
Crex crex 66
Cuculus canorus 59
Curruca cantillans 307
Curruca communis 308
Curruca curruca 304
Curruca hortensis 305
Curruca melanocephala 306
Curruca nisoria 303
Cyanistes caeruleus 264
Cygnus atratus 13
Cygnus columbianus 15
Cygnus cygnus 16
Cygnus olor 14
Delichon urbicum 278
Dendrocopos major 228
Dendrocoptes medius 226
Dendrocygna bicolor 397
Dryobates minor 227
Dryocopus martius 229
Egretta garzetta 181
Egretta gularis 182
Elanus caeruleus 186
Emberiza calandra 384
Emberiza cia 387
Emberiza cirlus 389
Emberiza citrinella 385
Emberiza hortulana 388
Emberiza leucocephalos 386
Emberiza melanocephala 391

Emberiza pusilla 390
Emberiza schoeniclus 392
Eremophila alpestris 271
Erithacus rubecula 329
Falco biarmicus 238
Falco cherrug 239
Falco columbarius 236
Falco eleonorae 235
Falco naumanni 232
Falco peregrinus 240
Falco subbuteo 237
Falco tinnunculus 233
Falco vespertinus 234
Ficedula albicollis 335
Ficedula hypoleuca 334
Ficedula parva 337
Ficedula semitorquata 336
Fratercula arctica 156
Fringilla coelebs 368
Fringilla montifringilla 369
Fulica atra 69
Galerida cristata 270
Gallinago gallinago 111
Gallinago media 110
Gallinula chloropus 68
Garrulus glandarius 249
Gavia adamsii 160
Gavia arctica 158
Gavia immer 159
Gavia stellata 157
Gelochelidon nilotica 142
Geronticus eremita 403
Glareola nordmanni 124
Glareola pratincola 123
Glaucidium passerinum 213
Grus grus 72
Gulosus aristotelis 169
Gypaetus barbatus 187
Gyps fulvus 190
Haematopus ostralegus 81
Haliaeetus albicilla 206
Hieraaetus pennatus 195
Himantopus himantopus 82
Hippolais icterina 297
Hippolais polyglotta 296
Hirundo rustica 277
Hydrocoloeus minutus 130
Hydroprogne caspia 143
Ichthyaetus audouinii 131
Ichthyaetus ichthyaetus 133
Ichthyaetus melanocephalus 132
Iduna pallida 295
Ixobrychus minutus 174
Jynx torquilla 224
Lagopus muta 46
Lanius collurio 243
Lanius excubitor 246
Lanius isabellinus 244
Lanius minor 245
Lanius senator 247
Larus argentatus 138
Larus cachinnans 139
Larus canus 134
Larus delawarensis 135
Larus fuscus 141
Larus hyperboreus 137
Larus marinus 136
Larus michahellis 140
Leiothrix lutea 309
Limosa lapponica 95
Limosa limosa 96
Linaria cannabina 374
Locustella luscinioides 299
Locustella naevia 298
Lophophanes cristatus 261
Loxia curvirostra 377
Lullula arborea 268
Luscinia luscinia 331
Luscinia megarhynchos 332
Luscinia svecica 330
Lymnocryptes minimus 109
Lyrurus tetrix 48
Mareca penelope 25
Mareca sibilatrix 401
Mareca strepera 24
Marmaronetta angustirostris 394
Melanitta fusca 36
Melanitta nigra 37
Melanocorypha calandra 273
Melopsittacus undulatus 405
Mergellus albellus 40
Mergus merganser 41
Mergus serrator 42
Merops apiaster 223
Microcarbo pygmaeus 167
Milvus migrans 205
Milvus milvus 204
Monticola saxatilis 340
Monticola solitarius 341
Montifringilla nivalis 349
Morus bassanus 166
Motacilla alba 360
Motacilla cinerea 359
Motacilla citreola 358
Motacilla flava 357
Muscicapa striata 328
Myiopsitta monachus 241
Neophron percnopterus 188
Netta rufina 29
Nucifraga caryocatactes 251
Numenius arquata 94
Numenius phaeopus 93
Nycticorax nycticorax 175
Nymphicus hollandicus 404
Oenanthe melanoleuca 346
Oenanthe oenanthe 345
Oenanthe pleschanka 347
Oriolus oriolus 248
Otus scops 214
Oxyura jamaicensis 43
Oxyura leucocephala 44
Pandion haliaetus 185
Panurus biarmicus 267
Parus major 265
Passer domesticus 353
Passer hispaniolensis 351
Passer italiae 352
Passer montanus 350
Pastor roseus 317
Pelecanus onocrotalus 183
Pelecanus rufescens 184
Perdix perdix 49
Periparus ater 260
Pernis apivorus 189
Phalacrocorax carbo 168
Phalaropus fulicarius 114
Phalaropus lobatus 113
Phasianus colchicus 50
Phoeniconaias minor 79
Phoenicopterus roseus 78
Phoenicurus ochruros 338
Phoenicurus phoenicurus 339
Phylloscopus bonelli 283
Phylloscopus collybita 289
Phylloscopus humei 284
Phylloscopus inornatus 285
Phylloscopus proregulus 286
Phylloscopus schwarzi 287
Phylloscopus sibilatrix 282
Phylloscopus trochilus 288
Pica pica 250
Picoides tridactylus 225
Picus canus 231
Picus viridis 230
Platalea leucorodia 172
Plectrophenax nivalis 383

Plegadis falcinellus 171
Pluvialis apricaria 85
Pluvialis fulva 86
Pluvialis squatarola 87
Podiceps auritus 76
Podiceps cristatus 75
Podiceps grisegena 74
Podiceps nigricollis 77
Poecile montanus 263
Poecile palustris 262
Porzana porzana 67
Prunella collaris 355
Prunella modularis 356
Psittacula krameri 242
Ptyonoprogne rupestris 276
Puffinus yelkouan 163
Pyrrhocorax graculus 253
Pyrrhocorax pyrrhocorax 252
Pyrrhula pyrrhula 371
Rallus aquaticus 65
Recurvirostra avosetta 83
Regulus ignicapilla 310
Regulus regulus 311
Remiz pendulinus 266
Riparia riparia 275
Rissa tridactyla 125
Saxicola maurus 344
Saxicola rubetra 342
Saxicola rubicola 343
Scolopax rusticola 108
Serinus serinus 380
Sitta europaea 313
Somateria mollissima 35
Spatula clypeata 23
Spatula discors 22
Spatula querquedula 21
Spinus spinus 381
Stercorarius longicaudus 155
Stercorarius parasiticus 154
Stercorarius pomarinus 153
Stercorarius skua 152
Sterna hirundo 147
Sterna paradisaea 148
Sternula albifrons 146
Streptopelia decaocto 64
Streptopelia turtur 63
Strix aluco 218
Strix uralensis 219
Sturnus vulgaris 318
Sylvia atricapilla 301
Sylvia borin 302
Tachybaptus ruficollis 73
Tachymarptis melba 54
Tadorna ferruginea 19
Tadorna tadorna 18
Tarsiger cyanurus 333
Tetrao urogallus 47
Tetrastes bonasia 45
Tetrax tetrax 57
Thalasseus bengalensis 144
Thalasseus sandvicensis 145
Threskiornis aethiopicus 170
Tichodroma muraria 314
Tringa erythropus 121
Tringa flavipes 117
Tringa glareola 120
Tringa nebularia 122
Tringa ochropus 116
Tringa stagnatilis 119
Tringa totanus 118
Troglodytes troglodytes 312
Turdus atrogularis 326
Turdus eunomus 327
Turdus iliacus 321
Turdus merula 322
Turdus obscurus 323
Turdus philomelos 319
Turdus pilaris 324
Turdus torquatus 325
Turdus viscivorus 320
Tyto alba 210
Upupa epops 220
Vanellus vanellus 84
Xema sabini 126
Xenus cinereus 112
Zapornia parva 71
Zapornia pusilla 70



Verona birdwatching

www.veronabirdwatching.org

BIRDING VENETO

www.birdingveneto.eu

VENEZIA BIRDWATCHING

www.veneziabirdwatching.eu