

Primo svernamento italiano di Piro piro del Terek *Xenus cinereus* in Sicilia.

A. Ciaccio e A. Corso

Tra il 17 dicembre 1994 e l'11 marzo 1995 un individuo adulto ha sostato alla foce del Simeto (Catania). Il soggetto, in perfette condizioni fisiche, si manteneva di preferenza solitario.

• Si tratta del primo caso di svernamento per l'Italia ed il terzo per l'Europa.

Presenza invernale di Falaropo beccosottile *Phalaropus lobatus* in provincia di Foggia

E. Arcamone, N. Baccetti, M. Basso, L. Serra e M. Zenatello

Presenza invernale di un singolo individuo nella Riserva naturale Salina di Margherita di Savoia (22.1.93), affiancato da altre osservazioni (2.10.93, 19.3.94, 13.9.94, 16.3.95) che farebbero supporre il ripetersi dell'interessante evento nei due inverni successivi. Il soggetto frequentava vasche salanti parzialmente allagate, in associazione a Piovanello pancianera *Calidris alpina* e Gambecchio *Calidris minuta*.

• La specie è di comparsa regolare in questa salina durante le migrazioni (aprile-maggio e agosto-settembre) ma lo svernamento è un fatto occasionale in tutto il paese.

Avvistamento di Falaropo beccolargo *Phalaropus fulicarius* in Sicilia ed in Emilia-Romagna

(1) A. Corso (2) R. Tinarelli

(1) Dal 22 febbraio al 7 aprile 1995 un individuo del 1° inverno è stato osservato nelle saline di Priolo (Siracusa).

(2) Il 14 giugno 1996 è stata osservata una femmina in abito nuziale nella parte meridionale delle Valli di Comacchio (Ravenna).

• Si tratta della 3° segnalazione siciliana; l'ultima è avvenuta nel dicembre 1976.

Avvistamento di Stercorario maggiore *Stercorarius skua* in provincia di Venezia

F. Scarton e S. Borella

Il 15 luglio 1994 è stato osservato un immaturo in Val di Brenta, laguna meridionale di Venezia, disturbato in volo da un gruppo di Gabbiani reali *Larus cachinnans*.

• Dovrebbe trattarsi della prima segnalazione per la laguna di Venezia.

Avvistamento di Gabbiano corallino *Larus melanocephalus* in provincia di Pavia

F. Ferlini

Il 6 novembre 1994 è stato osservato un individuo adulto in abito non-riproduttivo sul Po a Bastida Pancarana (Pavia) in compagnia di alcuni Gabbiani comuni *Larus ridibundus*.

• Le segnalazioni di questa specie nelle acque interne della pianura padana sono piuttosto rare e irregolari.

Osservazione invernale di Mignattino *Chlidonias niger* in Sicilia

R. Ientile

Il 3 gennaio 1996 in provincia di Siracusa è stato osservato un individuo in abito riproduttivo.

• Le presenze invernali di questa specie sono rare e irregolari in Italia.

Osservazione invernale di Cuculo *Cuculus canorus* in Lombardia

L. Dotti e M. Pavia

Il 9 dicembre 1994 lungo la sponda orientale del lago di Garda, in loc. Monte Pomo, nel comune di Garda (Verona), è stato udito ripetutamente il canto di un Cuculo in un pendio esposto ad ovest coperto da una boscaglia xerotermica.

• Si dovrebbe trattare della prima segnalazione invernale della specie in Italia.

Presenze invernali di Rondone *Apus apus* in Toscana e Sicilia

(1) A. Corso, (2) P. Giovacchini

(1) Tra il 26 dicembre 1994 e l'11 gennaio 1995 è stato osservato un individuo nelle vicinanze delle Saline di Siracusa. In date ripetute del gennaio 1995 sono stati osservati 3-4 individui presso il porto di Catania.

(2) Il 13 gennaio 1996 un individuo è stato osservato per circa un ora compiere voli bassi in prossimità di una costruzione abbandonata nei pressi di Bocca d'Ombrone (Grosseto).

• Specie rara e irregolare in inverno nel nostro paese.