

Associazione Faunisti Veneti
(Redattori: Maurizio Sighele, Mauro Bon, Emiliano Verza)

RAPPORTO ORNITOLOGICO PER LA REGIONE VENETO.
ANNO 2010

Riassunto. Si riportano, in ordine sistematico, le più interessanti osservazioni ornitologiche del 2010 raccolte nella regione Veneto relative a svernamento, nidificazione, migrazione, erratismi, anomalie, fenomeni apparentemente insoliti ecc. I dati di maggior rilievo riguardano la presenza fino ad aprile di un lui di Hume al Lido di Venezia, già segnalato dalla fine del 2009, e il passaggio di un nibbio bianco in provincia di Treviso, già confermati dalla COI, l'osservazione durante la migrazione di rapaci occasionali come aquila anatraia minore, lanario, sacro e falco della Regina, la presenza invernale di poiana calzata, aquila anatraia maggiore e strolaga maggiore, nuove segnalazioni di specie marine quali sula, gabbiano di Pallas, stercoario mezzano, labbo e soprattutto stercoario maggiore, lo svernamento di numerose oche lombardelle accompagnate da specie accidentali quali oca facciabianca, oca collarosso e oca lombardella minore, la comparsa autunnale di gallina prataiola, calandra, calandro maggiore e pigliamosche pettirosso, le molteplici nidificazioni di cuculo dal ciuffo e ghiandaia marina. Una segnalazione di corriere di Leschenault è in attesa di conferma da parte della COI.

Summary. *Ornithological report for the year 2010 in the Veneto region (NE Italy).*

Significative records concerning bird wintering, breeding and migration in 2010 are given in systematic order. The most interesting records include the presence of a Hume's Warbler until the end of April (first reported at the end of 2009) and of a Black-shouldered Kite (already accepted by COI); occasional migrating raptors such as Lesser Spotted Eagle, Lanner, Saker and Eleonora's Falcon; wintering Rough-legged Buzzard, Spotted Eagle and Great Northern Diver; new sightings of marine species such as Gannet, Great Black-headed Gull, Pomarine, Arctic and, most notably, Great Skuas. Large numbers of wintering White-fronted Geese were accompanied by occasional sightings of Barnacle, Red-breasted and Lesser White-fronted Geese; numerous breedings of Great Spotted Cuckoo and Roller were recorded, as well as autumn appearances of Little Bustard, Calandra Lark, Richard's Pipit and Red-breasted Flycatcher. One sighting of Greater Sand Plover is still awaiting confirmation from COI.

Sono qui riportate le segnalazioni ritenute più significative del 2010 relative a 166 specie di uccelli in categoria A e C della check list italiana (FRACASSO et al., 2009) e 13 specie allocotone e/o fuggite da cattività, oltre a 4 ibridi. Le osservazioni sono state selezionate sulla base della loro importanza a livello regionale, senza trascurare le peculiarità locali.

Dove non è diversamente descritto, per ogni specie elencata vengono indicate tutte le segnalazioni raccolte o giunte in redazione.

I dati provengono sia da censimenti e progetti organizzati, sia da osservazioni sporadiche e personali, parte delle quali sono già state rese pubbliche nelle mailing list ornitologiche locali e nazionali o nei siti web dedicati; in calce al dato viene riportata la fonte principale con un numero di nota: [1] Verona BW; [2] Venezia BW; [3] EBN Italia; [4] ornitho.it. Con "censimenti IW" si indica un dato raccolto durante i monitoraggi degli acquatici svernanti.

In conformità con FRACASSO et al. (2011), la sequenza e la tassonomia seguono la check list degli uccelli italiani per i non-Passeriformi (FRACASSO et al., 2009) mentre si è tenuto conto delle nuove acquisizioni sistematiche per quanto concerne i Passeriformi (SANGSTER et al., 2010). Per i nomi italiani delle specie esotiche si è fatto riferimento a VIOLANI & BARBAGLI (2006) e MASSA (2000).

ELENCO SISTEMATICO DELLE SPECIE

Anseriformes**Anseridae****Cigno reale *Cygnus olor***

Si elencano individui marcati.

1 ind. a Silea (TV) il 28 febbraio, marcato con collare italiano "IBAB" (F. Mezzavilla [4]). Il collare era stato applicato alla foce dell'Isonzo (GO) nell'agosto 2006 e in seguito l'ind. era stato osservato sul Sile a Treviso nel novembre 2007 e proprio a Silea nel febbraio 2008 (archivio ISPRA).

1 ind. marcato con collare italiano "ICAJ" a Ceggia (VE) il 26 gennaio e a San Donà di Piave (VE) il 14 giugno (G. Sgorlon). Il collare era stato applicato alla Foce dell'Isonzo (GO) nell'agosto 2008 e in seguito l'ind. era stato osservato proprio a San Donà di Piave e a Cessalto (TV) nel maggio 2009 (archivio ISPRA).

Cigno nero *Cygnus atratus*

8 indd. in Valle Perera (VE) l'11 gennaio (E. Stival, R. Faè).

7 indd. in Valle Zignago (VE) l'11 gennaio (M. Basso).

1 ind. in Valle Dragojesolo (VE) il 12 gennaio (M. Basso).

1 ind. in Valle Segà (RO) il 23 marzo e 1 ind. in Valle Moraro (RO) il 24 marzo (D. Trombin, M. Veronese, A. Bocchi).

1 cp. in corteggiamento in Valle Ripiego (RO) il 9 aprile (M. Carnacina, D. Trombin [3]).

1 ind. in Valle Ca' Zuliani (RO) tra il 6 novembre e il 14 dicembre (F. Piccolo, M. Veronese et al. [3]).

1 ind. in Po di Maistra (RO) il 23 novembre (A. Bocchi, L. Boscain).

1 ind. a Treviso il 19 dicembre (R. Storer [4]).

Oca granaiola *Anser fabalis*

Si elencano concentrazioni consistenti.

20 indd. a Brussa, Caorle (VE), il 18 febbraio (G. Sgorlon [2][3]).

50-200 indd. nei pressi di Valle Zignago (VE) almeno tra fine dicembre e febbraio 2011 (M. Azzolini, F. Piccolo, L. Panzarin, G. Sgorlon et al. [2][3]).

Oca lombardella *Anser albifrons*

Si elencano concentrazioni consistenti.

1.000 indd. ca. in Valle Zignago (VE) l'11 gennaio (M. Basso).

903 indd. in volo sopra Vallesina, Ca' Noghera (VE), il 14 febbraio (E. Stival [2][3]).

2.000 indd. ca. nei pressi di Valle Zignago (VE) a metà dicembre (D. Fasano [2]). Le presenze sono progressivamente aumentate con 9.000 indd. ca. alla fine di dicembre, segnalazioni poi proseguite fino ai primi di marzo 2011 (M. Azzolini, F. Piccolo, L. Panzarin, P. Vacilotto, G. Sgorlon, G. Silveri et al. [2][3]). 1 ind. era parzialmente leucistico.

Oca lombardella minore *Anser erythropus*

1 ad. tra Sindacale e Valle Zignago (VE) tra il 31 dicembre e il 5 gennaio 2011 (M. Azzolini, E. Stival, R. Lerco, L. Panzarin [2][3]) (fig. 1). Si tratta della seconda segnalazione per il Veneto e la provincia di Venezia, la precedente in Valle Dogà il 7 ottobre 1939, mentre un'altra dal Padovano è ritenuta dubbia (ARRIGONI DEGLI ODDI, 1929; SEMENZATO & SCARTON, 1998).

Oca selvatica *Anser anser*

Si elencano concentrazioni consistenti e un individuo marcato.

806 indd. in Valle Zignago (VE) l'11 gennaio (M. Basso).

1.722 indd. in Laguna di Venezia il 12 gennaio, di cui 790 indd. in Valle Dragojesolo (censimenti IW).
46 indd. a Brussa, Caorle (VE) il 18 febbraio, di cui 1 ind. con collare slovacco (G. Sgorlon).
80-90 indd. a Lancenigo di Villorba (TV) il 26 dicembre (L. Boscain [2]).

Oca facciabianca *Branta leucopsis*

1 ind. di probabile origine aufuga è stato nuovamente osservato sul Piave a Cimadolmo (TV) il 19 maggio (F. Zanatta - cfr. SIGHELE et al., 2009, 2010).
2 indd. nei pressi di Valle Zignago (VE) almeno tra il 29 dicembre e i primi di marzo 2011 (M. Azzolini, F. Piccolo, L. Panzarin et al. [2][3]).

Oca colorosso *Branta ruficollis*

1 ind. in Valle Zignago (VE) il 6 febbraio (S. Colavitti [2][3]).
1 ind. nei pressi di Valle Zignago (VE) almeno il 30 e il 31 dicembre; successivamente sono stati osservati 1-4 indd. fino a marzo 2011 (M. Azzolini, F. Piccolo, E. Stival, L. Panzarin et al. [2][3]).
Sono ora sei le segnalazioni venete di questa specie, escludendo i refusi di pubblicazione, l'ultima risaliva al 1987 (BRICHETTI & LO VALVO, 1992; M. Azzolini, com. pers.).

Casarca *Tadorna ferruginea*

4 indd. in Valle Zignago (VE) l'11 gennaio (M. Basso) e 4 indd. in Laguna sud di Venezia il giorno successivo (G. Tormen, S. De Col, M. Zenatello, F. Piccolo).
1 ind. alla Busa di Giaretta, Carmignano sul Brenta (PD), il 19 febbraio (F. Calore [4]).

Volpoca *Tadorna tadorna*

Si elencano concentrazioni consistenti.

8.318 indd. in Laguna di Venezia il 12 gennaio, di cui 4.274 indd. in Valle Dogà (censimenti IW).
4.810 indd. in Valle Ca' Zuliani (RO) il 22 gennaio (P. Ronconi, M. Veronese).

Fischione *Anas penelope*

Si elencano concentrazioni consistenti e una segnalazione in periodo inusuale.

19.947 indd. in Laguna di Venezia il 12 gennaio, di cui 10.234 indd. in Valle Dragojesolo (M. Basso, L. Piva).
37.549 indd. in Valle Canocchione-Moraro (RO) il 22 gennaio (A. Bocchi, D. Trombin).
1 cp. in Valle Ripiego (RO) il 12 maggio e 1 ind. l'8 giugno (L. Zanella, C. Cavaliere, D. Trombin, L. Bedin).
33.638 indd. in Valle Ripiego (RO) il 26 ottobre (A. Bocchi, D. Trombin).

Canapiglia *Anas strepera*

Si elencano concentrazioni consistenti e dati inerenti la riproduzione.

268 indd. in Valle Dogà (VE) il 12 gennaio (M. Bon, L. Panzarin).
Nidifica da alcuni anni con circa 30 cpp. nel Delta del Po (RO), in particolare nelle valli di Porto Tolle (E. Verza, com. pers.); nel 2010 ha colonizzato anche le Valli Morosina e Cannelle (D. Trombin, E. Verza et al.).
532 indd. in Valle Ca' Pisani (RO) il 26 ottobre e 950 indd. in Po di Maistra il 14 dicembre (A. Bocchi, D. Trombin et al.).

Alzavola *Anas crecca*

Si elencano concentrazioni consistenti.

64.746 indd. in Laguna di Venezia il 12 gennaio, di cui 27.770 indd. in Valle Serraglia (censimenti IW).
7.400-8.680 indd. in Valle Ca' Zuliani (RO) tra il 23 novembre e il 28 dicembre (censimenti Sagittaria).

Germano reale *Anas platyrhynchos*

Si elencano concentrazioni consistenti.

58.034 indd. in Laguna di Venezia il 12 gennaio, di cui 14.446 indd. in Valle Dogà (censimenti IW).
14.253 indd. in Valle Sacchetta (RO) il 28 settembre (D. Trombin, R. Giubilato).

Codone *Anas acuta*

Si elencano concentrazioni consistenti e una segnalazione in periodo inusuale.

11.899 indd. in Laguna di Venezia il 12 gennaio, di cui 11.534 indd. in Valle Dogà (censimenti IW).
1 ind. in Valle Sacchetta (RO) l'8 giugno (L. Bedin, L. Zanella).
892 indd. in Valle Ca' Zuliani (RO) il 10 novembre (A. Bocchi, A. Farioli).

Mestolone *Anas clypeata*

Si elencano concentrazioni consistenti.

5.354 indd. in Valle Ca' Zuliani (RO) il 23 novembre e 5.450 indd. il 14 dicembre (I. Beltrami, A. Favaretto, F. Fioravanti).

Fistione turco *Netta rufina*

Specie di presenza regolare, nidificante localizzata e irregolare, si elencano gli unici siti di nidificazione dell'anno e concentrazioni consistenti.

51 indd. in Laguna di Caorle (VE) l'11 gennaio (censimenti IW).

Anche durante il 2010 sono stati osservati numerosi indd. lungo la costa orientale del Lago di Garda (VR). 47 indd. nei pressi di Malcesine e altri 12 indd. nel Basso Garda il 17 gennaio (censimenti IW), quindi 36 indd. su tutta la costa benacense veronese il 21 febbraio (M. Sighele, V. Fanelli) e 31 indd. il 27 marzo (M. Sighele, A. Mosele). Successivamente è stata accertata la nidificazione a Lido Ronchi, Castelnuovo del Garda, e a Campagnola, Malcesine (VR), con l'osservazione di pulli al seguito di adulti (D. Bernasconi, C. Zanini [1]). Dopo l'estate è stato riscontrato un progressivo aumento delle presenze, con 57 indd. contati a Lazise il 24 ottobre (M. Sighele, M. Allen [1]) e 13-19 indd. a nord di Malcesine tra novembre e dicembre (D. Bernasconi et al. [1]).

6-11 indd. al Laghetto del Frassino, Peschiera del Garda (VR), per tutto il mese di aprile (M. & G. Sighele, D. Bernasconi et al. [1]).

Ha nuovamente nidificato anche a Valle Vecchia di Caorle (VE): corteggiamenti alla fine di marzo, presenza di pulli a partire da maggio, con un totale di almeno 4 nidiate con 23 pulli l'1 giugno (G. Sgorlon, P. Vacilotto [3]), juv. riconosciuti in seguito almeno fino a fine agosto (M. Pegorer [2][3]). In questo sito la specie è stata osservata tutto l'anno, con la presenza di 30-32 indd. il 14 ottobre (L. Boscain, G. Basso [2][3]).

Ha nidificato per la prima volta anche in provincia di Rovigo, con la presenza di 1 cp. con 3 pulli in Valle Passarella il 7 giugno (D. Trombin, A. Bocchi [3]).

Moriglione *Aythya ferina*

Si elencano concentrazioni consistenti.

1.600 indd. in Valle Morosina (VE) il 12 gennaio (N. Baccetti, L. Sattin).

2.454 indd. in Valle Canocchione (RO) l'11 novembre (D. Trombin, A. Bocchi).

700 indd. ca. al Laghetto del Frassino, Peschiera del Garda (VR), tra il 26 dicembre e gennaio 2011 (D. Bernasconi, R. Lerco, M. Sighele et al. [1]).

Moretta tabaccata *Aythya nyroca*

Si elencano i casi di svernamento, le presenze in periodo riproduttivo, i siti inusuali e i gruppi più consistenti.

1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) l'11 gennaio (N. Baccetti, U.M. Veken), presenza di oltre 20 indd. il 5 marzo,

con 1 cp. in corteggiamento il 31 marzo (L. Boscain, G. Sgorlon et al. [2][3]). In seguito la specie ha certamente nidificato, con la presenza di 1 juv. da poco involato l'8 luglio (G. Sgorlon [2][3]). Successivamente qui sono stati segnalati 1 ind. il 13 novembre e 5 indd. il 3 dicembre (P. Vacilotto, L. Boscain [2][3]).

4-5 indd. al Lago di Busche (BL) tra il 4 e il 7 marzo (N. Barp, M.E. Bibelia, G. Silveri [3]).

24 indd. a Lido Ronchi, Castelnuovo del Garda (VR), il 4 marzo (D. Bernasconi [1]).

16 indd. alla Busa di Giarretta, Carmignano sul Brenta (PD), il 26 marzo (F. Calore [4]).

10 indd. in Valle Ca' Zuliani (RO) l'11 ottobre (E. Verza).

Aythya ferina* x *Aythya nyroca

1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 3 dicembre, forse lo stesso osservato nel settembre 2009 (L. Boscain [2][3] – cfr. SIGHELE et al., 2010).

1 ind. al Laghetto del Frassino, Peschiera del Garda (VR), il 30 dicembre (R. Lerco [1][3]).

Moretta *Aythya fuligula*

Specie svernante regolare, nidificante scarsa, si elencano concentrazioni consistenti e un nuovo sito di nidificazione.

2.650 indd. al Laghetto del Frassino, Peschiera del Garda (VR), il 24 gennaio (M. Sighele et al. [1]).

Nidificazione accertata ai primi di agosto al laghetto del Vincheto di Celarda (BL), con due nidiate di 6 pulli ognuna, e al Lago di Busche (BL), con una nidiate di 4 pulli (N. Barp, M.E. Bibelia [4]).

2.500 indd. al Laghetto del Frassino, Peschiera del Garda (VR), il 30 e 31 dicembre (R. Lerco, M. & G. Sighele et al. [1]).

Moretta grigia *Aythya marila*

1 m. in Val di Sogno, Malcesine (VR), tra l'1 gennaio e il 21 febbraio (E. Cavallini, M. Sighele, V. Fanelli [1]).

1-3 indd. al Laghetto del Frassino, Peschiera del Garda (VR), tra il 9 gennaio e il 6 febbraio, quindi 7-8 indd. tra il 21 febbraio e il 28 marzo (M. Sighele, P. Bertini, C. Zanini et al. [1]).

2 mm. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 21 marzo, 2 mm. e 1 f. il 25 e il 28 marzo, 1 cp. il 31 marzo (P. Vacilotto, A. Nardo, U.M. Veken, L. Boscain, G. Sgorlon [2][3]).

1 m. al Laghetto del Frassino, Peschiera del Garda (VR), il 31 dicembre (M. & G. Sighele et al. [1]).

Aythya fuligula* x *Aythya marila

1 ind. a Montalto, Nogara (VR), dal 25 al 27 maggio (E. Cavallini [1]).

Moretta codona *Clangula hyemalis*

1 ind. al Laghetto del Frassino, Peschiera del Garda (VR), dal 30 dicembre fino ai primi di aprile 2011 (R. Lerco, M. & G. Sighele, M. D'Offria et al. [1][3]).

Orchetto marino *Melanitta nigra*

10 indd. alla foce del Brenta (VE) il 28 marzo (A. Tonelli - MORUS, 2010).

1 ind. in mare sul litorale Po di Maistra - Po di Pila (RO) il 28 dicembre (D. Trombin).

Orco marino *Melanitta fusca*

Specie migratrice e svernante regolare, ma piuttosto scarsa, si elencano le uniche osservazioni relative al periodo invernale.

2 indd. nel golfo di Peschiera del Garda (VR) tra l'1 e il 10 gennaio (M. & G. Sighele, A. Mosele, C. Izzo, P. Bertini [1]).

3 indd. nel golfo di Peschiera del Garda (VR) dal 4 al 26 dicembre, quindi 1 solo ind. tra il 28 dicembre e marzo 2011 (C. Izzo, D. Bernasconi, P. Bertini et al. [1][3]).

Quattrocchi *Bucephala clangula*

Si elencano concentrazioni consistenti, in siti dove peraltro la specie sverna regolarmente da diversi anni (BON & SEMENZATO, 2002; BON et al., 2003 e 2009).

38 indd. in Valle Dragojesolo (VE) il 12 gennaio (M. Basso, L. Piva).

16 indd. al Lago di Santa Croce (BL) il 27 gennaio (G. Tormen).

16 indd. a Fornaci, Peschiera del Garda (VR), l'8 febbraio (G. Piotti [4]).

Pesciola *Mergus albellus*

1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 5 marzo (L. Boscain [2][3]).

Smergo minore *Mergus serrator*

Si elenca una concentrazione consistente.

110 indd. in Sacca di Scardovari (RO) il 15 gennaio (censimenti Sagittaria).

Smergo maggiore *Mergus merganser*

Si elencano una concentrazione consistente, le osservazioni al di fuori delle province di Treviso e Belluno (dove la specie è osservata tutto l'anno e nidificante) e le informazioni di recente acquisizione dalla provincia di Vicenza, dove la specie si riproduce almeno dal 2004 (M. Zenatello, G. Fracasso, com. pers.).

1 f. con pulli investita in Valsugana, loc. Forte Tombion (VI), il 22 maggio (I. Farronato, L. Carlotto); nella stessa zona sono state accertate altre 3 nidificazioni.

75-77 indd. in due gruppi al Lago del Corlo, Arsìè (BL), il 17 agosto e 35 indd. il 31 agosto (N. Barp, M.E. Bibella [4]). Il Lago del Corlo rappresenta il primo sito di nidificazione della specie in Italia, dove probabilmente confluiscono, dopo il periodo riproduttivo, anche gli indd. dei territori limitrofi (G. Silveri, M. Zenatello, com. pers.).

1 ind. a Malcesine (VR) l'8 dicembre (M. Pratesi [3]).

4 indd. nei pressi di Torri del Benaco (VR) il 30 dicembre (L. Mazzola [1]).

Gobbo della Giamaica *Oxyura jamaicensis*

1 ind. in Valle Ca' Zuliani (RO) l'11 ottobre (D. Trombin, A. Bocchi). Si tratta della prima segnalazione per la provincia di Rovigo, la quarta per il Veneto (MORBIOLI & SIGHELE, 2006; BON et al., 2009; SIGHELE et al., 2009).

Gaviiformes**Gaviidae****Strolaga minore *Gavia stellata***

4 indd. nel litorale del Lido di Venezia (VE) il 13 gennaio (S. Castelli, M.G. Mitri).

1 ind. alla Laguna del Mort, Eraclea Mare (VE), il 9 novembre e 2 indd. il 13 e il 14 novembre (A. Sartori, L. Boscain, G. Sgorlon [2]).

Strolaga mezzana *Gavia arctica*

Specie migratrice e svernante regolare nell'area costiera nord-adriatica e sul Lago di Garda, si elencano la concentrazione più consistente e una presenza in periodo inusuale.

118 indd. sul Garda orientale (VR) il 17 gennaio: 4 indd. nel golfo di Peschiera del Garda e 114 indd. a nord di Torri del Benaco (censimenti IW [1][3]).

1 ind. recuperato debilitato a Pramaggiore (VE) e subito liberato a Casale sul Sile (TV) il 17 giugno (L. Panzarin). Lo stesso ind., riconosciuto per alcuni particolari grazie a fotografie, è stato poi osservato a Lanzoni, Musile di Piave (VE), il 22 giugno (E. Stival [2][3]).

Strolaga maggiore *Gavia immer*

1 ind. nel golfo di Peschiera del Garda (VR) tra Lido Fornaci e Maraschina tra il 7 e il 24 gennaio (C. Izzo, P. Bertini, M. Sighele et al.). Lo stesso individuo era stato osservato inizialmente in provincia di Brescia a Padenghe il 26 dicembre 2009, dove è stato segnalato anche il 6 febbraio. Si tratta della terza segnalazione per il Lago di Garda, la seconda per il Veronese dopo quella del 30 dicembre 1898 (ARRIGONI DEGLI ODDI, 1899).

Pelecaniformes

Sulidae

Sula Morus bassanus

1 subad. a Jesolo Lido (VE) il 13 maggio (E. Stival [2][3]).

1 subad. osservato in volo prima a Valle Vecchia, quindi a Porto Santa Margherita e infine a Eraclea Mare (VE) il 22 maggio (G. Sgorlon, F. Mezzavilla, F. Piccolo [2][3]).

1 subad. a Sottomarina, Chioggia (VE), il 31 ottobre (F. Piccolo, A. Tonelli [3]).

Phalacrocoracidae

Cormorano *Phalacrocorax carbo*

Si elencano concentrazioni consistenti.

1.445 ind. in alimentazione in Laguna di Caleri (RO) il 27 febbraio (D. Trombin, M. Veronese).

2.500 ind. in volo sulle valli di Porto Viro e 700 ind. in Valle Moraro (RO) il 12 ottobre (A. Bocchi, F. Piccolo, L. Bedin, L. Zanella).

Marangone dal ciuffo *Phalacrocorax aristotelis*

Si elenca una concentrazione consistente.

115 ind. al Lido di Venezia il 5 dicembre (S. Castelli [2][3]).

Marangone minore *Phalacrocorax pygmeus*

Si elencano concentrazioni consistenti e un sito confermato di nidificazione.

540 ind. in Laguna di Venezia il 12 gennaio (censimenti IW).

Nidificazione nuovamente accertata nell'Oasi Cave Gaggio Nord di Marcon (VE), con la stima di 18 nidi attivi a partire almeno dai primi di aprile; successivamente osservati 144 ind. di cui 44 juvv. l'1 luglio (M. Chillon). Nel 2009 in questo sito era stata censita 1 sola cp. (cf. SIGHELE et al., 2010).

220 ind. nella garzaia della Piombisa, Valle Dogà (VE), il 19 giugno (E. Stival).

3.202 ind. ai roost Carpano e Tolle (RO) il 12 novembre (censimenti Sagittaria).

Ciconiiformes

Ardeidae

Nitticora *Nycticorax nycticorax*

Si elencano concentrazioni consistenti al di fuori del periodo riproduttivo e una segnalazione invernale al di fuori dell'ambiente costiero.

75 indd. in Valle Dogà (VE) il 12 gennaio (M. Bon, L. Panzarin).

84 indd. lungo l'Adige tra il ponte sulla Romea e la foce (VE) il 14 gennaio (P. Ronconi, A. Targa).

2 indd. alla Palude del Busatello (VR) il 15 gennaio (F. Novelli).

95 indd. nel roost del Po di Maistra (RO) il 13 settembre (D. Trombin, L. Bedin [3]).

Sgarza ciuffetto *Ardeola ralloides*

Si elenca una concentrazione consistente.

78 indd. nel roost del Po di Maistra (RO) il 13 settembre (D. Trombin, L. Bedin [3]).

Airone guardabuoi *Bubulcus ibis*

Si elencano solo le osservazioni di gruppi di almeno 250 unità al di fuori del periodo riproduttivo.

280 indd. a Villafranca di Verona il 10 gennaio e 250 indd. tra Povegliano e Villafranca (VR) il 19 marzo (E. Cavallini [1]).

200-270 indd. nei dintorni di Isola della Scala (VR) tra il 22 settembre e il 30 ottobre (M. & G. Sighele, R. Lerco et al. [1]).

346 indd. al roost di Ca' Cornera (RO) il 24 novembre (P. Ronconi).

300 indd. in roost notturno a Castelfranco Veneto (TV) il 30 dicembre (G. Silveri [4]).

Garzetta *Egretta garzetta*

Si elenca una concentrazione consistente.

1.660 indd. ca. nel roost del Po di Maistra (RO) il 13 settembre (D. Trombin, L. Bedin [3]).

***Egretta* sp.**

1 ind. con piumaggio grigio-bruno, verosimile ibrido *Egretta garzetta* x *Egretta gularis*, a Vallesina, Favaro Veneto (VE), tra il 15 luglio e il 12 agosto (E. Stival).

Airone bianco maggiore *Casmerodius albus*

Si elencano una concentrazione consistente, un individuo marcato e le segnalazioni di individui con caratteristiche delle parti nude della ssp. *modestus*.

1 ind. a Campagnamagra, Vigasio (VR), il 27 gennaio, con caratteristiche della ssp. *modestus*, probabilmente lo stesso ind. osservato il 23 dicembre 2009 (A. Mosele [1]) – cfr. SIGHELE et al., 2010).

1 ind. in Valle Ripiego (RO) il 9 aprile, con caratteristiche della ssp. *modestus* (M. Carnacina, D. Trombin).

950 indd. nel roost del Po di Maistra (RO) il 13 settembre (D. Trombin, L. Bedin [3]).

1 ind. in Valle Sagreda (RO) il 7 ottobre, marcato con anello colorato ungherese (M. Basso).

Ciconiidae

Cicogna nera *Ciconia nigra*

- 3 indd. a Cittadella (PD) il 26 marzo (P. Vacilotto [3]).
 2 indd. alle Grave di Ciano (TV) il 2 aprile e 3 indd. il 28 aprile (G. Silveri [3]).
 1 ind. sopra Ca' Pisani (RO) il 7 aprile (M. Bocchi [4]).
 2 indd. a Ponte San Felice, Trichiana (BL) il 16 giugno (M. Villa [4]).
 1 indd. sopra il Lago del Corlo (BL) il 20 giugno (G. Silveri).
 1 ind. in volo a Lentiai (BL) il 31 luglio (L. Mezzomo [4]).
 1 ind. sulle colline moreniche del Garda (VR/MN/BS) il 18 agosto, 2 indd. il 30 agosto, 1 ind. l'1 settembre e 2 indd. il 2 settembre (A. Gargioni, D. Lampugnani, F. Ornaghi et al.).
 1 ind. sui Colli Asolani (TV/BL) il 20 agosto, 1 ind. il 29 agosto, 2 indd. l'1 settembre, 3 indd. il 6 settembre (F. Mezzavilla, G. Silveri et al. [3]).
 3 indd. a Santa Lucia dei Monti, Valeggio (VR), il 22 agosto e 1 ind. il 5 settembre (R. Rigon, A.M. Kleiber, M. Bertella, P. Bertini).
 1 ind. sul Monte Castello, Grezzana (VR), il 29 agosto (C. Izzo, R. Lerco et al. [1]).
 1 ind. a Moriago della Battaglia (TV) il 29 settembre e in seguito 1 ind. alle Grave di Ciano e 1 ind. tra Crocetta del Montello e Montebelluna (TV) il 21 ottobre (G. Silveri [3]).
 3 indd. a Cendon, Silea (TV), il 3 ottobre (F. Mezzavilla [4]).

Cicogna bianca *Ciconia ciconia*

Si elencano una segnalazione invernale e individui marcati.

- 7 indd. ai Prai di Castello di Godego (TV) il 21 gennaio (G. Silveri [4]).
 2 indd. con anello italiano a Preganziol (TV) il 12 luglio (P. Zampieri), uno dei quali, con anello "IASN", era stato inanellato nel marzo 2003 a Sant'Elena di Silea (TV), dove era stato più volte segnalato fino all'ottobre 2004 (archivio ISPRA) e aveva anche nidificato in zona a Consco, Casale sul Sile (P. Vacilotto, com. pers.).

Threskiornithidae

Mignattaio *Plegadis falcinellus*

- 1 ind. nelle Valli di Chioggia (VE) il 14 marzo (L. Sattin [2]).
 2 indd. nella garzaia di Valle Figheri (VE) il 15 marzo (fide L. Sattin [2]).
 3 indd. tra Ca' Bianca e Ca' Pasqua (VE) nella terza decade di marzo (E. Stival [2][3]).
 1 ind. in Ca' Pisani (RO) il 16 aprile (R. Maistri [4]).
 1 ind. in Valle Bagliona, Porto Levante (RO), il 17 aprile (D. Trombin, E. Verza [3]).
 1 ind. alla foce del Po di Gnocca (RO) il 30 aprile (D. Trombin et al. [3]).
 La specie ha certamente nidificato con 2 cpp. nell'Oasi Cave Gaggio Nord di Marcon (VE), grazie all'osservazione dapprima dell'allestimento del nido a partire da metà maggio, quindi a quella di un primo pullo il 26 giugno, infine per la presenza di 8 indd., tra cui 5 juvv., l'1 agosto (M. Pegorer, P. Ugo, M. Chillon [2][3]). Nell'oasi e nella vicina Ca' Noghera 1-7 indd. sono stati osservati inizialmente dal 2 maggio e successivamente fino al 4 settembre (L. Busatto, M. Chillon, E. Stival, A. Luchetta [2][3]).
 2 indd. a Pegolotte di Cona (VE) il 16 maggio (A. Tonelli).
 1 ind. in Valle Sacchetta (RO) il 26 maggio (C. Cavaliere, P. Ronconi, D. Trombin, M. Veronese).
 2 indd. a Lio Piccolo (VE), il 6 agosto (E. Stival [2][3]).
 1 ind. in Sacca di Scardovari (RO) il 5 e il 19 settembre (A. Ravagnani, R. Maistri [3]).
 2 indd. a Vo' Pindemonte, Isola della Scala (VR), il 20 settembre, poi 14 indd. dal 21 al 26 settembre (A. Mosele, A. Pigozzo et al. [1]).
 1 ind. in Valle Ghebo Storto (PD) il 5 dicembre (L. Sattin [2]).

Ibis sacro *Threskiornis aethiopicus*

- 1 ind. in Sacca di Scardovari (RO) il 10 gennaio (A. Ravagnani, F. Gardosi [4]).
4 indd. a Ronco all'Adige (VR) il 28 gennaio (I. Falco [1]).
10 indd. al roost di Ca' Dolfin (RO) il 15 febbraio (L. Bedin).
1 ind. in Po di Venezia (RO) il 20 aprile (A. Bocchi, M. Bovo).
2 indd. a Ronco all'Adige (VR) il 20 maggio (I. Falco [1]).
2 indd. a Erbè (VR) il 20 e il 21 giugno (M. Cavallini, U. Monicelli [1]).
1 ind. nella Cassa di Colmata D-E (VE) il 23 giugno e 2 indd. il 21 settembre (F. Scarton, M. Baldin [2][3]).

Spatola *Platalea leucorodia*

Si elencano concentrazioni consistenti e individui marcati.

- 57 indd. in Laguna di Venezia il 12 gennaio, di cui 37 indd. in Valle Dogà (censimenti IW).
55 indd. in Valle Ca' Zuliani (RO) il 17 e il 22 gennaio (G. Zogno, P. Ronconi, M. Veronese [3]).
1 ind. a Lio Piccolo, Cavallino-Treporti (VE), il 4 febbraio, marcato con anello italiano "IDLD" (S. Zampedri [3]).
Era stato inanellato da pullo a Comacchio (FE) nel maggio 2009 (archivio ISPRA).
1 ind. marcato con anello italiano "IFLF" a Ca' Noghera (VE) tra il 2 e il 20 agosto (E. Stival [2][3]) e 1 ind. marcato con anello italiano "IFSF" a Venezia tra il 22 e il 24 agosto (O. Trebbi [4]). Erano stati inanellati da pulli a Comacchio (FE) nel maggio 2010 (archivio ISPRA).
125 indd. in Valle San Carlo (RO) il 13 settembre (M. Carnacina, M. Pattavina, D. Trombin).
71-111 indd. in Valle Ca' Zuliani (RO) tra il 28 settembre e il 10 novembre (A. Bocchi, A. Farioli).

Phoenicopteriformes**Phoenicopteridae****Fenicottero *Phoenicopus roseus***

Si elencano concentrazioni consistenti, segnalazioni inusuali o relative alla riproduzione.

- Oltre 1.000 indd. il 7 gennaio in Valle Pozzatini (RO) e 1.670 indd. il 14 gennaio (E. Verza, G. Silveri et al.).
1.865 indd. in Laguna di Venezia il 12 gennaio, di cui 1.000 indd. in Valle Dragojesolo (censimenti IW).
1 ind. alla Busa di Giaretta, Carmignano sul Brenta (PD), il 26 febbraio, marcato con anello italiano (F. Calore [4]).
1 ind. sull'Adige a Villa Bartolomea (VR) tra il 12 e il 23 marzo (C. Faggion, A. Berardo, G. Rigo [1]).
1.960 indd. in Valle Pozzatini (RO) il 28 ottobre (L. Bedin, A. Bocchi).
60 nidi in costruzione in Valle Dogà (VE) il 27 novembre, in seguito abbandonati (L. Panzarin).

Podicipediformes**Podicipedidae****Svasso maggiore *Podiceps cristatus***

Si elencano concentrazioni consistenti.

- 1.200 indd. ca. davanti a Maraschina, Peschiera del Garda (VR), il 7 marzo (M. Sighele [1]).
657 indd. in passaggio verso est in 90' di osservazione e 180 indd. posati a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 27 marzo (F. Piccolo [2][3]).

Svasso collorosso *Podiceps grisegena*

- 1 ind. in Laguna di Caleri (RO) il 14 gennaio (M. Bovo, L. Zanella).
1 ind. a Castelletto di Brenzone (VR) il 17 gennaio e il 26 febbraio (A. Mosele, K. Tabarelli de Fatis et al. [1][3]).

- 1 ind. a Pacengo (VR) il 17 gennaio (F. Lui, M. Sighele, C. Zanini, A. Zorzi [1][3]).
 1 ind. a Pai, Torri del Benaco (VR), il 14 febbraio (C. & L. Fracalossi [3]).
 1 ind. a Malcesine (VR) il 27 febbraio e 1 ind. a Navene, Malcesine (VR), il 6 marzo (C. Zanini, A. Ravagnani [1]).
 3 indd. a Eraclea Mare (VE) il 27 marzo (G. Sgorlon [2][3]).
 1 ind. tra Malcontenta e Fusina, Venezia, il 2 aprile (E. Stival [2][3]).
 1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 9 agosto (R. Castellani [4]).
 2 indd. alla diga di San Nicolò, Venezia, il 6 ottobre (A. Sartori).
 1 ind. in Sacca di Scardovari (RO) l'11 ottobre (A. Ravagnani [2][3]).

Svasso cornuto *Podiceps auritus*

- 1 ind. nei pressi di Malcesine (VR): a Cassone il 18 febbraio, nei pressi del porto il 21 febbraio, in Val di Sogno il 7 marzo (M. Sighele, V. Fanelli, R. Maistri, M. Giroud, I. Leducq [1][3][4]).
 1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 27 marzo (F. Piccolo [2][3]).
 1 ind. a Punta Sabbioni (VE) il 27 marzo (L. Boscain, E. Stival, R. Gottipavero [2][3]).

Svasso piccolo *Podiceps nigricollis*

Si elenca una concentrazione consistente.

- 559 indd. in Sacca di Scardovari (RO) il 15 gennaio (censimenti Sagittaria).

Falconiformes

Accipitridae

Falco pecchiaiolo *Pernis apivorus*

Si elencano una segnalazione pre-riproduttiva piuttosto precoce, presenze in siti inusuali per il periodo, alcuni conteggi interessanti.

- 3 indd. sopra Tregnago (VR) il 17 marzo (M. D'Offria [1]).
 1 ind. a Favaro Veneto (VE) il 27 giugno (E. Stival).
 1 ind. al Lido di Venezia il 30 giugno (S. Castelli [2][3]).
 2 cpp. in voli territoriali a Cona (VE) l'1 luglio (A. Tonelli [3]).
 1 ind. a Bevilacqua (VR) il 4 luglio (M. Sighele [1][2]).

Durante la migrazione post-riproduttiva il picco si è registrato il 22 agosto col passaggio di oltre 1.500 indd. sui Colli Asolani (TV/BL), 1.411 indd. a Santa Lucia dei Monti, Valeggio (VR), 734 indd. sulle colline moreniche a sud del Garda (VR/MN/BS) e 1.031 indd. sulle colline a nord di Verona (F. Mezzavilla, R. Rigon, A. Gargioni, R. Lerco, C. Izzo et al.).

Nibbio bianco *Elanus caeruleus*

1 ind. nei pressi di Morgano (TV) il 5 aprile (F. Salvini [4]). La segnalazione è stata confermata dalla Commissione Ornitologica Italiana (COI) e rappresenta la prima osservazione per il Veneto e la sesta per l'Italia (JANNI & FRACASSO, in prep.).

Nibbio reale *Milvus milvus*

- 1 ind. a Cornuda (TV) l'8 aprile (G. Silveri [4]).
 1 ind. a Pederobba (TV) il 5 maggio (G. Silveri).
 1 ind. a Pegolotte di Cona (VE) il 15 ottobre (A. Tonelli [2]).

Grifone *Gyps fulvus*

1 ind. a Pies De Ra Mognes, Cortina d'Ampezzo (BL), il 10 giugno (M. Da Pozzo).

1 ind. sui Colli Asolani (TV/BL) il 29 agosto (G. Silveri et al. [3]).

1 ind. sopra il Rifugio Chierogo sul Monte Baldo (VR) il 3 ottobre (A. Marsili [1]).

Albanella reale *Circus cyaneus*

Si elenca una osservazione in migrazione pre-riproduttiva abbastanza tardiva.

1 f. ad. al Pigarolo, Lessinia (VR), il 22 maggio (M. D'Offria [1]).

Albanella pallida *Circus macrourus*

1 m. ad. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 13 marzo (E. Stival, C. Turchetto [2][3]) (fig. 2).

1 m. a Ca' Roman (VE) il 27 marzo (A. Sartori, F. Antinori et al. [2]).

Poiana codabianca *Buteo rufinus*

1 ind. a Ca' Venier (RO) il 9 gennaio (D. Trombin [3]).

1 ind. sulle colline moreniche del Garda (VR/MN/BS) il 23 agosto e 1 ind. il 2 settembre (A. Gargioni, D. Lampugnani, M. Musatti, S. Pirola et al.).

Con queste segnalazioni sono ora 13 le osservazioni in Veneto nell'ultimo decennio, anche se solo in 6 diversi anni, per cui andrebbe considerata di comparsa irregolare in regione (BON & SEMENZATO, 2002; BON et al., 2003-2008; SIGHELE et al., 2009, 2010). Negli ultimi anni si è verificato un aumento delle segnalazioni di questa specie in tutta Italia, anche se la documentazione fotografica non sempre ha confermato l'identificazione; sarebbe quindi auspicabile fornire commenti o immagini di conforto per possibili equivoci con *Buteo buteo*.

Poiana calzata *Buteo lagopus*

1 ind. tra le valli Grassabò e Fosse (VE) tra il 7 e il 27 febbraio (A. Bossi, E. Stival et al. [2][3]) (fig. 3).

Aquila anatraia maggiore *Aquila clanga*

1 ad. a San Tommaso, Legnago (VR), ai primi di gennaio (fide M. Pesente [1]).

1 ind. del 1° inverno tra Ronchi di Cologna Veneta, Caselle di Pressana e Giavone di Veronella (VR), tra il 23 gennaio e il 9 febbraio (M. Pesente, M. & G. Sighele et al. [1]).

Aquila anatraia minore *Aquila pomarina*

1 ind. soccorso a Ottava Presa, Caorle (VE), il 22 ottobre, in seguito rilasciato a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 12 novembre (L. Panzarin), qui osservato anche il giorno successivo (P. Vacilotto [3]) (fig. 4). Dovrebbe trattarsi della quarta segnalazione veneta dell'ultimo decennio (BON et al., 2004; MELLONE & SIGHELE, 2007; SIGHELE et al., 2009).

Aquila anatraia maggiore/minore *Aquila* sp.

1 ind. con caratteristiche intermedie tra *Aquila clanga* e *Aquila pomarina* in Valle Grassabò (VE) il 27 febbraio (R. Lerco [1][3]).

Aquila minore *Aquila pennata*

1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 5 marzo (L. Boscaïn [2][3]).

2 ind. sui Colli Asolani (TV/BL) il 22 agosto (F. Mezzavilla et al.).

1 ind. a Santa Lucia dei Monti, Valeggio (VR), il 23 agosto (S. Bellintani).

1 ind. sulle colline moreniche del Garda (VR/MN/BS) l'1 settembre, 1 ind. il 4 settembre e 1 ind. il 5 settembre (A. Gargioni, D. Lampugnani).

1 ind. in Valle Boccavecchia (RO) il 29 novembre (A. Bocchi, D. Trombin).

Aquila reale *Aquila chrysaetos*

Si elenca una osservazione insolita.

1 ind. sui Colli Euganei (PD) il 21 ottobre (A. Tonelli), specie segnalata nella medesima località anche nel maggio 2009 (cfr. SIGHELE et al., 2010).

Falconidae**Grillaio *Falco naumanni***

1 ind. recuperato a Scorzè (VE) l'11 giugno (L. Panzarin).

1 f. alla Bonifica di Loncon (VE) il 9 agosto (G. Sgorlon [2][3]).

Falco cuculo *Falco vespertinus*

Migratore regolare e nidificante recente assai localizzato, si elencano due siti riproduttivi.

1 juv. da poco involato alla Bonifica di Loncon (VE) il 5 luglio, segno di probabile nuova nidificazione in questa località (G. Sgorlon [2][3]).

1 f. e 3 juvv. a Salute di Livenza (VE) il 18 agosto e 1 m. e 3 juvv. il 21 agosto (A. De Faveri).

Falco della Regina *Falco eleonora*

1 ind. sui Colli Euganei (PD) il 28 luglio (A. Tonelli [3]) (fig. 5). Dovrebbe trattarsi dell'ottava segnalazione veneta e della quinta per la provincia di Padova, tutte dal 1996 in poi (BOTTAZZO et al., 1999; BON et al., 2003; SIGHELE et al., 2010).

Lanario *Falco biarmicus*

1 ind. a Finetti, Tregnago (VR), il 24 luglio (C. Izzo, P. Bertini, C. Chiappisi [1][3]). Escludendo gli individui aufughi, dovrebbe trattarsi della decima segnalazione veneta, la nona dal 1988 in poi (FOSCHI et al., 1996; NARDO, 2001; BON et al., 2003; SIGHELE et al., 2010; M. Sighele, ined.).

Sacro *Falco cherrug*

1 juv. presso le Grave di Papadopoli (TV) il 26 settembre (F. Zanatta [1][2][3]) (fig. 6). Dovrebbe trattarsi dell'ottava segnalazione veneta degli ultimi cinquant'anni, la seconda per la provincia di Treviso (BOTTAZZO et al., 1999; BON & SEMENZATO, 2002; BON et al., 2005; SIGHELE et al., 2009, 2010).

Gruiformes**Rallidae****Re di quaglie *Crex crex***

Si elencano segnalazioni in siti inusuali.

1 ind. a Mira (VE) il 19 settembre (L. Sattin).

2 indd. nelle Bonifiche di Porto Viro (RO) il 22 ottobre (fide E. Verza).

Folaga *Fulica atra*

Si elencano concentrazioni consistenti.

33.429 indd. in Laguna di Venezia il 12 gennaio (censimenti IW).

7.345 indd. sulla costa veronese del Lago di Garda il 17 gennaio (censimenti IW).

Otididae

Gallina prataiola *Tetrax tetrax*

1 ind. nei pressi di Castelbaldo (PD) il 15 ottobre (fide L. Sattin). Dovrebbe trattarsi della seconda segnalazione veneta degli ultimi cinquant'anni; l'ultima nota per il Padovano risale all'ottobre 1925 (FOSCHI et al., 1996).

Gruidae

Gru *Grus grus*

Specie migratrice regolare, si riportano le osservazioni di gruppi numerosi, le segnalazioni invernali e una sosta prolungata.

100 indd. ca. in due stormi nei pressi di Padova l'1 marzo (C. & L. Fracalossi [3]).

50 indd. ca. in volo sopra Correzzola (PD) il 12 marzo (A. Marocco [2][3]).

66 indd. in volo sopra Villorba (TV) il 20 novembre (F. Zanatta [3]).

1 ind. in sosta per qualche giorno nei pressi di Valle Zignago (VE) a metà dicembre (D. Fasano [2]).

Il giorno 18 dicembre: lungo il corso del fiume Piave (TV) 150 indd. sopra Morgano, due gruppi di 53 e 63 indd. sopra Pederobba, 100 indd. sopra Spresiano (F. Zanatta, F. Dartora, F. Salvini); nel Veneziano 115 indd. sopra Mirano, 15 indd. a Ca' Noghera e 14 indd. a Portegrandi, Quarto d'Altino (L. Sattin, E. Stival [2]); nel Vicentino 80 indd. sopra Arcugnano e 250 indd. sopra Conco (F. Pompele, V. Poli [4]); nel Veronese 200-300 indd. sopra Legnago (D. Guadagnini [1]).

60 indd. ca. in volo sopra Catena di Villorba (TV) il 20 dicembre (fide P. Vacilotto [3]).

100 indd. ca. in volo sopra l'Oasi Stagni di Casale, Vicenza, il 21 dicembre (F. Farinello [3]).

55-60 indd. sopra Montebelluna (TV) il 26 dicembre (E. Romanazzi [4]).

87 indd. sopra il Monte di Valbella, Altopiano dei Sette Comuni (VI), il 27 dicembre (G. Borziello, D. Gasparo).

100 indd. sopra Arcugnano (VI) il 29 dicembre (F. Pompele [4]).

Charadriiformes

Haematopodidae

Beccaccia di mare *Haematopus ostralegus*

Si elencano concentrazioni consistenti e una segnalazione inusuale.

139 indd. in Sacca di Scardovari (RO) il 13 gennaio e 51 indd. il 15 gennaio quando erano contemporaneamente presenti 96 indd. nel litorale tra il Po di Tolle e il Po di Goro (censimenti Sagittaria [3]).

1 ind. nel golfo di Peschiera del Garda (VR) l'11 settembre (C. Izzo, C. Chiappisi [1]).

Recurvirostridae

Cavaliere d'Italia *Himantopus himantopus*

Si elenca una segnalazione in ambiente urbano.

1 ind. lungo l'Adige a Verona il 26 maggio (L. Avesani, M. & G. Sighele, P. Bertini [1]).

Avocetta *Recurvirostra avosetta*

Si elencano concentrazioni consistenti.

1.898 indd. in Laguna di Venezia il 12 gennaio (censimenti IW).

1.791 indd. in Valle Ca' Pisani (RO) il 9 marzo (M. Bovo, M. Veronesi [3]).

2.300 indd. in Valle Ca' Pisani (RO) il 14 dicembre (A. Bocchi, L. Boscain).

Burhinidae**Occhione *Burhinus oedicnemus***

Si elenca l'unica area regionale nota di possibili nidificazioni.

1 ind. alle Grave di Ciano (TV) tra il 19 aprile e il 25 maggio (G. Silveri [3]), sito delle uniche nidificazioni accertate in Veneto (MEZZAVILLA & SILVERI, 2007).

2 indd. sul Piave a Spresiano (TV) il 28 luglio (F. Zanatta).

Glareolidae**Pernice di mare *Glareola pratincola***

Si elenca l'unico comprensorio di riproduzione della specie.

La specie ha nidificato in 6 diverse valli nel Delta del Po (RO), con almeno 10 cpp. (censimenti Sagittaria).

Charadriidae**Corriere di Leschenault *Charadrius leschenaultii***

1 ind. alla foce del Po di Maistra (RO) il 26 e il 27 maggio (L. Boscain, A. Bocchi, F. Piccolo [2][3]). La segnalazione è in attesa della conferma da parte della Commissione Ornitologica Italiana (COI); rappresenterebbe eventualmente la seconda segnalazione per il Veneto dopo quella del 2005 proprio nello stesso sito (BRICHETTI & OCCHIATO, 2005).

Piviere tortolino *Charadrius morinellus*

5 indd. sul Monte Pizzoc (TV) il 31 agosto, 3 indd. l'1 settembre, 2 indd. il 5 settembre (P. Vacilotto, M. Chillon, A. Piazza [3]).

Tra 6 e 14 indd. sul Col Margherita (BL) tra la fine di agosto e i primi di settembre (A. Tonelli, F. Piccolo, G. Basso [3]).

1 ind. sul Corno d'Aquilio (VR) il 29 agosto (L. Lodde [1]).

1 ind. sul Monte Tomatico, Feltre (BL) il 29 agosto (G. Tormen, S. De Col).

3 indd. sul Monte Cernerà (BL) il 5 settembre (M. Villa [4]).

Piviere dorato *Pluvialis apricaria*

Si elenca una concentrazione consistente.

1.700 indd. a Gorino Mare (RO) il 15 gennaio (L. Bedin, G. Barausse [3]).

Pivieressa *Pluvialis squatarola*

Si elencano le concentrazioni più consistenti e le segnalazioni inusuali.

1.182 ind. in Laguna di Venezia il 13 gennaio (censimenti IW).

264 ind. in Valle San Carlo (RO) il 15 febbraio (censimenti Sagittaria).

1 ind. a San Bernardino, Vigasio (VR), il 28 aprile (P. Bertini [1]).

1 ind. a Vo' Pindemonte, Isola della Scala (VR), dall'1 al 3 maggio, giorno in cui era presente anche un secondo ind. (P. Bertini, R. Lerco, A. Mosele, M. Sighele [1]).

Scolopacidae**Gambecchio comune *Calidris minuta***

Si elenca una concentrazione consistente.

111 ind. lungo il Canale Piovego, Campagna Lupia (VE), l'11 dicembre (L. Sattin, E. Stival).

Piovanello pancianera *Calidris alpina*

Si elenca una concentrazione consistente.

29.737 ind. in Laguna di Venezia il 13 gennaio (censimenti IW).

Gambecchio frullino *Limicola falcinellus*

1 ind. in Valle Spolverina (RO) tra il 5 e l'11 settembre (G. Zogno, E. Verza, D. Trombin [3]).

Combattente *Philomachus pugnax*

Specie migratrice regolare, si elenca un individuo marcato.

1 ind. a Montalto, Nogara (VR), il 15 marzo, marcato con flags e anelli colorati olandesi (M. Sighele [1]). Era stato inanellato in Frisia il 21 marzo 2009 (archivio ISPRA).

Frullino *Lymnocyptes minimus*

Specie migratrice regolare, si elencano le segnalazioni invernali.

2 ind. a Pradon, Porto Tolle (RO), il 6 gennaio (E. Verza).

1 ind. lungo il fiume Monticano a Oderzo (TV) il 16 gennaio (A. Lippi [3]).

Beccaccino *Gallinago gallinago*

Si elenca una concentrazione consistente.

240 ind. in Valle Nuova (VE) l'11 gennaio (D. Cester).

Pittima reale *Limosa limosa*

Si elencano concentrazioni consistenti.

2.965 ind. in Valle Ca' Zuliani, 548 ind. in Valle San Carlo, 862 ind. in Valle Ripiego, 458 ind. in Valle Ca' Pisani e 20 ind. in Valle Bagliona per un totale di 4.853 ind. nel Delta del Po (RO) il 9 marzo (censimenti Sagittaria [3]).

Pittima minore *Limosa lapponica*

Si elencano le segnalazioni in periodo invernale.

1 ind. in Laguna sud di Venezia il 13 gennaio (censimenti IW).

10 indd. in Sacca di Scardovari e 1 ind. in Laguna Basson (RO) il 15 gennaio (censimenti Sagittaria).
2 indd. al Bacan di Sant'Erasmus, Venezia, il 21 dicembre (A. Sartori [2]).

Chiurlo piccolo *Numenius phaeopus*

Si elencano segnalazioni in sito inusuale.

1 ind. a Cimadolmo (TV) il 23 giugno (F. Zanatta [4]).

Totano moro *Tringa erythropus*

Si elenca una concentrazione consistente.

530 indd. alla Palude della Cona (VE) il 9 aprile (E. Stival [2][3]).

Albastrello *Tringa stagnatilis*

Si elencano una concentrazione consistente e le segnalazioni in periodo invernale o in siti inusuali.

1 ind. in Laguna di Caleri (RO) il 14 gennaio (L. Bedin, M. Veronese).

1 ind. a Montalto, Nogara (VR), tra il 5 e il 12 aprile (E. Cavallini, C. Izzo, I. Falco, M. Sighele et al. [1]).

1 ind. a Pederobba (TV) il 28 aprile (G. Silveri [3]).

57 indd. tra le valli di Porto Levante e Valle Chiusa (RO) il 10 agosto (censimenti Sagittaria).

Voltapietre *Arenaria interpres*

Si elencano le osservazioni in periodo invernale.

1 ind. in Laguna sud di Venezia il 13 gennaio (censimenti IW).

22 indd. nel litorale tra il Po di Tolle e il Po di Goro e 1 ind. in Sacca di Scardovari (RO) il 15 gennaio (censimenti Sagittaria).

4 indd. a Campagna Lupia (VE) l'11 dicembre (E. Stival, L. Sattin).

14 indd. alla foce del Po di Levante (RO) il 28 dicembre (D. Trombin).

Stercorariidae

Stercorario mezzano *Stercorarius pomarinus*

1 ind. recuperato e poi deceduto a Paese (TV) il 29 novembre (CRFS Treviso, P. Vacilotto [3]).

Labbo *Stercorarius parasiticus*

1 ind. alle foci del Piave, Jesolo (VE), il 24 aprile (E. Stival, G. Sgorlon [2][3]).

5 indd. a Jesolo Lido (VE) il 13 maggio e 2 indd. il 22 maggio (E. Stival, L. Boscain [2][3]).

1 ind. alla foce del Brenta (VE) il 22 maggio (A. Tonelli – MORUS, 2010).

5 indd. alla diga di San Nicolò, Venezia, il 17 luglio (S. Castelli, M. Scarpa, M.G. Mitri – MORUS, 2011).

4 indd. a Porto Baseleghe (VE) il 6 agosto e 1 ind. il 14 agosto (E. Stival [2][3]).

3 indd. a Boccasette (RO) il 26 agosto, 1 ind. il 28 agosto, 2 indd. il 5 e l'11 settembre (D. Trombin. E. Verza, A. Ravagnani [3]).

1 ind. nel golfo di Peschiera del Garda (VR) l'11 settembre (C. Izzo, C. Chiappisi, P. Bertini [1]).

Stercorario maggiore *Stercorarius skua*

1 ind. alla foce del Livenza, Caorle (VE), il 15 settembre (C. Izzo [1][3]). Si tratta della quarta segnalazione veneta degli ultimi trent'anni, la terza per la provincia di Venezia (TOSO, 1981; SCARTON & BORELLA, 1997; SIGHELE et al., 2009).

Laridae

Gabbiano tridattilo *Rissa tridactyla*

1 ind. del 2° anno in volo da Eraclea verso Caorle (VE) il 27 marzo (G. Sgorlon [2][3]).

Gabbiano roseo *Chroicocephalus genei*

3 indd. in Valle Bagliona (RO) il 22 gennaio (G. Barausse, F. Piccolo).

2 indd. in Valle Cannelle (RO) il 23 marzo (D. Trombin, M. Veronese).

2 indd. in Valle Bagliona (RO) il 24 marzo e il 15 aprile (L. Bedin, A. Bocchi, D. Trombin, M. Veronese).

1 ind. in Valle Ca' Pasta (RO) il 12 e il 26 maggio nella colonia di gabbiani corallini (P. Ronconi, C. Cavaliere, D. Trombin).

2 indd. in Valle Canocchione (RO) a fine giugno e il 7 luglio (R. Giubilato, D. Trombin).

2 indd. in Valle Bagliona (RO) il 27 ottobre (A. Bocchi, D. Trombin).

Gabbiano comune *Chroicocephalus ridibundus*

Si elencano segnalazioni di aberrazione di piumaggio e di individui marcati.

1 ind. leucistico a Padova il 18 gennaio (L. Boscain, A. Soraruf), forse lo stesso già segnalato nel 2008 e nel 2009 (cfr. SIGHELE et al., 2009, 2010).

2 indd. a Pacengo (VR) il 3 gennaio marcati con anello del Museo di Praga (V. Fanelli, C. Zanini [1]).

1 ind. a Lido Fornaci, Peschiera del Garda (VR), marcato con anello metallico del Museo di Praga, osservato dapprima tra il 13 gennaio e il 20 febbraio (D. Bernasconi, C. Chiappisi, G. Piras), quindi, l'inverno successivo, tra il 19 ottobre e l'1 gennaio 2011 (M. Sighele, R. Lerco et al.). Era stato inanellato adulto a Staré Město, in Repubblica Ceca, nel luglio 2009.

2 indd. a Chioggia (VE) il 25 gennaio, marcati con anelli colorati croati (M. Basso).

Gabbianello *Hydrocoloeus minutus*

Si elenca una segnalazione in periodo inusuale.

2 indd. a Boccasette (RO) il 22 giugno (E. Verza et al. [3]).

Gabbiano corallino *Larus melanocephalus*

Si elencano segnalazioni in siti inusuali, concentrazioni consistenti e individui marcati.

2.865 indd. in Laguna di Venezia il 13 gennaio, di cui 2.278 indd. in Laguna sud (censimenti IW).

1 ind. a Maserada sul Piave (TV) il 20 febbraio (P. Vacilotto [3]).

Oltre 500 cpp. in Valle Ca' Zuliani a fine maggio (D. Trombin, L. Bedin [3]); in seguito, a causa del maltempo, la nidificazione non è andata a buon fine.

1 ind. in Laguna di Venezia il 16 giugno, marcato con anello colorato serbo (M. Basso).

5 indd. a Sant'Elena di Silea (TV) il 25 settembre (P. Vacilotto [3]).

1 ind. a Faè di Oderzo (TV) il 20 ottobre (G. Sgorlon).

2 indd. marcati a Chioggia (VE) il 15 dicembre, 1 ind. con anello colorato greco e 1 ind. con anello colorato ungherese (M. Basso).

Gabbiano di Pallas *Larus ichthyaetus*

1 ad. in Laguna Nord di Venezia il 13 luglio (L. Panzarin). Si tratta della prima segnalazione per il Veneto e per l'Italia settentrionale, la settima italiana al di fuori della Sicilia, la seconda nel mese di luglio (BRICHETTI & FRACASSO, 2006).

Gavina *Larus canus*

Si elenca una concentrazione consistente.

1.000 indd. nella campagne di Brussa di Caorle (VE) l'11 gennaio (censimenti IW).

Zafferano *Larus fuscus*

1 ind. a Lido Ronchi, Castelnuovo del Garda (VR), il 7 gennaio (C. Izzo [1]).

2 indd. a Chioggia (VE) il 16 gennaio (E. Stival, S. Zampedri, M. Cargasacchi).

1 ind. a Favaro Veneto (VE) il 9 ottobre (E. Stival [2][3]).

1 ind. in Sacca di Bottonera (RO) il 31 ottobre (F. Piccolo, A. Tonelli [3]).

4 indd. alla foce del Po di Levante (RO) il 28 dicembre (D. Trombin).

Gabbiano reale nordico *Larus argentatus*

Si elencano le segnalazioni che non si riferiscono a individui isolati.

27 indd. in Laguna sud di Venezia il 13 gennaio (censimenti IW).

6 indd. nel Delta del Po in mare e in Sacca Cavallari (RO) il 14 febbraio (A. Farioli, G. Gerra, N. Donà et al.).

Gabbiano reale *Larus michahellis*

Si elenca individuo marcato.

1 ind. a Fusina, Mira (VE), il 21 febbraio, marcato con anello rosso italiano "I194" (O. Negra [4]). Era stato inanellato nel maggio 2004 in Cassa di Colmata D-E, Laguna di Venezia (archivio ISPRA).

Gabbiano reale pontico *Larus cachinnans*

4 indd. in Laguna sud di Venezia il 13 gennaio (censimenti IW).

1 ind. a Chioggia (VE) il 16 gennaio (E. Stival, S. Zampedri, M. Cargasacchi [2]).

1 ind. a Chioggia (VE) il 22 gennaio, marcato con anello colorato bielorusso (M. Basso).

1 ind. al Laghetto del Frassino, Peschiera del Garda (VR), il 24 gennaio (M. Sighele [1]).

1 ind. a Peschiera del Garda (VR) il 6 febbraio (B. & F. Perroud [1][3]).

1 ind. a Garda (VR) il 20 febbraio (C. Izzo [1][3]).

1 ind. a Chioggia (VE) il 30 novembre (M. Basso [2]).

Mugnaiaccio *Larus marinus*

1 ind. tra Peschiera del Garda (VR) e Sirmione (BS) a partire dal 10 ottobre 2009 è stato nuovamente segnalato nel golfo di Peschiera il 2 gennaio e il 21 febbraio (U. Monicelli, M. Sighele, V. Fanelli [1] – cfr. SIGHELE et al., 2010).

1 ind. in Sacca Cavallari (RO) il 14 febbraio (M. Cargasacchi, A. Farioli, N. Donà et al. [2]).

1 ind. nel golfo di Peschiera del Garda (VR) dal 19 settembre al 23 ottobre (P. Bertini, C. Zanini, A. Pigozzo, C. Izzo et al. [1]); forse lo stesso ind. dell'inverno precedente.

Sternidae**Sterna zampenere *Gelochelidon nilotica***

Si elencano le segnalazioni relative alla riproduzione nel Delta del Po di Rovigo e l'osservazione di attecchimento nuziale nel Veneziano.

La popolazione nidificante nel Delta del Po (RO) è aumentata, con la presenza nelle valli di 5 distinte colonie per un totale di circa 215-235 cpp. (E. Verza, D. Trombin et al.).

2 indd. a Valle Vecchia di Caorle (VE) l'8 luglio, osservati in pesca e successivo scambio della preda (G. Sgorlon).

Sterna maggiore *Hydroprogne caspia*

Si elencano una segnalazione in sito inusuale e i gruppi più consistenti.

2 ind. a Casale sul Sile (TV) l'1 aprile (F. Mezzavilla [4]).

23 ind. in Valle Canocchione (RO) il 24 agosto (L. Bedin, A. Bocchi).

27 ind. in Valle Ca' Pasta (RO) il 28 settembre (F. Piccolo, L. Zanella).

23 ind. in Valle Ca' Zuliani (RO) l'11 ottobre (D. Trombin, A. Bocchi).

Mignattino alibianche *Chlidonias leucopterus*

1 ind. in Sacca di Scardovari (RO) il 22 maggio (M. & G. Sighele, M. Allen, G. Dalle Vedove [1]).

1 ind. nei pressi di Tessera, Favaro Veneto (VE), il 30 luglio (M. Cargasacchi [2]).

2-3 ind. in Sacca di Scardovari (RO) tra il 5 e l'11 settembre (A. Ravagnani, D. Trombin).

3 ind. in Valle Chiusa (RO) il 28 settembre (L. Bedin, G. Fornasa).

Beccapesci *Sterna sandvicensis*

Si elenca una segnalazione in sito inusuale in acque interne.

2 ind. a Porto Bergamini, Peschiera del Garda (VR), il 17 maggio (G. & M. Sighele [1]), assai occasionale sul Lago di Garda veronese.

Columbiformes**Columbidae****Colombella *Columba oenas***

Si elencano concentrazioni consistenti.

201 ind. alle cave di Cinto Caomaggiore (VE) l'11 gennaio (L. Panzarin).

158 ind. a Ca' Noghera (VE) il 30 gennaio (E. Stival [2][3]).

150 ind. ca. in Valle Grassabò (VE) il 12 febbraio (L. Boscain [2][3]).

100 ind. a Ca' Noghera (VE) il 2 novembre e 56 ind. il 26 dicembre (E. Stival).

Colombaccio *Columba palumbus*

Si elenca una concentrazione consistente.

20.000 ind. ca. presso Valle Boccavecchia (RO) il 20 novembre (D. Trombin [3]).

Cuculiformes**Cuculidae****Cuculo dal ciuffo *Clamator glandarius***

1 ind. in Valle Canocchione (RO) il 24 marzo (D. Trombin [3]).

2 add. nei pressi di Jesolo (VE) il 24 aprile (M. Antonini, Polizia Provinciale di Venezia) e in seguito 2 juv. alla foce del Revedoli tra il 22 e il 30 giugno, con imbeccate da parte di gazza (G. Sgorlon, A. Nardo et al. [2][3]).

2 ind. nella Laguna di Caleri (RO) dal 24 maggio (R. Valle, D. Trombin, E. Vicentini, N. Donà, G. Sgorlon [3]), successivamente 1 juv. a fine giugno, ancora alimentato da gazze il 9 agosto (M. Basso [4]).

1 juv. che si accompagnava ad una gazza a Cinto Euganeo (PD) tra il 3 e il 13 agosto (A. Tonelli, S. Bottazzo [3]); si tratta della prima nidificazione per la provincia di Padova (fig. 7).

1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 3 agosto (R. Castellani [3][4]).

1 juv. a Meduna di Livenza (TV) il 23 settembre (A. Lippi [2][3]).

Strigiformes

Strigidae

Allocco degli Urali *Strix uralensis*

1 ind. in canto nella Foresta del Cansiglio (BL) l'1 giugno (M. Mastrorilli [4]).

Gufo di palude *Asio flammeus*

1 ind. in Valle Capitanata (VE) il 3 gennaio (A. Nardo, U.M. Veken [3]).

1 ind. in Valle Dragojesolo (VE) il 12 gennaio (M. Basso, L. Piva).

1 ind. alla Barena Tessera (VE) il 22 gennaio (M. Baldin).

1 ind. nei pressi di Ca' Pisani (RO) il 6 febbraio (A. Tarozzi [3]).

2 indd. nel canale Caligo (VE) l'11 febbraio (fide L. Boscain [2][3]).

1 ind. a Vallesina, Ca' Noghera (VE), il 14 febbraio (E. Stival [2][3]).

1 ind. alla Barena Tezze Fonde (VE) il 13 aprile (M. Baldin).

1 ind. nei pressi di Bosco Chiesanuova (VR) il 25 aprile (M. Lezzi [1]).

1 ind. alla Barena Canale Tessera (VE) il 7 settembre e il 2 dicembre (M. Baldin, F. Scarton).

Apodiformes

Apodidae

Rondone pallido *Apus pallidus*

1 ind. al Parco di San Giuliano, Mestre (VE), il 17 agosto (E. Stival [2][3]).

2 indd. sopra Valle Fosse, Jesolo (VE), il 17 agosto (G. Sgorlon [2][3]).

5-6 indd. sopra il Monte Castello e il Monte Porcile, Grezzana (VR), l'11 e il 31 agosto (R. Lerco [1]).

1 ind. sul Colle San Giorgio (TV) il 2 settembre (G. Silveri [4]).

Coraciiformes

Coraciidae

Ghiandaia marina *Coracias garrulus*

1 ind. a Ca' Tron (TV) il 13 maggio (L. Panzarin [3]).

1 ind. a Boccasette (RO) il 19 e il 20 maggio (D. Trombin et al.).

2 indd. a Paltanara, Po di Maistra (RO), il 20 maggio (D. Trombin [3]).

1 ind. alle Grave di Ciano (TV) il 25 maggio (G. Silveri [3]).

1 ind. in Valle Ca' Zuliani (RO) il 30 maggio (E. Stival, A. Bossi [3]).

Nidificazione nuovamente accertata anche nel 2010 di 1 cp. in provincia di Verona al confine tra i comuni di Legnago e Villa Bartolomea (VR); prime segnalazioni a partire dal 13 maggio (G. Rigo, M. Pesente et al.), anche all'interno di un nido il 29 maggio (P. Bertini), proseguite con osservazioni di 2-3 indd. fino alla fine di agosto, anche con imbeccata (A. Pigozzo, I. Falco, M. Pesente et al. [1]).

Prima nidificazione accertata anche nei Colli Euganei nei pressi di Baone (PD), con 1 ind. osservato il 17 giugno, quindi juv. imbeccati dai genitori il 27 luglio, osservati poi almeno fino al 17 agosto (A. Tonelli [3]).

1 ind. nei pressi di Montalto di Sopra, Rivoli Veronese (VR), il 26 giugno (S. Cutini, G. Londi).

1 ind. a Pozzonovo (PD) il 6 luglio (A. Tonelli [3]).

1-2 indd. nei pressi di Ca' Pisani (RO) tra il 7 luglio al 28 agosto (E. Verza, P. Vacilotto, D. Trombin, G. Zogno, M. Busato [3]).

1 ind. a Pegolotte di Cona (VE) il 31 luglio (A. Tonelli).

Probabile nidificazione anche nel Trevigiano a Moriago della Battaglia, per la presenza 1 ad. e 1 juv. nel mese di agosto e la successiva osservazione di 1 ind. sul Montello il 29 settembre (G. Silveri).

1 ind. a Faè di Oderzo (TV) il 26 settembre (G. Sgorlon [3]).

Piciformes

Picidae

Torcicollo *Jynx torquilla*

Specie migratrice e nidificante regolare, raramente svernante, si elenca una segnalazione in periodo inusuale.

1 ind. a Treponti, Teolo (PD), il 12 febbraio (M. Busato [4]).

Picchio nero *Dryocopus martius*

Si elenca una segnalazione in sito inusuale.

1 ind. nell'Oasi Cave Gaggio Nord di Marcon (VE) il 12 dicembre (S. Longo); nello stesso sito la specie era stata osservata anche il 25 novembre 2007 (M. Dalla Via).

Picchio rosso minore *Dendrocopos minor*

2 indd. a Lentiai (BL) il 14 marzo (VARASCHIN et al., 2011).

2 indd. a Nave, Mel (BL), il 14 marzo (VARASCHIN et al., 2011).

2 indd. a Salce, Belluno, il 23 marzo (VARASCHIN et al., 2011).

1 ind. alla garzaia di Pederobba (TV) il 25 marzo (G. Silveri [3]).

1 ind. al Vinchetto di Celarda (BL) il 2 giugno (M. Zenatello – VARASCHIN et al., 2011).

Passeriformes

Laniidae

Averla piccola *Lanius collurio*

Si elenca una segnalazione in periodo inusuale.

1 ind. a Marghera (VE) il 29 novembre (E. Stival [2][3]).

Averla cenerina *Lanius minor*

Specie migratrice e nidificante regolare, ma scarsa e con distribuzione frammentata.

1 ind. alle Grave di Papadopoli, Cimadolmo (TV), il 27 maggio (F. Zanatta [4]).

1 ind. a Ca' Tron (TV) ai primi di giugno (L. Panzarin [3]).

1 ind. a Marghera (VE) il 15 giugno (L. Magoga).

1 ind. alle Grave di Ciano (TV) il 18 giugno e l'1 agosto (G. Silveri [4]).

1 ind. sul Monte Grappa (TV), 600 m s.l.m., il 4 luglio (G. Silveri [3]).

In provincia di Rovigo si confermano le nidificazioni di 1 cp. nei pressi di Ca' Emo, Adria, e di 1-3 cpp. a San Basilio (D. Trombin, E. Verza et al. – cfr. BON et al., 2003, 2007).

Corvidae

Corvo comune *Corvus frugilegus*

- 4 indd. tra Trevenzuolo ed Erbè (VR) il 6 gennaio (E. Cavallini [1]).
 1 ind. a Pederobba (TV) il 19 gennaio (G. Silveri [4]).
 1 ind. nei pressi dell'Asolo Golf Club, Cavaso del Tomba (TV), il 28 gennaio (G. Silveri [4]).
 1 ind. a Zelarino, Mestre (VE), il 4 dicembre (E. Stival [2][3]).
 6 indd. al Parco Naturale Fiume Sile (TV) il 4 dicembre (F. Salvini [4]).
 2 indd. a Ormelle (TV) il 20 dicembre (G. Sgorlon [4]).

Cornacchia grigia *Corvus cornix*

Si elencano una concentrazione consistente e una aberrazione cromatica.

- 1 ind. leucistico a Parona, Verona, il 28 novembre (C. Izzo, C. Chiappisi, M. Sighele [1]).
 6.000 indd. ca. al roost serale a Moriago della Battaglia (TV) il 5 dicembre (F. Mezzavilla [4]).

Corvo imperiale *Corvus corax*

Si elenca una concentrazione consistente.

- 85-90 indd. a Vallene, Erbezzo (VR), il 16 gennaio (C. Izzo [1]).

Remizidae

Pendolino *Remiz pendulinus*

Si elencano individui marcati.

- 1 ind. in Valle Ghebo Storto (PD) il 12 febbraio, marcato con anello svedese (L. Sattin).
 1 ind. in Valle Ghebo Storto (PD) il 13 marzo, marcato con anello polacco (L. Sattin).
 1 ind. in Valle Ghebo Storto (PD) il 30 ottobre, marcato con anello polacco (L. Sattin).

Panuridae

Basettino *Panurus biarmicus*

Specie che soffre di una importante contrazione numerica, si elencano le segnalazioni al di fuori dei noti siti riproduttivi e un gruppo consistente.

- 1 ind. in Sacca del Canarin (RO) il 15 gennaio (L. Boscain).
 30 indd. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 31 marzo (G. Sgorlon).
 12 indd. all'Isola della Batteria (RO) il 19 novembre (D. Trombin).

Timalidae

Usignolo del Giappone *Leiothrix lutea*

Si elenca una nuova colonizzazione.

- Un nucleo di circa 20 indd. nel comune di San Giovanni Ilarione (VR), insediatosi probabilmente da almeno 3 anni (P. Panarotto et al. [1]).

Alaudidae

Calandra *Melanocorypha calandra*

8 indd. a Salzano (VE) il 24 ottobre (fide L. Sattin).

Cappellaccia *Galerida cristata*

Si elencano una aberrazione cromatica e un sito inusuale.

1 ind. a San Giovanni Ilarione (VR), in zona pedemontana, il 29 aprile (C. & P. Panarotto [1]).

1 ind. parzialmente leucistico a Madonna di Dossobuono, Verona, il 19 dicembre (M. Sighele [1]).

Tottavilla *Lullula arborea*

Le uniche segnalazioni giungono dalla Lessinia, in provincia di Verona, l'unica area regionale di presenza riproduttiva consistente e regolare. La specie si conferma diffusamente nidificante, seppur in colonie separate, tra i 600 m s.l.m. della zona di Cava Belloca, Tregnago, dove è stata anche osservata con imbeccata a metà aprile (M. Bertacco [1]), fino ai 1.600 m s.l.m. della zona di Bocca di Selva, dove è stata ripetutamente osservata in canto (M. Pesente [1]). Successivamente è stata contattata in tutta la zona pedemontana, tra la Valdadige e la Valdalpone, a partire da agosto (R. Lercio, V. Fanelli, C. Izzo et al.).

Hirundinidae

Rondine *Hirundo rustica*

Si elenca una aberrazione cromatica.

1 ind. albino a Villa Bartolomea (VR) il 22 agosto (M. Pesente [1]).

Balestruccio *Delichon urbicum*

Si elenca una aberrazione cromatica.

1 ind. albino a Colderù, Lentiai (BL), il 24 luglio (L. Boscain [3]).

Rondine rossiccia *Cecropis daurica*

1 ind. sui Colli Euganei (PD) il 12 maggio (A. Tonelli [3]).

Aegithalidae

Codibugnolo *Aegithalos caudatus*

In Italia, come in tutto il centro Europa, alla fine del 2010 è stata segnalata una irruzione di individui attribuibili alla ssp. a testa bianca *Aegithalos caudatus caudatus*. Di seguito si elencano le segnalazioni accompagnate da una significativa prova fotografica.

10 indd. a Lido Campanello, Castelnuovo del Garda (VR) il 15 novembre (C. Izzo [1]).

11 indd. a Mestre (VE) il 23 novembre (A. Bossi [4]).

5 indd. inanellati a Saletto (PD) il 30 novembre (A. Frigo, E. Stival [4]).

8 indd. in Valle Ghebo Storto (PD) il 18 dicembre (L. Sattin).

7 indd. a Jesolo (VE) il 18 dicembre (A. Bossi [4]).

Phylloscopidae

Luì di Hume *Phylloscopus humei*

1 ind. al Lido di Venezia, già segnalato tra il 5 e il 13 dicembre 2009 (cfr. SIGHELE et al., 2010), è stato ulteriormente contattato almeno tra metà febbraio e il 9 aprile (S. Castelli, M.G. Mitri, F. Antinori [2][3]). La segnalazione è stata confermata dalla Commissione Ornitologica Italiana (JANNI & FRACASSO, 2010) e rappresenta la prima osservazione per il Veneto e la nona per l'Italia.

Luì siberiano *Phylloscopus collybita tristis*

1 ind. al Busatello (VR) il 24 marzo (M. Pesente).

1 ind. a Lido Campanello, Castelnuovo del Garda (VR), il 3 aprile (M. & G. Sighele, R. Lerco, M. Allen [1]).

1 ind. ad Adria (RO) il 10 dicembre (D. Trombin).

Sylviidae

Bigia padovana *Sylvia nisoria*

1 ind. nei pressi di Trissino (VI) il 19 maggio (M. Bertacco [1]).

1 ind. del 1° inverno inanellato a Saletto (PD) il 29 agosto (A. Frigo).

Sterpazzola *Sylvia communis*

Si elenca un sito riproduttivo in quota.

Almeno 3 mm. in canto nei pressi di Bocca di Selva, Bosco Chiesanuova (VR), oltre i 1.550 m s.l.m., il 22 maggio, in seguito osservata più volte in Lessinia anche a San Giorgio fino alla fine di agosto (M. Pesente, P. Bertini et al. [1]). In Lessinia era stata contattata anche a metà giugno 2009, senza verifiche di ulteriore permanenza (M. Pesente).

Sterpazzolina comune *Sylvia cantillans*

2 ind. in Valle San Carlo (RO) il 9 aprile (L. Boscain, L. Zanella [3]).

1 ind. al Parco di San Giuliano, Mestre (VE), il 15 aprile (E. Stival).

1 ind. all'Oasi Cave Gaggio Nord di Marcon (VE) il 29 aprile (E. Stival [2][3]).

1 ind. a Cimadolmo (TV) il 17 maggio (F. Zanatta [4]).

Occhiocotto *Sylvia melanocephala*

Si elenca una segnalazione in sito inusuale.

1 ind. a Villorba (TV) il 16 aprile (P. Vacilotto [3]).

Locustellidae

Forapaglie macchiettato *Locustella naevia*

Specie considerata migratrice regolare, ma assai poco numerosa, si elenca l'unica segnalazione.

1 ind. inanellato in Valle Ghebo Storto (PD) il 4 settembre (L. Sattin).

Acrocephalidae

Forapaglie castagnolo *Acrocephalus melanopogon*

Specie di scarsa presenza durante i mesi invernali.

1 ind. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 3 dicembre (L. Boscain [2][3]).

1 ind. al Busatello (VR) il 5 dicembre (M. Pesente, F. Novelli [1]).

Forapaglie comune *Acrocephalus schoenobaenus*

Si elenca una segnalazione in periodo riproduttivo.

1 ind. in attività trofica a Valle Vecchia di Caorle (VE) l'8 e il 28 luglio (G. Sgorlon); la specie ha nidificato nelle vicine barene del Canale Novi-Zumelle almeno fino al 2006 (GUZZON & PANZARIN, 2005; L. Panzarin, com. pers.).

Cannaiola comune *Acrocephalus scirpaceus*

Si elenca un individuo marcato.

1 ind. in Valle Ghebo Storto (PD) il 30 aprile, marcato con anello croato (L. Sattin).

Bombycillidae

Beccofrusone *Bombycilla garrulus*

2 ind. a San Donà di Piave (VE) il 24 marzo (A. Nardo [2][3]).

Certhidae

Rampichino alpestre *Certhia familiaris*

Si elencano segnalazioni in siti inusuali.

1 ind. all'Oasi Cave Gaggio Nord di Marcon (VE) il 27 novembre (M. Dalla Via).

1 ind. a Treviso il 18 dicembre (L. Boscain [2][3]).

Muscicapidae

Pettiroso *Erithacus rubecula*

Si elenca un individuo marcato.

1 ind. a Povegliano Veronese (VR) nel mese di gennaio, marcato con anello metallico russo (E. Cavallini [1]). Era stato inanellato nel settembre 2007 a Kaliningrad, nei pressi del Mar Baltico, circa 1.300 km più a nord-est (archivio ISPRA).

Codirosso spazzacamino *Phoenicurus ochruros*

Si elenca una segnalazione in pianura in periodo riproduttivo e una aberrazione cromatica.

1 ind. nella zona industriale di Marghera (VE) il 5 luglio (M. Bon, E. Stival).

1 ind. leucistico a San Giovanni Ilarione (VR) da metà novembre ad almeno gennaio 2011 (C. e P. Panarotto).

Codirosso comune *Phoenicurus phoenicurus*

Si elenca una segnalazione in periodo post-riproduttivo abbastanza tardivo.

1 ind. a Villorba (TV) il 29 novembre (F. Zanatta [4]).

Pigliamosche pettirosso *Ficedula parva*

1 ind. del 1° inverno a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 15 settembre (F. Trave [2][3]) (fig. 8). Dovrebbe trattarsi della terza segnalazione in provincia di Venezia, l'ottava veneta degli ultimi 50 anni (MEZZAVILLA et al., 1999; BRICHETTI & FRACASSO, 2008; SIGHELE et al., 2009).

Balia dal collare *Ficedula albicollis*

1 m. a Morgano (TV) l'8 maggio (F. Salvini [4]).

Balia nera *Ficedula hypoleuca*

Si elenca una segnalazione in periodo post-riproduttivo abbastanza precoce.

1 ind. a Oderzo (TV) il 20 luglio (G. Sgorlon [2][3]).

Prunellidae**Passera scopaiola *Prunella modularis***

Si elenca un individuo marcato.

1 ind. catturato a Pontoncello, Zevio (VR), il 16 marzo era marcato con anello finlandese (M. Morbioli). Era stato inanellato nel settembre dell'anno precedente, quando era stato considerato giovane nato nell'anno, nei pressi di Espoo, circa 1.900 km più a nord (archivio ISPRA).

Passeridae**Passera sarda *Passer hispaniolensis***

Si elencano una concentrazione consistente in periodo invernale e i dati relativi alla nidificazione.

50 indd. in Sacca di Scardovari (RO) il 15 gennaio (L. Sattin).

Nidifica nel Delta del Po (RO) con alcune decine di cpp., quasi tutte concentrate lungo la Sacca di Scardovari (E. Verza et al.).

Motacillidae**Ballerina nera *Motacilla alba yarrelli***

2 indd. in Valle Scanarello (RO) il 9 marzo (D. Trombin [3]).

Calandro maggiore *Anthus richardi*

1 ind. a Salzano (VE) il 24 ottobre (fide L. Sattin).

Fringillidae

Peppola *Fringilla montifringilla*

Si elencano concentrazioni consistenti.

Circa 40.000 indd. presenti in Lessinia (VR) a partire dai primi di dicembre 2009 fino alla seconda metà di gennaio 2010, con roost notturno nell'alto Vajo dell'Anguilla (L. Signori, P. Parricelli, M. Sighele, R. Lerco et al. – cfr. SIGHELE et al., 2010).

1.000 indd. ca. sul Monte Pastello (VR) il 20 novembre (C. Izzo [1]).

Venturone alpino *Serinus citrinella*

3 indd. ad Auronzo di Cadore (BL) il 24 luglio (K. Bettiol [4]).

15 indd. nei pressi di Asiago (VI) dal 15 novembre ad almeno fine dicembre (A. Rigoni, P. Panarotto).

7 indd. a Fontani, Velo Veronese (VR), il 16 dicembre (P. Panarotto [1]).

Crociere *Loxia curvirostra*

Si elenca una segnalazione in località inusuale.

1-3 indd. a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 14 ottobre (L. Boscain, G. Basso [2][3]).

Ciuffolotto *Pyrrhula pyrrhula*

Si elenca la segnalazione di un individuo con vocalizzazioni caratteristiche della ssp. *pyrrhula*.

1 ind. a Alberoni, Venezia, il 2 febbraio (M. Basso [4]).

Emberizidae

Zigolo delle nevi *Plectrophenax nivalis*

2 indd. a Bocca di Selva, Bosco Chiesanuova (VR), l'11 gennaio (L. Longo [1]) e in seguito da 20 a 38 indd. tra il 29 gennaio e il 23 marzo (P. Parricelli, M. Sighele, M. D'Offria, M. Azzolini, P. Panarotto et al. [2][3]) (fig. 9).

5-15 indd. al Lido di Venezia tra il 13 gennaio e il 15 febbraio (S. Castelli, M.G. Mitri, F. Antinori, A. Sartori [2][3]).

16 indd. in Laguna Sud di Venezia il 29 gennaio (L. Panzarin).

10-12 indd. a Malga Colonei di Pesina, Monte Baldo (VR), il 10 febbraio (M. Perbellini [1]).

1 ind. a Mestre (VE) il 26 e il 27 novembre (S. Zampedri, E. Stival et al. [2][3]).

2 indd. a San Giorgio, Bosco Chiesanuova (VR), il 4 dicembre (R. Lerco [1]), quindi 12 indd. al vicino Passo Branchetto il 14 dicembre (P. Parricelli, R. Boscaini et al. [1]), in seguito 12-18 indd. al tradizionale sito di Bocca di Selva dal 20 dicembre fino a metà febbraio 2011 (M. Dall'O, P. Parricelli, M. Sighele et al. [1]).

Zigolo golarossa *Emberiza leucocephala*

1-4 indd. a Maserada del Piave (TV) tra il 13 novembre 2009 fino ad almeno il 27 febbraio (G. Sgorlon, M. Nordio, P. Vacilotto, F. Zanatta et al. [2][3] - cfr. SIGHELE et al., 2010).

1-2 indd. a Maserada del Piave (TV) tra il 5 novembre fino ad almeno il 31 dicembre (P. Vacilotto, N. Cendron, A. Ravagnani et al. [3]); in seguito osservati anche 6-7 indd. fino ad almeno febbraio 2011 (G. Silveri, L. Boscain, P. Vacilotto et al. [3]).

1 ind. a Marina Nuova, Porto Levante (RO), il 28 dicembre (D. Trombin [3]).

Zigolo capinero *Emberiza melanocephala*

1 ind. a Rancani, Tregnago (VR), il 29 maggio (M. Pesente [1]).

SPECIE INTRODOTTE O SFUGGITE DALLA CATTIVITÀ

Dendrocigna fulva *Dendrocygna bicolor*

1 ind. in volo tra Lido Ronchi, Castelnuovo del Garda (VR), e Peschiera del Garda (VR) il 3 aprile (M. & G. Sighele, R. Lerco, M. Allen [1][3]).

2 indd. a Silea (TV) il 10 luglio e 1 ind. l'11 settembre (A. Pagani Cesa [3]).

Oca delle nevi *Anser caerulescens*

1 ind. in Valle Morosina (PD) l'11 marzo (L. Sattin [3]), di verosimile origine aufuga.

Oca egiziana *Alopochen aegyptiaca*

2 indd. alla Palude del Brusà, Cerea (VR), ai primi di gennaio (R. Pollo).

2 indd. in Valle Zignago (VE) l'11 gennaio (M. Basso).

1 ind. a San Martino di Venezze (RO) il 12 gennaio (D. Trombin).

3 indd., tra cui 1 juv., a Valle Vecchia di Caorle (VE) il 27 maggio (G. Sgorlon [2][3]), indd. già segnalati in questo sito (cfr. SIGHELE et al., 2010).

1 ind. a Ca' Pisani (RO) il 10 novembre (A. Farioli).

Anatra sposa *Aix sponsa*

1 ind. a Morgano (TV) il 18 febbraio (F. Salvini [4]).

Anatra dalla criniera *Chenonetta jubata*

1 ind. con anello in plastica in Val di Sogno, Malcesine (VR) il 17 gennaio (K. Tabarelli de Fatis et al. [1][3]).

Fischione del Cile *Anas sibilatrix*

1-2 indd. a Padova tra l'8 dicembre 2009 e il 3 gennaio (M. Zafarana, M. Basso [4] – cfr. SIGHELE et al., 2010).

Gru coronata *Balearica regulorum*

Si conferma la presenza, già segnalata da diversi anni, di 1 ind. al Busatello (VR) anche per tutto il 2010 (F. Novelli, M. Pesente et al. [1] – cfr. BON et al., 2008; SIGHELE et al., 2010).

Tortora delle palme *Streptopelia senegalensis*

1 ind. a Verona il 17 gennaio (A. Petronio [1]).

Rosella comune *Platycercus eximius*

1 ind. a San Martino di Venezze (RO) l'1 giugno (D. Trombin [4]).

Amazzone fronteggiata *Amazona ochrocephala*

1-2 ind. tra Villorba e Povegliano (TV) tra il 27 e il 29 dicembre (F. Zanatta).

Calopsitta *Nymphicus hollandicus*

1 ind. a Villadose (RO) il 6 ottobre (D. Trombin [4]).

1 ind. in Valle Grassabò (VE) nel mese di dicembre (fide E. Verza).

Ciuffolotto delle pinete *Pinicola enucleator*

1 ind. confidente a Vicenza il 10 gennaio (A. Giambolini).

Ciuffolotto messicano *Carpodacus mexicanus*

1 ind. a Caorle il 9 agosto (L. Canzan) (fig. 10).

APPENDICE

DATI RELATIVI AD ANNI ANTECEDENTI NON PUBBLICATI NEI PRECEDENTI RAPPORTI ORNITOLOGICI

Fischione americano *Anas americana*

1 ind. a Treviso nell'ottobre 2009 (A. Pagani Cesa), di verosimile origine aufuga.

Strolaga minore *Gavia stellata*

1 ind. al Lago di Santa Croce il 3 febbraio 2008 (G. Camuffo, M. Dal Pont).

Berta maggiore *Calonectris diomedea*

1 ind. in mare davanti a Caorle (VE) il 3 luglio 2008 (G. & C. Piras).

1-2 indd. in mare davanti a Caorle (VE) il 13 ottobre 2008 (G. & C. Piras).

Dovrebbero rappresentare la terza e la quarta segnalazione degli ultimi cinquant'anni per la provincia di Venezia e il Veneto (FANTIN, 1977; BON et al., 1993).

Airone guardabuoi *Bubulcus ibis*

Si elenca una segnalazione in provincia di Belluno.

1 ind. a Feltre (BL) il 29 dicembre 2006 (M. Dal Pont, G. Camuffo).

Airone schistaceo *Egretta gularis*

1 ind. alla Barena di Campalto (VE) il 5 agosto 2009 (M. Baldin).

Gipeto *Gypaetus barbatus*

1 ind. a Erera, Vette Feltrine (BL), il 17 giugno 2009 (F. Friz).

Grifone *Gyps fulvus*

2 indd. in Valle di Schievenin, Quero (BL), il 23 agosto 2009 (S. Umattino).

1 ind. a Forno di Zoldo (BL) il 23 settembre 2009 (M. Dal Pont, G. Camuffo).

Lodolaio *Falco subbuteo*

Si elencano segnalazioni relative alla riproduzione in provincia di Belluno, dove la nidificazione non è ben documentata (Mezzavilla, 1989).

1 cp. ha certamente nidificato in Val Belluna (BL) nel 2008, mentre nel luglio 2009 è stato osservato esclusivamente un volo nuziale (M. Dal Pont, G. Camuffo).

Inseparabile mascherato *Agapornis personatus*

1 ind. recuperato a Spinea (VE) il 7 agosto 2009 (M. Bon), di origine aufuga.

Picchio rosso minore *Dendrocopos minor*

Si elencano segnalazioni antecedenti al 2010 non citate da Varaschin et al. (2011).

1 ind. a Belluno il 7 ottobre 2003 (G. Camuffo, M. Dal Pont).

1 ind. a Belluno il 15 ottobre 2008 (G. Nadalet, M. Dal Pont).

1 ind. sul Monfenera, Pederobba (TV), il 2 dicembre 2009 (G. Silveri).

Beccofrusone *Bombycilla garrulus*

40 indd. a Belluno il 27 gennaio 2009 (M. Dal Pont, G. Camuffo).

16 indd. a Tambre (BL) il 27 gennaio 2009 (M. Dal Pont, G. Camuffo).

Storno roseo *Pastor roseus*

19 indd. a Belluno il 27 giugno 2006 (M. Dal Pont, G. Camuffo).

Tessitore testanera dei villaggi *Ploceus cucullatus*

1 ind. a Sandrà, Castelnuovo del Garda (VR), l'11 agosto 2009 (A. Boscherini), forse lo stesso segnalato in precedenza sulla costa gardesana il 30 maggio (cfr. SIGHELE et al., 2010), di verosimile origine aufuga.

Ciuffolotto messicano *Carpodacus mexicanus*

1 ind. a Belluno il 20 maggio 2009 (M. Dal Pont, G. Camuffo), di verosimile origine aufuga.

RINGRAZIAMENTI

Questo rapporto non sarebbe stato realizzato senza la collaborazione di tutti gli amici ornitologi e birdwatcher impegnati sul campo, a cui va il principale merito di questo lavoro. Un particolare ringraziamento a Giancarlo Fracasso, Francesco Mezzavilla, Marco Pesente, Francesco Scarton, Massimo Semenzato per la revisione dei dati e il contributo critico, a Maurizio Azzolini, Giacomo Sgorlon, Giancarlo Silveri, Marco Zenatello per il completamento di alcune informazioni, a Mick Allen per il riassunto in inglese.

Bibliografia

- ARRIGONI DEGLI ODDI E., 1899. Note ornitologiche sulla Provincia di Verona. *Atti Soc. ital. Sc. Nat.*, 38 1/2: 75-191.
- ARRIGONI DEGLI ODDI E., 1929. Ornitologia italiana. *Hoeppli Ed.*, 1046 pp.
- BON M., SEMENZATO M. (red.), 2002. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anni 1999, 2000 e 2001. *Boll. Mus. civ. St. Nat. Venezia*, 53: 231-258.
- BON N., RICHARD J., SEMENZATO M., 1993. La collezione di vertebrati di Giacomo Bisacco Palazzi come testimonianza storica dell'ambiente planiziale e costiero veneto. *Lavori Soc. Ven. Sc. Nat.*, 18: 133-171.
- BON M., SEMENZATO M., FRACASSO G., MARCONATO E., 2008. Sintesi delle conoscenze sui vertebrati alloctoni del Veneto. *Boll. Mus. civ. St. nat. Venezia*, 58 (suppl.): 37-64.
- BON M., SIGHELE M., VERZA E. (red.), 2003. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2002. *Boll. Mus. civ. St. Nat. Venezia*, 54: 123-160.
- BON M., SIGHELE M., VERZA E. (red.), 2004. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2003. *Boll. Mus. civ. St. Nat. Venezia*, 55: 171-200.
- BON M., SIGHELE M. & VERZA E. (red.), 2005. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2004. *Boll. Mus. civ. St. Nat. Venezia*, 56: 187-211.
- BON M., SIGHELE M., VERZA E. (red.), 2007. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2006. *Boll. Mus. civ. St. Nat. Venezia*, 54: 269-292.
- BON M., SIGHELE M., VERZA E. (red.), 2008. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2007. *Boll. Mus. civ. St. Nat. Venezia*, 59: 129-151.
- BOTTAZZO S., PIRAS G., TONELLI A., 1999. Uccelli rapaci diurni dei Colli Euganei. *Lavori Soc. Ven. Sc. Nat.*, 24: 41-50.
- BRICHETTI P., FRACASSO G., 2006. Ornitologia Italiana. Vol. 3 – Stercorariidae - Caprimulgidae. *Alberto Perdisa Editore*, Bologna, 438 pp.
- BRICHETTI P., FRACASSO G., 2008. Ornitologia Italiana. Vol. 5 - Turdidae - Cisticolidae. *Oasi Perdisa Editore*, Bologna, 430 pp.
- BRICHETTI P., LO VALVO F., 1992. Oca colorata. In: Brichetti P., De Franceschi P., Baccetti N., Fauna d'Italia - vol. XXIX - AVES I - Gaviidae-Phasianidae. *Calderini ed.*, Bologna: 301-303.
- BRICHETTI P., OCCHIATO D., 2005. Commissione Ornitologica Italiana - Report 18. *Avocetta*, 29 (2): 93-107.
- FANTIN G., 1977. Veneto 1976: consuntivo di un anno. *Uccelli d'Italia*, 2: 181-189.
- FOSCHI U.F., BULGARINI F., CIGNINI B., LIPPERI M., MELLETTI M., PIZZARRI T., VISENTIN M., 1996. Catalogo della collezione ornitologica "Arrigoni degli Oddi" del Museo Civico di Zoologia di Roma. *Ric. Biol. Selvaggina*, INFS Bologna, 97: 176.
- FRACASSO G., BACCETTI N., SERRA L., 2009. La lista CISO-COI degli Uccelli italiani - Parte prima: liste A, B e C. *Avocetta*, 33: 5-24.
- FRACASSO G., MEZZAVILLA F., SCARTON F. 2011. Checklist degli Uccelli del Veneto (maggio 2010). *Boll. Mus. St. nat. Venezia*, suppl. al vol. 61: 103-117.
- GUZZON C., PANZARIN L., 2005. Forapaglie comune *Acrocephalus schoenobaenus* nidificante in cariceti soggetti a marea dell'Alto Adriatico: siti riproduttivi nuovi o "ritrovati" dopo un secolo? *Avocetta*, 29 (n. sp.): 81.
- JANNI O., FRACASSO G., in stampa. Commissione Ornitologica Italiana (C.O.I.) – Report 23. *Avocetta*, 34.
- JANNI O., FRACASSO G., in prep. Commissione Ornitologica Italiana (C.O.I.) – Report 24. *Avocetta*.
- MASSA R. (a cura di), 2000. I nomi in lingua italiana degli uccelli di tutto il mondo. Nuova edizione della lista di R. Massa, L. Bottoni e C. Violani. *Università degli Studi di Milano, Stazione Italiana per la Ricerca Ornitologica*.
- MELLONE U., SIGHELE M. (a cura di), 2007. Resoconto Ornitologico Italiano - Anno 2006. *Avocetta*, 31 (2): 79-86.
- MEZZAVILLA F., 1989. Atlante degli uccelli nidificanti nelle province di Treviso e Belluno (Veneto) 1983-1988. *Mus. Civ. St. Sc. Nat. Montebelluna*, 118 pp.
- MEZZAVILLA F., SILVERI G., 2007. Occhione. In: Mezzavilla F., Bettiol K. (a cura di), Nuovo atlante degli Uccelli nidificanti in provincia di Treviso (2003-2006). *Associazione Faunisti Veneti*: 65.
- MEZZAVILLA F., STIVAL E., NARDO A., ROCCAFORTE P., 1999. Rapporto Ornitologico Veneto orientale - anni 1991-98. *CORVO*, 64 pp.
- MORBIOLI M., SIGHELE M., 2006. L'avifauna del Laghetto del Frassino (Peschiera del Garda, Verona, Veneto). *Boll. Mus. civ. St. nat. Verona*, 30: 275-291.
- MORUS, 2010. Progetto Uccelli Marini. *Bollettino Morus*, 3, 33 pp.
- MORUS, 2011. Progetto Uccelli Marini. *Bollettino Morus*, 4, 26 pp.
- NARDO A., 2001. Avvistamenti di Lanario *Falco biarmicus* in Veneto. In: Arcamone E., Brichetti P., Nuovi avvistamenti. *Avocetta*, 25: 311.
- SANGSTER G., COLLINSON J.M., KNOX A.G., PARKIN D.T., SVENSSON L., 2010. Taxonomic recommendations for British birds: Sixth report. *Ibis*, 152: 180-186.
- SCARTON F., BORELLA S., 1997. Avvistamento di Stercorario maggiore *Stercorarius skua* in provincia di Venezia. In: Arcamone E., Brichetti P., Nuovi Avvistamenti. *Avocetta*, 21: 224.

- SEMENZATO M., SCARTON F., 1998. Interessanti reperti conservati nella collezione "Americo Giol" di Oderzo (Treviso). *Riv. ital. Orn.*, 68 (2): 189.
- SIGHELE M., BON M., VERZA E. (red.), 2009. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2008. *Boll. Mus. civ. St. nat. Venezia*, 60: 143-168.
- SIGHELE M., BON M., VERZA E. (red.), 2010. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2009. *Boll. Mus. St. nat. Venezia*, 61: 83-115.
- TOSO S. (red.), 1981. Nuovi Avvistamenti. *Avocetta*, 5: 103-106.
- VARASCHIN M., ZENATELLO M., VILLA M., 2011. C'è ma non si vede? Il Picchio rosso minore *Dendrocopos minor* in Veneto. *Boll. Mus. St. nat. Venezia*, suppl. al vol. 61: 245-249.
- VIOLANI C., BARBAGLI F., 2006. Repertorio italiano dei nomi degli uccelli - parte prima: *Struthioniformes* – *Psittaciformes*. *Avocetta*, 30 (num. sp.): 5-65.
- Gli indirizzi internet di riferimento delle *mailing list* consultate sono:
Verona BW: www.veronabirdwatching.org
Venezia BW: it.groups.yahoo.com/group/venezia_bw
EBN Italia: www.ebnitalia.it
Ornitho: www.ornitho.it



Fig. 1. Oca lombardella minore (*Anser erythropus*) a destra, a confronto con oca lombardella (*Anser albifrons*), Sindacale di Concordia Sagittaria (VE). Foto di E. Stival.



Fig. 2. Albanella pallida (*Circus macrourus*), Valle Vecchia di Caorle (VE). Foto di E. Stival.



Fig. 3. Poiana calzata (*Buteo lagopus*), Valle Grassabò (VE). Foto di E. Stival



Fig. 4. Aquila anatraia minore (*Aquila pomarina*), Valle Vecchia di Caorle (VE). Foto di E. Stival.



Fig. 5. Falco della Regina (*Falco eleonorae*), Colli Euganei (PD). Foto di A. Tonelli.



Fig. 6. Sacro (*Falco cherrug*), Grave di Papadopoli (TV). Foto di F. Zanatta.



Fig. 7. Cuculo dal ciuffo (*Clamator glandarius*), Cinto Euganeo (PD). Foto di A. Tonelli.



Fig. 8. Pigliamosche pettirosso (*Ficedula parva*), Valle Vecchia di Caorle (VE). Foto di F. Trave.



Fig. 9. Zigolo delle nevi (*Plectrophenax nivalis*), Lessinia (VR). Foto di R. Lerco.



Fig. 10. Ciuffolotto messicano (*Carpodacus mexicanus*), Caorle (VE). Foto di L. Canzan.