

CRAMP S. & SIMMONS K. E. L. (eds.), 1977 - The Birds of the Western Palearctic, Vol. I - Oxford University Press, Oxford.

SÖDING K., 1950 - Pfeifenten als Nehrungsschmarotzer bei Blässhühnern - *Orn. Mitt.*, 2: 146-147.

PIETRO GIOVACCHINI & GIUSEPPE ANSELMI

Parco Naturale della Maremma, Loc. Pianacce, 58010 Alberese (Grosseto).

Riv. ital. Orn., Milano, 62 (3-4): 187-188, 15-XII-1992

CATTURA DI PIRO PIRO FULVO, *Tryngites subruficollis*, IN LAGUNA DI VENEZIA

ABSTRACT. — *Capture of a Buff-breasted Sandpiper, Tryngites subruficollis, in the Lagoon of Venice (NE Italy).*

Nel corso di attività di inanellamento di limicoli effettuate mensilmente in Laguna di Venezia, il 5 ottobre 1991, alle ore 22, è stato catturato un individuo di Piro piro fulvo. La località nella quale è avvenuta la cattura è situata tra l'Isola di S. Erasmo e la Bocca di Porto di Lido (45.27 N - 12.25 E) ed è costituita da una vasta area sabbiosa, soggetta a marea e priva di vegetazione, intramezzata da zone barenose ricoperte da tipica vegetazione alofila. I principali dati biometrici dell'individuo erano i seguenti, in mm: ala (corda massima) 130, tarso 28, becco 17,6, coda 52, peso 66 g; era presente un notevole accumulo di grasso sottocutaneo. In base a questi dati (misura dell'ala e del tarso in particolare) ed alla colorazione delle scapolari, delle copritrici mediane e delle copritrici primarie inferiori (fig. 1), l'individuo è stato ritenuto una femmina giovane (cfr. PRATER et al. 1977, HAYMAN et al. 1986). Il soggetto è stato inanellato con anello I.N.B.S. ZN6066 e quindi rilasciato alle ore 9 del mattino successivo. Dopo l'involo si è posato in una vicina zona coperta da vegetazione erbacea senza emettere alcuna vocalizzazione.

Questa è la undicesima segnalazione della specie per l'Italia (BRICHETTI & MASSA 1991) e la prima per il Veneto. Anche la maggior parte delle altre osservazioni italiane, tutte relativamente recenti, sono state effettuate durante la migrazione autunnale, tra agosto e novembre (BRICHETTI 1984, DIMARCA et al. 1986); una sola osservazione è avvenuta al di fuori di questo periodo, il 21 maggio (RASPAGNI 1985). Infine, anche le due segnalazioni esistenti per Malta sono relative al mese di ottobre (SULTANA & GAUCI 1982).

BIBLIOGRAFIA

- BRICHETTI P., 1984 - Nota sul Piro piro fulvo, *Tryngites subruficollis*, e nuova segnalazione per la Lombardia - *Uccelli d'Italia*, Ravenna, 9: 54-56.
- BRICHETTI P. & MASSA B., 1991 - Aggiunte e rettifiche alla Check-List degli uccelli italiani, 2 - *Riv. ital. Orn.*, Milano, 61: 3-9.
- DIMARCA A., GIUDICE E. & LONGO A., 1986 - Nuove osservazioni di Piro piro fulvo, *Tryngites subruficollis*, in Sicilia - *Riv. ital. Orn.*, Milano, 56: 250.
- HAYMAN P., MARCHANT J. & PRATER A. J., 1986 - Shorebirds: an identification guide to the waders of the world - *Christopher Helm*, Bromley, Kent.
- PRATER A. J., MARCHANT J. H. & VUORINEN J., 1977 - Guide to the identification and ageing of holaretic waders - BTO Guide, 17. *B.T.O.*, Tring, Herts.
- RASPAGNI D., 1985 - Osservazioni ornitologiche in Lomellina (Pavia) - *Riv. ital. Orn.*, Milano, 55: 180.
- SULTANA J. & GAUCI C., 1982 - A New Guide to the Birds of Malta - *The Ornithological Society*, Malta.

SONIA ALBERGHETTI, DARIO CESTER, GIUSEPPE CHERUBINI
ADRIANO DE FAVERI, ROBERTA MANZI & FERRUCCIO PANZARIN

C.O.R.V.O. (Centro Ornitologico Veneto Orientale), c/o Museo di Storia Naturale,
31044 Montebelluna (Treviso).



Fig. 1. — Particolare della pagina inferiore dell'ala del Piro piro fulvo. Si nota il disegno delle copritrici primarie inferiori, non ancora uniformemente scure come nell'adulto.