

ESPANSIONE DI AIRONE CENERINO, *ARDEA CINEREA*, ED AIRONE  
GUARDABUOI, *BUBULCUS IBIS*, NEL VENETO

**Abstract.** *Spreading of Grey Heron, Ardea cinerea, and Cattle Egret, Bubulcus ibis, in the Veneto region, NE Italy.*

We collected all the available recent breeding records of Grey Heron and Cattle Egret in the Veneto region. The former species settled there in 1986, the latter one settled in 1993 and 3 to 5 pairs nested in 1997.

INTRODUZIONE E METODI

Le due specie oggetto di studio hanno colonizzato il Veneto, rispettivamente, nel 1986 (Airone cenerino: MEZZAVILLA, ET AL. 1994) e nel 1993 (Airone guardabuoi: PASSARELLA, 1995); scopo di questo lavoro è di documentarne l'attuale distribuzione nell'ambito regionale, utilizzando dati pubblicati e osservazioni inedite, nostre e di altri autori, frutto di ricerche finalizzate alla conoscenza della biologia degli Ardeidi, condotte negli anni 1993-1997.

RISULTATI

AIRONE CENERINO

La situazione della specie nel Veneto è riassunta nella seguente cronologia degli insediamenti nelle varie province:

**Treviso:** prima nidificazione lungo il corso del Piave nel 1986, con una popolazione salita a 70-75 coppie nel 1994 (MEZZAVILLA ET AL., 1994). Secondo sito riproduttivo nella garzaia dell'Isola di S. Cristina: 10 coppie nel 1993 (MEZZAVILLA ET AL., 1993).

**Venezia:** prima nidificazione in Laguna nella garzaia di Valle Figheri, nel 1993 con 4 coppie, aumentate a 26 nel 1994, a 52 nel 1995 (AMATO ET AL., 1995) ed a 86 nel 1997 (G. Tiloca com. pers.).

**Belluno:** nidificazione accertata nel 1995 con 6-7 nidi in due siti (fiume Piave a Longarone e Lago del Corlo), aumentati a 15 nel 1996 (TORMEN ET AL., 1996); nel 1997, nidificazione ripetuta negli stessi siti con 35-40 coppie in totale (G. Tormen com. pers.).

**Vicenza:** prime nidificazioni nel 1995, con due coppie isolate, rispettivamente in località Olmo di Creazzo, e ad Arsiero (GRUPPO NISORIA, 1997).

**Rovigo:** una coppia ha nidificato per la prima volta nel 1995 in colonia con Airone rosso in un canneto sito in Valle Morosina di Rosolina; poi 2-3 coppie si sono riprodotte ancora nello stesso sito nel 1996, aumentate a 15-16 nel 1997; secondo sito riproduttivo in una garzaia mista lungo l'asta del Po in località Canalnovo di Villanova Marchesana, con almeno 1 coppia nel 1996 e 14-15 nel 1997 (Passarella, oss. pers.)

**Padova:** abbiamo accertato per la prima volta in provincia di Padova la riproduzione con successo di una coppia isolata nel 1996 nel parco di Villa Widmann-Borletti a Bagnoli di Sopra (Passarella, oss. pers.).

#### AIRONE GUARDABUOI

Nel 1993 fu individuato un nido della specie in una garzaia situata nel tratto rodigino del Po di Goro (Ariano Polesine); qui la riproduzione è avvenuta ancora con 3 coppie nel 1994 (PASSARELLA, 1995), e poi non si è più ripetuta, mentre si è registrato l'insediamento in un'altra garzaia sul Po di Tolle (Porto Tolle) con 3 coppie nel 1995 e 6 nel 1996. Sul Po di Maistra (Porto Tolle) la riproduzione è probabile sin dal 1994, per la presenza di individui in abito in periodo riproduttivo, ma mai accertata per le difficoltà di accesso ai nidi.. Nel 1996 1-2 coppie si sono riprodotte in una garzaia situata sul Po di Venezia presso Contarina di Porto Viro.

Nel luglio del 1996 è stata osservata una coppia con 2/3 juv appena involati nella garzaia di Val Figheri, Laguna di Venezia (M. Chiavetta ined.); in precedenza alcuni individui erano stati osservati in aree limitrofe: in Valle Averno (1 il 22.5.96, 3 il 26.5.96: G. Rallo, com. pers.; e 5 il 27.5.96: Zaccaria, com. pers.) e alle Giare di Mira (7 il 2.6.96: G. Rallo, com. pers.).

Nel 1997 erano presenti nel Delta del Po 3-5 coppie in 2 colonie.

Per quanto riguarda lo svernamento dell'Airone guardabuoi, nel Delta del Po (Rovigo e Ferrara) conteggi regolari sono stati effettuati a partire dall'inverno 1993-1994 (13-15 individui: Passarella, 1995), ed hanno permesso di rilevare un costante incremento, sia di siti utilizzati per i dormitori (da 4 nel 1993-1994 a 13 nel 1995-1996) che di individui presenti: da 172 nell'inverno 1995-1996, a 277-282 nell'inverno 1996-1997, di cui 117 individui distribuiti in 5 siti in provincia di Rovigo (PASSARELLA ET AL., 1997). Da segnalare la presenza di un individuo nel novembre 1994 in Valle Millecampi, Padova (S. Bottazzo, com. pers.), e di un altro in Valle Zappa, Venezia, l'1/2/1997 (G. Rallo com. pers.).

#### DISCUSSIONE

L'Airone cenerino è in aumento in Italia in modo costante dal 1984 (FASOLA E ROMAGNOLI, 1995), con incremento sia del numero di coppie nidificanti che di siti occupati. Nel Veneto utilizza per nidificare alternativamente ambienti di canneto o alberi, ed è diffuso dalla pianura fino a circa 450 m (Longarone). La specie tende a colonizzare anno dopo anno nuovi siti, riproducendosi in aree protette dal disturbo, con poche coppie colonizzatrici, per poi aumentare costantemente negli anni successivi. Le colonie tendono ad essere spaziate alcune decine di chilometri.

La distribuzione della popolazione pioniera dell'Airone guardabuoi nel Delta del Po coincide con quella delle risaie, che risultano essere gli ambienti maggiormente frequentati in tutte le stagioni. Dall'inizio degli anni '90, è in atto un graduale aumento nel Delta del Po dell'area agricola interessata da tale coltura, presente anche nelle province di Padova e Vicenza.

Sulla base dei dati riassunti si può prevedere che nel prossimo futuro le

popolazioni venete delle due specie tendano ad aumentare, soprattutto nel caso di inverni miti, dando luogo ad ulteriori colonizzazioni.

#### RINGRAZIAMENTI

Desideriamo ringraziare tutti coloro che ci hanno comunicato le loro osservazioni personali: S. Bottazzo, M. Chiavetta, G. Rallo, G. Tiloca, G. Tormen e Zaccaria.

#### Bibliografia

- AMATO S., FASOLA M., SEMENZATO M., TILOCA G., BORGONI N., RICHARD J., 1995 - Le garzaie nella Laguna di Venezia (Italia nord-orientale): 1993-1995. *Avocetta*, 19: 39.
- FASOLA M., ROMAGNOLI L., 1995 - Heron population trends in Italy (1976-1994). *Avocetta*, 19: 42.
- GRUPPO NISORIA, 1997 - Atlante degli uccelli nidificanti nella provincia di Vicenza. *G. Pavan Editore*, Vicenza. 205 pp.
- MEZZAVILLA F., MARTIGNAGO G., NARDO A., SILVERI G., 1994 - Rapporto ornitologico Veneto Orientale. Anno 1994. *Boll. Cen. Orn. Veneto Or.*, 5: 1-15.
- MEZZAVILLA F., NARDO A., ROCCAFORTE P., STIVAL E., 1993 - Rapporto ornitologico Veneto Orientale. Anni 1991-93. *Boll. Cen. Orn. Veneto Or.*, 4: 1-12.
- PASSARELLA M., 1995. Nuove conoscenze sulla distribuzione di alcune specie ornitiche nel Delta del Po. *Quad. Staz. Ecol. Civ. Mus. St. nat. Ferrara*, 9: 313-320.
- PASSARELLA M., TENAN S., ALTIERI E., 1997. Censimenti invernali di Ardeinae (generi *Egretta* e *Bubulcus*) nelle province di Padova, Rovigo e Ferrara (Veneto, Emilia-Romagna). *Avocetta*, 21: 66.
- TORMEN G., DE FAVERI A., ZENATELLO M., 1996 - Nidificazione dell'Airone cinereo, *Ardea cinerea*, in provincia di Belluno. *Riv. ital. Orn.*, 66: 208-209.

#### Indirizzi degli autori:

Menotti Passarella, ASTER s.n.c., Piazza Umberto I° 33, 44026 Mesola (FE)  
Simone Tenan, Via Bisuccio 22, 45100 Rovigo  
Emilio Altieri, Via Pasubio 10, 45100 Rovigo