

MASSIMO SEMENZATO (*)

LA CICOGNA BIANCA *CICONIA CICONIA* (LINNEO)
NELLA PIANURA VENETA CENTRO-ORIENTALE
(PROVV. DI TREVISO, VENEZIA, PADOVA E ROVIGO)

Riassunto

Vengono riportati e commentati dati bibliografici e nuove segnalazioni riguardanti l'area costiera veneta, compresa fra le foci del Po e del Tagliamento. I dati acquisiti fanno ritenere la Cicogna bianca non più accidentale, ma migratrice regolare in questo settore della padania orientale. La tendenza osservata in alcuni soggetti ad una sosta prolungata, durante la migrazione primaverile, fa ritenere possibile un progetto di reintroduzione della specie come nidificante. Ciò sarebbe realizzabile in alcune aree protette della zona lagunare e dell'entroterra rurale.

Abstract

Whit stork Ciconia ciconia (Lin.) in the middle-east Venetian plan (districts of Treviso, Venezia, Padova and Rovigo).

Bibliographic data and new records from the Venetian coast (between the mouths of the Po and of the Tagliamento) are reported and discussed.

The occurrence of White stork in this area of the Po Valley appears to be due no longer to accidental individuals only, but probably to a regular migratory stream.

The tendency to a prolonged stop during the spring migration, observed in some individuals, indicates the feasibility of re-introducing the species as a nesting one in some protected areas of the coastal lagoons and of the rural inland.

Premessa

Con l'occasione datami dalla ripetuta osservazione di esemplari di Cicogna bianca, in ambienti contermini alla Laguna di Venezia, ho ritenuto utile riunire i dati disponibili in letteratura con le più recenti osservazioni, allo scopo di fornire un quadro aggiornato sulla presenza della specie nel settore centro-orientale della pianura veneta. Qui infatti si è mostrata più «frequente» che nel settore occidentale, probabilmente a causa del particolare assetto idrografico.

* CISO di Venezia, c/o Museo Civ. St. Nat., S. Croce 1730 - 30125 Venezia.

Il territorio cui si riferiscono queste osservazioni, è compreso tra la foce del Tagliamento, il delta del Po ed il limite superiore della fascia delle risorgive: una porzione della pianura e della costa veneta, resa in qualche modo omogenea dalla presenza di ampi sistemi lagunari-vallivi (Laguna di Caorle, Laguna di Venezia, Delta del Po) e dalle retrostanti aree agricole e di bonifica.

Considerazioni

Gli ornitologi veneti del secolo scorso (CONTARINI, 1843; NINNI, 1887; ARRIGONI, 1894), consideravano *Ciconia ciconia* «accidentale», più rara della stessa *Ciconia nigra*; questo, pur se indicata genericamente anche come nidificante nel Veneto, ancora nel XIX sec. (DE BETTA, 1863).

Il repertorio dei dati raccolti nella tabella mostra come la specie non possa più certo definirsi «accidentale», ma migratrice regolare, anche se in contingenti contenuti.

Gli avvistamenti si riferiscono ad individui osservati durante il volo migratorio soprattutto lungo le aste dei fiumi alpini (Brenta, Piave) e dei fiumi di risorgenza.

Questi corsi fluviali segnano una linea-guida di direzione SE/NO nella bassa e nell'alta pianura, che si inverte nel senso SO/NE allo sbocco delle vallate alpine nell'area planiziale (CANDIDA, 1972) fig. 1a.

Nei casi in cui è stato possibile registrare le direzioni di volo, (35, 36, 37, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 63, 66, della Tabella), le Cicogne seguivano infatti queste direttrici fluviali.

Come si rileva dalla fig. 1b e dalla Tabella, gli avvistamenti sono concentrati nel periodo della migrazione primaverile (47 su 62 di quelli di cui è disponibile il dato completo): ciò conferma quanto già osservato da BRICHETTI (1982) sulla scelta del versante adriatico per la risalita agli areali di nidificazione.

Alla linea guida indicata dai fiumi veneti corrisponde un sistema orografico che, come dimostrano le osservazioni di gruppi anche consistenti di Cicogna bianca nelle vallate alpine (GORFER, 1966; NIEDERFRINIGER, 1973; FANTIN, 1979), è certamente collegato ai sistemi idrografici dell'Europa centrale (fig. 1a)⁽¹⁾.

Si è verificata inoltre, nei casi 25-34-35-38-43-53-58-59-60-61-64, una sosta prolungata da un minimo di 1 giorno ad un massimo di 5, di esemplari in migrazione primaverile.

(1) A complemento si riportano i luoghi di provenienza degli esemplari inanellati, sempre compresi nella Tabella:

- 17) Woudrichen, Noord Brabant (Olanda), 1936 (MOLTONI, 1976)
- 19) Olanda, 7.04.1938 (MOLTONI, 1939)
- 24) Potzlou, Prenzlau (Germania Orientale), 9.07.1950 (MOLTONI, 1966)
- 27) Muzeum Praha B. 7807, suo dato ma ante 1956 (FAVERO, 1956)
- 28) Rotgebüttel (Germania Orientale), 25.07.1960 (MOLTONI, 1966)
- 31) St. Jynde vad (Danimarca), 23.06.1959 (MOLTONI, 1973)
- 33) Bad Duchau, Sudwurttemberg (Germania), 26.06.1954 (MOLTONI, 1976)




Fig. 1b




Fig. 1c



Fig. 1a

Fig. 1a: Posizione della zona esaminata

Fig. 1b: Località delle osservazioni

Ma: migrazione autunnale Mp: migrazione primaverile I: invernale

Fig. 1c: Grafico delle presenze mensili

Questa è avvenuta in località sufficientemente ampie ed isolate, come casse di colmata o spianate di bonifica agricola nella Laguna di Venezia, ma soprattutto in aree rurali gravitanti nella pianura a cavallo tra le provincie di Padova, Treviso e Venezia.

In questo comprensorio viene ancora praticata una agricoltura a livello «familiare», dove le colture cerealicole si alternano ad ancora frequenti prati stabili e di vicenda. Inoltre le scoline con siepe, che cintano le proprietà, i residui di ambienti umidi legati ai fontanili, nonché le cave di argilla (che — conclusasi l'attività estrattiva — si trasformano in ambienti lenticci, per molti versi assimilabili alle bonificate paludi dulciacquicole), contribuiscono a diversificare le disponibilità trofiche per eventuali Cicogne in sosta anche presso e addirittura entro gli stessi centri abitati (2).

Conclusioni

Un parziale successo a coronamento degli interventi di educazione e di protezione della specie, soprattutto nel decennio 1975-1985 (periodo in cui è notevolmente diminuito il numero degli abbattimenti), può aver contribuito a riconsolidare il contingente migratorio che usa la penisola italiana quale «terza via» ai quartieri di svernamento (BRICHETTI, 1982), almeno per l'area di queste osservazioni. Ciò è confermato anche dall'aumentata frequenza di soggetti in sosta per lunghi periodi, sebbene non ancora come in settori della Padania occidentale (BOANO, 1981; MOSTINI, 1982; BORDIGNON, in stampa).

Tali presenze potrebbero essere consolidate e divenire oggetto di un programma di reintroduzione della specie come nidificante (3).

Questo sarebbe realizzabile oltre che in certe aree della pianura sopra descritta (delle quali vengono proposte come Riserva Naturale Regionale: Palude di Onara - Sorgenti del Sile - Grave del Piave, ai sensi della L.R. del Veneto n. 40/16.08.1984) anche in aree vallive e deltizie, che se adeguatamente tutelate e «collegate» a contermini aree agricole e di bonifica potrebbero ospitare individui semi-selvatici di richiamo e maggior stimolo alla sosta per quegli esemplari che, come visto, già lo fanno naturalmente.

(2) A conferma, però, di quanto sia difficile una educazione alla tutela della specie, si ricorda come l'esemplare 51, posatosi su di un albero al centro di Santambrogio (PD) fu abbattuto nottetempo! (PELLIZZON, 1983).

(3) A tal proposito si ricorda come il Polesine fino al sec. XVI, rientrasse ancora pienamente nell'areale di nidificazione italiano di *Ciconia ciconia* (BRICHETTI, 1982): dato di presenza storica della specie che può confortare la reintroduzione nell'area in esame, come recentemente prospettato dalla Lega Italiana Protezione Uccelli e da ricercatori impegnati nella conservazione ambientale (MURARO e ZANICHELLI, 1986).

Ringraziamenti

Un sincero ringraziamento va agli amici Gianni Are, Pierandrea Brichetti, Stefano Borella, Daniele De Poli, Giustino Mezzalira e Giampaolo Rallo che mi hanno cortesemente fornito dati e segnalazioni bibliografiche; ringrazio inoltre la direzione del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia per la collaborazione nella ricerca bibliografica e l'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina.

TABELLA RIASSUNTIVA DEI DATI RACCOLTI

<i>n.</i>	<i>data</i>	<i>località</i>	<i>bibliografia</i>
1) 1	2.12.1860	Pozzonuovo (PD)	ARRIGONI 1894
2) 1 ♂	2.06.1877	Monselice (PD)	ARRIGONI 1899
3) 1 ♂	2.05.1883	Val Corba (PD)	ARRIGONI 1899
4) 1 ♂	9.04.1893	Camposampiero (PD)	ARRIGONI 1899
5) 1 ♂	5.08.1893	Valle Rivola (VE)	BISACCO PALAZZI 1935
6) 1	18.04.1895	Monselice (PD)	ARRIGONI 1897
7) 1	19.04.1895	Colle di Baone (PD)	ARRIGONI 1897
8) 1 ♂	7.05.1895	Burano (VE)	NINNI 1900
9) 1	25.06.1895	Camposampiero (PD)	ARRIGONI 1897
10) 1	5.08.1895	Dolo (VE)	ARRIGONI 1897
11) 1 ♂	16.05.1900	Cendon (TV)	NINNI 1900
12) 1	?.?.1922	Salzano (VE)	FAVERO 1935
13) 1 ♂	7.04.1933	Mestre (VE)	FAVERO 1935
14) 1 ♂	21.04.1933	Zianigo (VE)	FAVERO 1935
15) 1	2.05.1934	Martellago (VE)	FAVERO 1935
16) 1 ♂	1.05.1934	Treviso	NINNI 1934
17) 1	17.08.1936	Fossalta di Portogr. (VE)	MOLTONI 1976
18) 1	18.04.1937	Mirano (VE)	FAVERO 1937
19) 1	7.04.1938	Sandrigo (VI) (*)	Archivio I.N.B.S.
20) 1 ♂	6.05.1940	Orsago (TV)	FAVERO 1941
21) 1 ♂	6.06.1942	Portogruaro (VE)	FAVERO 1943
22) 1 ♂	18.09.1943	Concordia Sagittaria (VE)	FAVERO 1944
23) 2	12.05.1950	Concordia Sagittaria (VE)	FAVERO 1951
24) 1	14.04.1954	presso Treviso	MOLTONI 1966
25) 5	24.04.1954	foci del Tagliamento (VE)	FAVERO 1955
26) 1 ♂	4.09.1954	Porto Tolle (RO)	RALLO 1975
27) 1 ♀	2.10.1956	Chiarano (TV)	FAVERO 1956
28) 1	28.08.1960	Ponte S. Nicolò (PD)	MOLTONI 1966
29) 1	estate 1960	Mestre (VE)	RALLO 1975
30) 1	estate 1960	Badoere (TV)	RALLO 1975
31) 1	2.12.1962	Porto Tolle (RO)	MOLTONI 1973

<i>n.</i>	<i>data</i>	<i>località</i>	<i>bibliografia</i>	
32)	1	18.05.1966	Valle Pagliaga (VE)	RALLO 1975
33)	1	2.03.1971	Breda di Piave (TV)	MOLTONI 1976
34)	2	2.04.1972	Cave di Pionca (PD)	RALLO 1975
35)	1	29.05.1974	Bressanvido (VI) (*)	MEZZALIRA n.s.
36)	1	24.05.1975	Mestre (VE)	SEMENZATO e ARE 1982
37)	4	27.07.1976	Mestre (VE)	SEMENZATO e ARE 1982
38)	1	3.06.1976	Bressanvido (VI) (*)	MEZZALIRA n.s.
39)	1	10.04.1976	Caorle (VE)	FANTIN 1977
40)	3	2.2.1977	Bressanvido (VI) (*)	MEZZALIRA n.s.
41)	1	2.2.1977	Venezia	RALLO e PALMA 1981
42)	3	19.03.1977	Fagarè (TV)	FANTIN 1978
43)	2	14.05.1978	Cassa di Colmata A (VE)	ARE IN RALLO 1979
44)	2	2.10.1978	Cassa di Colmata A (VE)	ARE IN RALLO 1979
45)	1 ♂	14.04.1979	Susegana (TV)	FANTIN 1980
46)	1 ♀	25.05.1979	Moriago (TV)	FANTIN 1980
47)	1	9.05.1979	Istrana (TV)	FANTIN 1980
48)	2	6.04.1980	Fagarè (TV)	FANTIN 1981
49)	2	20.04.1980	Trepalade (VE)	FANTIN 1981
50)	6	13.05.1980	Povegliano (TV)	FANTIN 1981
51)	4	14.05.1980	presso Mestre (VE)	FANTIN 1981
52)	1	21.12.1980	S. Cristina di Quinto (TV)	FANTIN 1981
53)	1	19.04.1981	S. Ambrogio (PD)	PELLIZZON 1983
54)	2	5.06.1981	presso Mestre (VE)	BOLDRIN n.s.
55)	1	8.06.1981	Lugo (VE)	BOLDRIN n.s.
56)	1	14.04.1983	Mestre (VE)	SEMENZATO n.s.
57)	1	25.04.1983	Giare (VE)	BORELLA, BUSAN e SEMENZATO n.s.
58)	1	3.05.1983	Giare (VE)	BIASIOLO n.s.
59)	1	primavera 1984	Quinto (VI) (*)	MEZZALIRA n.s.
60)	8	2.06.1984	presso Codevigo (PD)	BORELLA n.s.
61)	1	28.05.1984	Caltana (VE)	MARCHIORO n.s.
62)	1	primavera 1985	Quinto (VI) (*)	MEZZALIRA n.s.
63)	1	2.04.1985	Millepertiche (VE)	DE POLI n.s.
64)	1	10.04.1985	Cassa di Colmata A (VE)	ARE n.s.
65)	4	14.08.1985	Cavallino (VE)	SPEZZANI n.s.
66)	1	2.09.1985	Ca' Noghera (VE)	DE POLI n.s.
67)	2	2.10.1985	Cavallino (VE)	MARTINI n.s.

(*) L'asterisco contrassegna delle località che, se pur appartenenti alla provincia di Vicenza, sono situate in un'area contigua ed omogenea come ambiente alla finitima provincia di Padova. In questa stessa area, dal 18 al 21 Aprile 1986, ha sostato una coppia che frequentava, durante il giorno, i prati a sfalcio e che sceglieva come dormitorio il parco di un villa di Bressanvido (VI), ove l'amico Giustino Mezzalira ha osservato inscenare, da uno dei componenti della coppia, parte del rituale di corteggiamento.

n.s.: nuova segnalazione.

Bibliografia

- ARRIGONI DEGLI ODDI E. (1894) - Materiali per la Fauna Padovana degli animali vertebrati. Estratto dagli *Atti Soc. Ital. Sc. Nat.*, **34**, 68 pp.
- ARRIGONI DEGLI ODDI E. (1897) - Note ornitologiche per l'anno 1895. Estratto dagli *Atti Soc. Ital. Sc. Nat.*, **36**, 8 pp.
- ARRIGONI DEGLI ODDI E. (1899) - Elenco degli Uccelli rari o più difficili ad aversi conservati nella sua collezione Ornitologica Italiana al 31 dicembre 1898. *Ornis* **9**: 199-249.
- BISACCO PALAZZI G. (1935) - Contributo all'avifauna veneta. *Boll. Soc. Ven. St. Nat.* **1** (7-8): 157-166.
- BOANO G. (1981) - La Cicogna bianca in Piemonte. *Riv. Piem. St. Nat.*, **2**: 59-70.
- BORDIGNON L. (in stampa) - Estivazione e nidificazione della Cicogna bianca in Italia. *Atti III Convegno Italiano di Ornitologia*, Salice Terme (PV), 3-6/X/1985.
- BRICHETTI P. (1982) - Distribuzione geografica degli uccelli nidificanti in Italia, Corsica e Isale Maltesi, 2. Famiglie Phalacrocoracidae, Ciconiidae, Treskiornithidae. *Atti Mus. Civ. St. Nat. Brescia* **19**: 97-157.
- CANDIDA L. (1972) - Memoria illustrativa della carta della utilizzazione del suolo del Veneto. C.N.R., pp. 1-169, Napoli.
- CONTARINI N. (1843) - Cataloghi degli uccelli e degli insetti delle provincie di Padova e Venezia... Tip. *Baseggio* Ed., pp. 1-14, Bassano.
- DE BETTA E. (1863) - Materiali per una Fauna Veronese. *Memorie Acc. Agr. Arti Comm. Verona*, **43**: 122-209.
- FANTIN G. (1977) - Veneto 1976: consuntivo di un anno. *Uccelli d'Italia* **2**: 181-189.
- FANTIN G. (1978) - Veneto 1977: le notizie dell'anno. *Uccelli d'Italia* **3**: 149-159.
- FANTIN G. (1979) - Veneto 1978. Annata intensa e difficile. *Uccelli d'Italia*, **3**: 99-119.
- FANTIN G. (1980) - Rapporto dal Veneto 1979. *Uccelli d'Italia* **5**: 190-211.
- FANTIN G. (1981) - Notizie dal Veneto: 1980. *Uccelli d'Italia* **6**: 216-225.
- FAVERO L. (1935) - *Ciconia ciconia ciconia* L.. *Riv. Ital. Ornit.* **5**: 56-57.
- FAVERO L. (1937) - *Ciconia ciconia alba*. *Riv. Ital. Ornit.* **7**: 296.
- FAVERO L. (1941) - Avifauna veneta. *Riv. Ital. Ornit.* **9**: 80-82.
- FAVERO L. (1943) - Considerazioni su alcune catture importanti. *Riv. Ital. Ornit.* **13**: 121-122.
- FAVERO L. (1944) - *Ciconia ciconia ciconia* L.. *Riv. Ital. Ornit.* **14**: 31.
- FAVERO L. (1951) - Brevi note dal Veneto. *Riv. It. Orn.* **21**: 79-80.
- FAVERO L. (1955) - Notizie ornitologiche. *Riv. Ital. Ornit.* **25**: 77-78.
- FAVERO L. (1956) - Notizie ornitologiche anno 1955. *Riv. Ital. Ornit.* **26**: 189-191.
- GORFER A. (1966) - Passo di Cicogne bianche nella Valle dell'Adige. *Natura Alpina*, **1**: 3-7.
- MOLTONI E. (1939) - Catture di uccelli inanellati. *Riv. Ital. Ornit.* **9**: 202-205.
- MOLTONI E. (1966) - Alcune notizie di uccelli inanellati all'estero e ripresi in Italia e in Libia. *Riv. Ital. Ornit.* **36**: 109-314.
- MOLTONI S. (1973) - Elenco di alcune centinaia di Uccelli inanellati allo estero e ripresi in Italia e in Libia. *Suppl. Riv. Ital. Ornit.* **43**: 1-182.
- MOLTONI E. (1976) - Nuovi dati sugli uccelli inanellati all'estero e ripresi in Italia e in Libia. *Suppl. Riv. Ital. Ornit.* **46**: 1-71.
- MOSTINI L. (1982) - Cicogne bianche *Ciconia ciconia* nella pianura Nova - rese: avvistamenti 1980-1981-1982. *Uccelli d'Italia* **7**: 248-249.
- MURARO G. e ZANICHELLI F. (1986) - Un tetto una ruota e... Bentornata Cicogna - *Uccelli* **21** (1): 49.

- NIEDERFRINIGER O. (1973) - Über die Vogelwelt des Vinschgauses, Südtirol. *Monticola*, **35**: 53-76.
- NINNI A.P. (1887) - La Cicogna nera nel Veneto. Estratto dal *Boll. del Naturalista*, **7**, 4 pp.
- NINNI E. (1900) - Note ornitologiche (Grallae et Palmipedes) dalla Provincia di Venezia. *Atti Soc. Ital. Sc. Nat.*, **39**: 155-170.
- NINNI E. (1934) - La cattura di una Ciconia alba in Provincia di Treviso. *Riv. Ital. Orn.* **4**: 168-169.
- PELLIZZON R. (1983) - Non c'è tregua per i migratori. *Uccelli* **18** (1): 14-15.
- RALLO G. (1975) - Cattura di uccelli rari o poco frequenti nella Provincia di Venezia. *Boll. Mus. Civ. St. Nat. Venezia*, **27**: 15-19.
- RALLO G. (1979) - Le Casse di Colmata della Laguna, media a sud di Venezia. VI. Importanti avvistamenti ornitologici. *Riv. Ital. Ornit.*, **49**: 230-232.
- RALLO G., PALMA R. (1981) - Fauna di città: i vertebrati di Venezia. *Suppl. Lavori Soc. Ven. Sc. Nat.*, **5**: 34-49.
- SEMENZATO M., ARE G. (1982) - Sull'avifauna della città di Mestre e della sua conterminazione sub-urbana. *Lavori Soc. Ven. Sc. Nat.*, **7**: 91-98.
- TOSCHI A. (1960) - La nidificazione in Italia della Cicogna bianca, del Mignattaio e del Gabbiano comune. *Ricerche di Zool. Applic. alla Caccia* **32**, pp. 1-18.

Foto 1: Esemplare (41) in volo su Campo S. Maurizio in Venezia, in seguito posatosi sul campanile (foto di Ettore Lagomarsino di proprietà G. Rallo, già pubblicata a pag. 35 del Suppl. al Vol. 1981 e qui riprodotta per cortese autorizzazione della Soc. Ven. Sc. Nat.). ⇨ ⇨

Foto 2: Esemplare (61) che ha sostato per cinque giorni in un'area rurale della terraferma veneziana (foto di Stefano Borella). ⇨ ⇨

Foto 3: Esemplari (65) posati su di un dormitorio utilizzato per cinque giorni consecutivi, nella Laguna Nord. di Venezia (foto di Sandra Martini). ⇨ ⇨

Foto 1



Foto 2



Foto 3

