

MASSIMO SEMENZATO\*,  
ALESSANDRO SARTORI\*\*,  
GIOVANNI TIMOSS\*\*\*

# La collezione ornitologica Americo Giol nel Museo di Storia Naturale “Brandolini-Rota-Giol” di Oderzo

Key words: *Bird collection, Catalogue, Natural History Museum Brandolini-Rota-Giol*

## Riassunto

La collezione appartenuta ad Americo Giol (1904-1962) venne donata nel 1989 al Museo Brandolini-Rota di Oderzo; composta da 900 esemplari fornisce molti dati utili alla conoscenza dell'avifauna del Veneto e di quella italiana in un periodo compreso tra gli anni Trenta e Sessanta del Novecento; inoltre, offre un contributo alla comprensione delle indagini ornitologiche dell'epoca, anche per i rapporti intercorsi tra A. Giol ed Edgardo Moltoni. Significativa la presenza in collezione di esemplari appartenenti a specie accidentali per il Palearctico, l'Italia e il Veneto: *Anser erythropus*, *Somateria spectabilis*, *Oxyura leucocephala*, *Bulweria fallax*, *Oceanites oceanicus*, *Oceanodroma leucorhoa*, *Aquila pomarina*, *Aquila heliaca*, *Cursorius cursor*, *Larus hyperboreus*, *Anthus rubescens*, *Oenanthe deserti*, *Ficedula mugimaki*.

## Abstract

### *The Ornithological Collection of Americo Giol in the Museo di Storia Naturale “Brandolini-Rota” di Oderzo, Treviso*

A collection of marked importance consisting of 900 specimens was gathered by Americo Giol (1904-1962) and donated to the Brandolini-Rota Museum of Oderzo in 1989. This collection constitutes a considerable contribution to the study of avifauna present in the Veneto region and in Italy over a span of thirty years, between the 1930s and 1960s. The collection is also important for understanding the nature of ornithological studies of that period, owing to the relationship between A. Giol and Edgardo Moltoni. The presence of species which are accidental in the Palearctic in Italy or in the Veneto region is noteworthy: *Anser erythropus*, *Somateria spectabilis*, *Oxyura leucocephala*, *Bulweria fallax*, *Oceanites oceanicus*, *Oceanodroma leucorhoa*, *Aquila pomarina*, *Aquila heliaca*, *Cursorius cursor*, *Larus hyperboreus*, *Anthus rubescens*, *Oenanthe deserti*, *Ficedula mugimaki*.

## Introduzione

Il collegio Brandolini di Oderzo fu fondato nel 1889 e l'annesso Museo di Storia Naturale nacque come allestimento didattico nel 1938 (BOZZO, 2005) ad uso del locale liceo scientifico; è composto da tre sale dedicate a geologia, paleontologia e zoologia; in quest'ultima è collocata anche la collezione naturalistica appartenuta ad Augusto Stenico (1874-1958) (ASPES, 1999)<sup>1</sup>. Il museo fu curato dalla fondazione da don Vincenzo Nardini e poi, sino ai primi anni 2000, da don Giuseppe Parpagiola. Nel 1989 la collezione ornitologica appartenuta ad Americo Giol (San Polo di Piave 1904 – 1962) fu donata al museo dalla moglie Vittoria. L'interesse della raccolta è notevole poiché documenta la presenza di alcune entità accidentali per il Palearctico e l'Italia e la fenologia di specie

\*Via del Gazzato 3, 30174 Venezia-Mestre semenmass@virgilio.it

\*\*Piazzale Parmesan 12, 30175 Venezia-Marghera ale. sartoribraido@gmail.com

\*\*\*Museo di Storia Naturale Brandolini, Via S. Brandolini 6, 31046 Oderzo (Treviso) fimossi.giovanni@libero.it

<sup>1</sup> La gran parte dei cartellini con i dati di raccolta degli esemplari naturalizzati, appartenenti a questa collezione di provenienza trentina, è malauguratamente smarrita; tra questi quello relativo ad 1 juv. di Gipeto *Gypaetus barbatus* Linnaeus, 1754, di cui mancano sia la data sia la località di rinvenimento.

occasionali o localmente poco comuni in Italia e nel Veneto; il rinvenimento di entità appartenenti a queste categorie fenologiche e la cattura di individui affetti da anomalie del piumaggio furono dallo stesso A. Giol segnalate con note brevi ed articoli nella Rivista Italiana di Ornitologia (GIOL 1957a; 1957b; 1958a; 1958b; 1958c; 1959a; 1959b; 1960a; 1960b; 1960c; 1961a; 1961b). Gli esemplari vennero raccolti, prevalentemente tra gli anni Trenta e i Sessanta del secolo scorso, da A. Giol stesso o ottenuti tramite acquisti da altri appassionati ornitologi, commercianti di selvaggina e referenti locali. L'interesse non solo locale della collezione è testimoniato dai rapporti intercorsi tra la famiglia Giol e il Museo di Storia Naturale di Milano, il British Museum of Natural History di Londra e il National Museum of Natural History – Smithsonian Institution di Washington.

### *Materiali e metodi*

Gli esemplari, tutti naturalizzati, presenti al 30 settembre 2014 sono stati riesaminati alla luce delle trascrizioni del catalogo manoscritto allegato alla collezione, che li registra numerandoli da 1 a 900; 4 esemplari non numerati, ma forniti di cartellino con riportati i dati di raccolta e documentati in GIOL (1960a; 1960b; 1961a; 1961b) non compaiono nel catalogo manoscritto, compilato da Giobatta Breda, forse perché acquisiti durante le sofferte circostanze che accompagnarono la lunga malattia che condusse Americo Giol alla morte (cfr. FAVERO, 1962). Nel nostro elenco sistematico i pochi esemplari rideterminati sono segnalati con brevi commenti; la precedente determinazione, per ora conservata nel cartellino originale, corrisponde a quella registrata nel catalogo. L'ordine tassonomico e la nomenclatura binomia è stata adeguata alle indicazioni delle liste CISO-COI (FRACASSO *et al.*, 2009; BACETTI *et al.*, 2014); la designazione delle località di raccolta, dove necessario, è stata aggiornata (cfr. AA.VV., 1977; ANONIMO, 2008). La ricognizione dei principali periodici ornitologici (Rivista Italiana di Ornitologia, Avocetta, Uccelli d'Italia) ha permesso di reperire molte informazioni riguardanti gli esemplari della collezione; pure la consultazione delle maggiori compilazioni ornitologiche regionali e nazionali, redatte tra Ottocento e primo Novecento, ha consentito confronti tra le conoscenze attuali e quelle trascorse che, quando rilevanti, sono state commentate. Nella collezione sono presenti 897 dei 900 esemplari catalogati<sup>2</sup>, più 4 dotati di dati di cattura ma aggiunti successivamente e non riportati nel catalogo manoscritto; tutti gli esemplari, in ottimo stato di conservazione, appartenengono a 345 taxa, che costituiscono circa il 70% di quelli componenti l'avifauna italiana.

<sup>2</sup> Tre esemplari mancanti, un pollo sultano *Porphyrio porphyrio*, un rampichino comune *Certhia brachydactyla* e una cincia dal ciuffo *Lophophanes cristatus*, sono segnalati nei commenti. Sono inoltre presenti 24 esemplari, la maggior parte senza data e località di cattura, preparati meno accuratamente e non registrati nel catalogo manoscritto: 1 folaga *Fulica atra*, 1 corriere grosso *Charadrius hiaticula*, 1 combattente *Philomachus pugnax*, 1 beccaccino *Gallinago gallinago*, 1 beccaccia *Scolopax rusticola*, 1 picchio rosso maggiore *Dendrocopos major*, 1 cappellaccia *Galerida cristata*, 1 canapino maggiore *Hippolais icterina*, determinato come canapino, 1 codirosso spazzacamino *Phoenicurus ochruros*, 1 passera scopaiola *Prunella modularis*, 1 spioncello *Anthus spinoletta*, 3 fringuelli *Fringilla coelebs* (di cui 1 f Cansiglio (TV), 26.10.1959 e 1 f San Polo di Piave (TV), 10.11.1960), 1 verdone *Carduelis chloris* (San Polo di Piave (TV), 11.11.1960), 1 organetto *Carduelis flammea*, 1 frosone *Coccothraustes coccothraustes*, un fringillide, apparentemente un ibrido, etichettato come "Lucherino", 1 zigolo delle nevi *Plectrophenax nivalis*, 1 zigolo della Lapponia *Calcarius lapponicus*, 1 zigolo golarossa *Emberiza leucocephalos*, 2 zigoli minori *Emberiza pusilla*, 1 strillozzo *Emberiza calandra*. Sono tutti dotati di un cartellino difforme da quello apposto al resto degli esemplari della collezione: è di color giallo paglierino, quasi sempre privo dei dati di raccolta, contraddistinto da caratteri meno nitidi e da una diversa trascrizione del binomio linneano: è molto probabile che questo tipo di cartellino contrassegni i pochi esemplari aggiunti alla raccolta durante la malattia, o dopo la scomparsa, di Americo Giol.

Abbreviazioni usate:

es.: esemplare/i  
ind.: individuo/i  
f: femmina  
m: maschio  
ad.: adulto  
juv.: giovane  
s. d.: senza data  
s. l.: senza luogo

*Elenco sistematico*

Anseriformes

Anatidae

**Cigno reale** *Cygnus olor* (J.F. Gmelin, 1789)

763 m San Polo di Piave (TV), 10.09.1937; 764 m Portogruaro (VE), 15.10.1956.

La cattura di entrambi gli esemplari risale ad un'epoca nella quale non erano ancora avvenuti rilasci nelle acque interne e costiere del Veneto: le prime conosciute risalgono alla metà degli anni Settanta del XX secolo (cfr. BON *et al.*, 2009); la località di cattura dell'es. 763 potrebbe invece suggerire un'origine domestica piuttosto che selvatica.

**Cigno selvatico** *Cygnus cygnus* (Linnaeus, 1758)

765 m Marina di Pisa (PI), 15.12.1930

**Oca granaiola** *Anser fabalis* (Latham, 1758)

767 m Cavarzere (VE), 05.02.1937

**Oca zamperosee** *Anser brachyrhynchus* Baillon, 1833

770 m Stollchamm<sup>3</sup> 26.11.1937

**Oca lombardella** *Anser albifrons* (Scopoli, 1769)

768 m Valle Dogà, Venezia, 03.01.1938

**Oca lombardella minore** *Anser erythropus* (Linnaeus, 1758)

766 f Valle Dogà, Venezia, 07.10.1939.

Prima segnalazione certa per il Veneto; es. discusso in SEMENZATO & SCARTON (1998). L'ind. s. d. dalle "Valli padovane", conservato nel Regio Museo di Padova, poi a Firenze, era ritenuto dubbio da ARRIGONI DEGLI ODDI (1929). Sono note tre più recenti osservazioni: 1 ad. tra Sindacale e Valle Zignago, Caorle (VE), tra il 31.12.2010 e il 05.01.2011 (M. Azzolini, R. Lerco, E. Stival, L. Panzarin in SIGHELE *et al.*, 2012); 1 juv. Bonifica Loncon (VE), 20.01.2011 (M. Azzolini in SIGHELE *et al.*, 2012); 1 ind. Valle Zignago (VE), 17.02.2012 (M. Azzolini, L. Panzarin in SIGHELE *et al.*, 2013).

**Oca selvatica** *Anser anser* (Linnaeus, 1758)

771 m paludi di Portogruaro<sup>4</sup> (VE), 01.03.1942

Citato da FAVERO (1943a), che dà una descrizione dell'esemplare corrispondente al fenotipo di *A. a. rubirostris* Shinhoe, 1871.

**Oca colorosso** *Branta ruficollis* (Pallas, 1769)

769 m Lago di Lesina (FG), 20.01.1905

<sup>3</sup> Non è stato possibile individuare la localizzazione geografica del toponimo.

<sup>4</sup> La dizione "paludi di Portogruaro" ricorre come località di cattura di alcuni esemplari presenti nella collezione; non designa un luogo definito ma un comprensorio, nel quale ricadono i territori collocati tra Portogruaro e le valli della Laguna di Caorle in corso di bonifica tra gli anni '40 e '60 del Novecento (cfr. FAVERO, 1943b).

Citato da FAVERO (1957a) che dà notizia di un altro esemplare, del 1930, forse proveniente da Lesina, conservato nella collezione Savardo di Vicenza.

**Volpoca** *Tadorna tadorna* (Linnaeus, 1758)

**682** f Paternò (CT), 25.10.1931; **683** m Paternò (CT), 3.02.1932; **684** f Portogruaro (VE), 14.07.1953; **685** m Marano Lagunare (UD), 13.03.1952

Anatra nota come nidificante nel secolo scorso a partire dagli anni '60 in Emilia-Romagna e dagli anni '80 in Veneto (cfr. BRICHETTI & FRACASSO, 2003).

**Fischione** *Anas penelope* Linnaeus, 1758

**719** f Valle Dogà, Venezia, 10.11.1937; **720** m Portogruaro (VE), 27.12.1951; **721** f Caorle (VE) 27.11.1955

**Canapiglia** *Anas strepera* Linnaeus, 1758

**723** m Portogruaro (VE), 03.01.1938; **724** m Valle Dogà, Venezia, 30.03.1939; **843** f Caorle (VE), 02.04.1958

**Alzavola** *Anas crecca* Linnaeus, 1758

**734** m Valle Dogà, Venezia, 12.02.1939; **735** f Caorle (VE), 29.06.1955

**Germano reale** *Anas platyrhynchos* Linnaeus, 1758

**689** m Valle Dogà, Venezia, 12.01.1937; **690** f Valle Dogà, Venezia, 12.01.1937; **851** f Valle Franchetti, Caorle (VE), 19.01.1957

Es. 851 in cartellino indicato come "f che riveste l'abito del m".

**Codone** *Anas acuta* Linnaeus, 1758

**691** m Valle Dogà, Venezia, 28.02.1939; **692** m Val Nova, Caorle (VE), 13.03.1955; **693** m Caorle (VE), 02.12.1956; **694** f Valle Dogà (VE), 28.02.1939; **722** f Caorle (VE), 22.02.1955; **850** m Caorle (VE), 23.02.1958

**Marzaiola** *Anas querquedula* Linnaeus, 1758

**736** m Valle Dogà, Venezia, 07.03.1937; **737** f San Polo di Piave (TV), 15.03.1957; **861** f Caorle (VE), 20.08.1957; **862** m Caorle (VE), 21.08.1955, **863** m Caorle (VE), 15.05.1958

**Mestolone** *Anas clypeata* Linnaeus, 1758

**725** m Valle Dogà (VE), 22.03.1937; **726** f Valle Dogà (VE), 18.02.1939; **840** m Caorle (VE), 15.04.1957; **841** m Caorle (VE), 14.10.1956; **842** f Caorle (VE), 21.03.1958

**Fistione turco** *Netta rufina* (Pallas, 1773)

**716** f Lago Maggiore, 12.04.1939; **717** m Murano (VE), 08.03.1933; **718** m Valle Dogà, Venezia, 10.11.1937

Es. 717 citato in FAVERO (1935b). Svernante regolare ma molto scarso nell'area costiera del Veneto orientale, dove si è recentemente insediato come nidificante (BON *et al.*, 2014).

**Moriglione** *Aythya ferina* (Linnaeus, 1758)

**712** f Caorle (VE), 20.03.1955; **713** m Caorle (VE), 21.02.1955; **729** m Valle Dogà, Venezia, 10.10.1937; **730** f Valle Dogà, Venezia, 28.12.1938; **852** m Caorle (VE), 15.03.1958; **853** f Caorle (VE), 14.11.1955

Gli es. 852 e 853 in cartellino portano l'annotazione "abito rugginoso": una definizione in uso nell'ambiente venatorio delle valli di Caorle, indicante gli individui che esibiscono un piumaggio apparentemente sporco di ruggine (D. Marin com. pers.).

**Moretta tabaccata** *Aythya nyroca* (Güldenstädt, 1770)

**738** f Caorle (VE), 12.11.1956; **739** f Venezia, 20.12.1953; **740** m San Polo di Piave (TV), 11.03.1939

Svernante irregolare dal 2004 insediatosi anche come nidificante nell'area costiera del Veneto orientale (BON *et al.*, 2014).

**Moriglione x Moretta tabaccata**

741 m Valle Perera, Caorle (VE), 16.01.1950; 742 m Valle Franchetti, Caorle (VE), 08.10.1950

Es. 741 citato in FAVERO (1950b), rinvenuto presso il commerciante di selvaggina Bergamo. Es. 742 citato in FAVERO (1952), rinvenuto nel mercato di Portogruaro; le gonadi di questo individuo furono inviate in studio a A. M. Taibel, direttore della Stazione di Pollicoltura Sperimentale di Rovigo FAVERO (l. c.).

**Moretta** *Aythya fuligula* (Linnaeus, 1758)

707 m Sile presso Treviso 07.11.1937; 708 f Sile presso Treviso 07.11.1937; 711 f Caorle (VE), 20.03.1955

**Moretta grigia** *Aythya marila* (Linnaeus, 1761)

714 m Laguna di Caorle (VE), 15.12.1940; 715 f Laguna di Caorle (VE), 15.12.1940

Es. 714 citato in FAVERO (1942a). Nel Veneziano specie migratrice irregolare e svernante occasionale (BON *et al.*, 2014).

**Edredone** *Somateria mollissima* (Linnaeus, 1758)

687 m paludi di Grado (GO), 27.02.1954; 688 m Lago Maggiore, 06.12.1937; 827 f Grado (GO), 20.01.1957

Es. 687 parte di un gruppo di 3, di cui 2 mm catturati (FAVERO, 1954b e cfr. MOLTONI, 1957b); es. 827 citato in MOLTONI (1957b). In Friuli-Venezia Giulia specie svernante regolare e nidificante irregolare con la prima riproduzione accertata per l'Italia alla foce dell'Isonzo (GO) nel 1999 (cfr. PARODI, 2006). Svernante irregolare e molto raro in Piemonte (cfr. Cucco *et al.*, 2003).

**Re degli edredoni** *Somateria spectabilis* (Linnaeus, 1758)

686 m Laguna di Venezia, 23.10.1920

Es. discusso in SEMENZATO & SCARTON (1998). NINNI (1924) indicava con la stessa data e località di cattura Treporti (VE), 1 f di *S. spectabilis* conservata nella coll. Bisacco-Palazzi (cfr. ARRIGONI DEGLI ODDI, 1929); BISACCO PALAZZI (1935) però cita l'esemplare come appartenente a *S. mollissima* (Linnaeus, 1758), determinazione confermata da Arrigoni degli Oddi in MARTORELLI (1931); questo stesso esemplare attualmente manca dalla coll. Bisacco Palazzi (BON *et al.*, 1993). Altre segnalazioni note per la Laguna di Venezia: 1 es. "Pignatelle", 21.08.1888 (NINNI, 1888, cfr. ARRIGONI DEGLI ODDI, 1898); 1 f Salina di S. Felice, Venezia, 20.09.1904 (NINNI, 1904); 15 indd. osservati in Valle Zappa, Campagna Lupia (VE), 05-18.01.1918 (ARRIGONI DEGLI ODDI, 1929). Specie accidentale nota con otto segnalazioni italiane (BRICHETTI & FRACASSO, 2003).

**Moretta codona** *Clangula hyemalis* (Linnaeus, 1758)

705 m Canalon di Caorle (VE), 29.11.1955; 706 f Canalon di Caorle (VE), 29.11.1955; 709 f Valle Zignago, Concordia Sagittaria-Caorle (VE), 27.10.1946; 710 m Caorle paludi di Portogruaro (VE)<sup>5</sup>, 28.12.1948

Ess. 705 e 706 presi da un gruppo di 4-ess. (FAVERO, 1956); es. 709 citato in FAVERO (1948a); es. 710 citato in FAVERO (1949b). Migratrice e svernante irregolare nel Veneziano (BON *et al.*, 2014).

**Orchetto marino** *Melanitta nigra* (Linnaeus, 1758)

699 m Laghi di Monticolo, Appiano (BZ)<sup>6</sup>, 17.02.1955; 700 f Valle Zignago, Concordia Sagittaria-Caorle (VE), 25.11.1950

Es. 699 citato in FAVERO (1956). Specie assente come svernante nei bacini lacustri dell'Alto Adige (cfr. BACCETTI *et al.*, 2002) e accidentale in Trentino, dov'è nota per una sola segnalazione recente (PEDRINI *et al.*, 2005). Svernante molto scarso ed irregolare nelle acque costiere del Veneziano (BON *et al.*, 2014).

<sup>5</sup> Cfr. nota 1

<sup>6</sup> In cartellino e catalogo indicato come "Laghetto di Appiano (Bolzano)"; i Laghi di Monticolo comprendono il Lago Grande e il Lago Piccolo nel territorio del comune di Appiano (BZ).

**Orco marino** *Melanitta fusca* (Linnaeus, 1758)

**695** m Brussa Canalon di Caorle (VE), 24.01.1940; **696** m paludi di Portogruaro (VE)<sup>7</sup>, 25.02.1940; **697** f Portogruaro (VE), 15.11.1950; **698** f Pisa, 18.11.1929

Ess. 0695 e 0696 citati in FAVERO (1941). Nel Veneziano è uno svernante scarso ed irregolare (BON *et al.*, 2014).

**Quattrocchi** *Bucephala clangula* Linnaeus, 1758

**701** f Caorle (VE), 22.11.1953; **702** f Valle Dogà, Venezia, 10.12.1936; **703** m Caorle (VE), 01.01.1957; **704** m Valle Dogà, Venezia, 20.12.1956; **855** m Caorle (VE), 15.03.1959

**Pesciaiola** *Mergellus albellus* Linnaeus, 1758

**731** m Valle Dogà, Venezia, 26.01.1940; **732** m Valle Dogà, Venezia, 27.01.1940; **733** f Venezia, 28.12.1937

Specie occasionale nelle acque interne e costiere del Veneziano (BON *et al.*, 2014).

**Smergo minore** *Mergus serrator* Linnaeus, 1758

**681** m Lago Maggiore, 02.11.1936, **747** f Portogruaro (VE), 10.11.1952

**Smergo maggiore** *Mergus merganser* Linnaeus, 1758

**679** m Portogruaro (VE), 31.12.1940; **680** f Portogruaro (VE), 14.01.1940

Es. 679 citato in FAVERO (1941), cfr. MOLTONI (1962). Specie in Veneto di recente insediamento come nidificante (ZENATELLO *et al.*, 1997); svernante occasionale nel Veneziano (BON *et al.*, 2014).

**Gobbo rugginoso** *Oxyura leucocephala* (Scopoli, 1769)

**727** m Canalon di Caorle (VE), 29.11.1953; **728** m Valle Zignago, Concordia Sagittaria-Caorle (VE), 20.12.1948

Es. 727 citato in FAVERO (1954b); es. 728 citato in FAVERO (1949b). Le poche altre segnalazioni note per l'area costiera veneta sono raccolte in BON *et al.* (1993). Più recenti osservazioni riguardano 1 f Vallesina di Albarella (RO) 13, 14, 30.01.2003 e 14.02.2003 (F. Cassari, L. Gramolelli in BON *et al.*, 2005); 1 m Valle Ca' Pisani - Po di Maistra (RO), 02.03.2003 (P. Ronconi in BON *et al.*, 2005).

Galliformes

Tetraonidae

**Francolino di monte** *Bonasa bonasia* Stephens, 1819

**198** m Trento, 22.10.1955; **199** f S. Vito di Cadore (BL), 09.11.1950; **200** f Alpi trentine, 08.11.1930

**Pernice bianca** *Lagopus muta* (Montin, 1776)

**165** f Trento, 18.01.1955; **166** f Livinallongo (BL), 06.10.1955; **167** f Livinallongo (BL), 01.10.1955; **168** f Livinallongo (BL), 08.06.1955; **874** f Bolzano, 24.09.1957

**Fagiano di monte** *Tetrao tetrix* Linnaeus, 1758

**204** m Asiago (VI), 10.04.1955; **205** m Alpi trentine, 15.10.1931; **206** f Cortina d'Ampezzo (BL), 18.10.1950

**Gallo cedrone** *Tetrao urogallus* Linnaeus, 1758

**201** m Cortina d'Ampezzo (BL), 08.10.1940; **202** m Alleghe (BL), 23.09.1954; **203** f Cortina d'Ampezzo (BL), 25.10.1935

Phasianidae

**Colino della Virginia** *Colinus virginianus* (Linnaeus, 1758)

<sup>7</sup> Cfr. nota 1.

**824 f** Grave di Candelù, Maserada (TV), 04.11.1958; **825 f** Grave di Candelù, Maserada (TV), 04.11.1958

La data di cattura corrisponde all'epoca dei primi tentativi d'introduzione in Veneto (cfr. BON *et al.* 2008).

**Coturnice** *Alectoris graeca* (Meisner, 1804)

**169 f** Brestovizza in Valle, Komen, Slovenia 10.11. 1937; **171 f** Livinallongo (BL), 13.11.1954; **170 f** Paternò (CT), 07.10.1951; **873 m** Pasubio (VI), 13.10.1957

Es. 169, 171 e 873 appartengono alla forma *A. g. saxatilis* (Bechstein, 1805), l'es. 170 a *A. g. whitakeri* Schiebel, 1934.

**Pernice rossa** *Alectoris rufa* (Linnaeus, 1758)

**162 f** Genova, 14.01.1957; **163 m** Genova, 26.10.1956; **164 m** Genova 15.11.1948

**Pernice sarda** *Alectoris barbara* (Bonnaterre, 1790)

**172 m** Lanusei (OG), 12.11.1954; **173 m** Lanusei (OG), 12.11.1954; **174 m** Lanusei (OG), 16.12.1935; **869 f** Cagliari, 18.01.1959

Es. 869 teratologico con mandibola superiore rivolta verso l'alto.

**Starna** *Perdix perdix* (Linnaeus, 1758)

**175 m** Brestovizza in Valle, Komen, Slovenia, 14.10.1937; **176 m** Portogruaro (VE), 10.12.1953; **177 f** Portogruaro (VE), 07.02.1954

**Quaglia** *Coturnix coturnix* (Linnaeus, 1758)

**178 m** Portogruaro (VE), 23.08.1955; **179 m** San Polo di Piave (TV), 24.08.1938; **180 f** San Polo di Piave (TV), 24.08.1937

**Fagiano comune** *Phasianus colchicus* Linnaeus, 1758

**207 m** Torviscosa (UD), 05.12.1951; **208 m** Brestovizza in Valle, Komen, Slovenia, 05.11.1937; **209 f** Cervignano (UD), 19.11.1956; f Cervignano (UD), 14.11.1956

Gaviiformes

Gaviidae

**Strolaga minore** *Gavia stellata* (Pontoppidan, 1763)

**778 m** Valle Dogà, Venezia, 10.01.1938

**Strolaga mezzana** *Gavia arctica* (Linnaeus, 1758)

**775 m** Caorle (VE), 06.06.1939; **776 m** Caorle (VE), 26.11.1956; **777 m** Portogruaro (VE), 21.01.1940; **780 f** Valle Dogà, Venezia, 15.11.1938

**Strolaga maggiore** *Gavia immer* (Brünnich, 1764)

**779 m** Umago, Istria, Croazia, 01.11.1938

Procellariiformes

Procellariidae

**Berta di Jouanin** *Bulweria fallax* Jouanin, 1955

**586 m** Stabiuzzo, Cimadolmo (TV), 26.07.1953

L'ind. preso da un gruppo di 3 es. è documentato da GIOL (1957b); cattura citata in COVA (1969) e in TOSCHI (1969). Entità a distribuzione afrotropicale ristretta (Oceano Indiano occidentale) (cfr. BRICHETTI & FRACASSO, 2013), nota nel Mediterraneo per quest'unica segnalazione, messa in dubbio da CRAMP & SIMMONS (1977). BACCETTI *et al.* (2014) includono questa cattura nell'elenco riguardante specie su cui sussistono dubbi sull'affidabilità del ritrovamento. L'esemplare in questione fu esaminato e confrontato con altri da S. L. Olson, del National Museum of Natural History – Smithsonian Institution di Washington, che ritenne invece la segnalazione attendibile, suggerendo

la possibilità che questo individuo potesse appartenere ad una popolazione diversa, e sconosciuta, da quella dell'Oceano Indiano (OLSON, 1985)<sup>8</sup>; il rinvenimento di questa entità in zone interne, lontane dal mare, è segnalato anche da ZONFRILLO (1988).

**Berta maggiore** *Calonectris diomedea* (Scopoli, 1769)

521 m Isola la Maddalena, Olbia-Tempio (OT), 05.05.1937; 522 m Viareggio (LU), 02.03.1952; 569 m Viareggio (LU), 14.03.1952

**Berta minore** *Puffinus yelkouan* (Acerbi, 1827)

567 f Genova, 20.03.1953; 568 f La Maddalena, Olbia-Tempio (OT), 01.04.1937

Hydrobatidae

**Uccello delle tempeste di Wilson** *Oceanites oceanicus* (Kuhl, 1820)

585 f La Maddalena, Olbia-Tempio (OT), 26.07.1956

Segnalato da FAVERO (1957a); seconda cattura convalidata per l'Italia di questa specie a distribuzione antartica (BRICHETTI & FRACASSO, 2003).

**Uccello delle tempeste** *Hydrobates pelagicus* Linnaeus, 1758

582 f La Maddalena, Olbia-Tempio (OT), 10.10.1956; 583 m Asinara, Porto Torres (SS), 10.05.1939

Es. 582 citato in FAVERO (1957a); es. 583 citato in FAVERO (1940).

**Uccello delle tempeste codaforcuta** *Oceanodroma leucorhoa* (Vieillot, 1817)

584 m Spiaggia di Levante, Viareggio (LU), 13.11.1951

Es. segnalato da CATERINI (1952), discusso in MOLTONI (1952a); cattura compresa tra le altre tredici italiane convalidate (BRICHETTI & FRACASSO, 2003).

Pelecaniformes

Sulidae

**Sula** *Morus bassanus* Linnaeus 1758

506 m mare presso Genova, 07.03.1954; 507 m Laguna di Venezia, 26.03.1938

Es. 506 preparato da C. Confalonieri, segnalato da FAVERO (1954b); es. 507 discusso in SEMENZATO & SCARTON (1998).

Pelecanidae

**Pellicano** *Pelecanus onocrotalus* Linnaeus, 1758

854 m juv. Isole Eolie s.d.

Es. forse riferibile al 1957 anno in cui furono osservati e catturati più ind. in alcune località messinesi (ORLANDO, 1958 cfr. FAVERO, 1959). MOLTONI & FRUGIS (1967) riferiscono di un es. da Malfa nell'isola di Salina (ME), dei primi di dicembre 1957 conservato nelle collezioni Favero.

Phalacrocoracidae

**Cormorano** *Phalacrocorax carbo* (Linnaeus, 1758)

772 m Cimadolmo (TV), 10.03.1951; 773 f Lago Maggiore, 30.03.1936; 774 m Venezia, 02.04.1938

Le date di cattura degli esemplari segnalano la presenza di cormorano in località lagunari e lacustri in epoche nelle quali era poco comune (cfr. NINNI, 1938) o occasionale (cfr. CUCCO *et al.*, 1996).

<sup>8</sup> Quest'autore rilevava infatti una diversa colorazione del piede dell'es. della collezione Giol rispetto agli altri 2 esemplari da lui esaminati (OLSON, 1985). Carlo Violani, del Dipartimento di Biologia Animale dell'Università di Pavia, fece da tramite tra Vittoria Giol e Storrs Olson, com'è deducibile dalla corrispondenza conservata presso il Museo Brandolini-Rota.

**Marangone dal ciuffo** *Phalacrocorax aristotelis* (Linnaeus, 1761)

743 m Caorle (VE), 24.11.1956; 746 m Cagliari, 22.04.1934; 848 m Olbia (OT), 01.02.1959

Es. 743 determinato come “Marangone” generico, senza attribuzione specifica; la data di cattura documenta la specie nell’area costiera veneta quando era da ritenersi accidentale; solo dal 2003 è uno svernante regolare (BON & SCARTON, 2012).

**Marangone minore** *Phalacrocorax pygmeus* (Pallas, 1773)

744 f paludi di Portogruaro (VE)<sup>9</sup>, 18.09.1938 (cfr. FAVERO, 1939); 745 f Canale fra Valle Figheri e Valle Zappa<sup>10</sup>, Campagna Lupia (VE), 02.09.1934 (cfr. FAVERO, 1935); 748 f juv. Lago Maggiore, 09.10.1956

Es. 744 risulta catturato sul fiume Lemene (FAVERO, 1939); es. 745 abbattuto assieme ad 1 m da un gruppo di 5 ess. (FAVERO, 1935 d). Specie insediatasi dal 1998 come nidificante nelle zone umide costiere ed interne del Veneziano (cfr. BON *et al.* 2004). L’es. 748, determinato originariamente come “Marangone col ciuffo *Phalacrocorax aristotelis desmarestii* (Payraudeau, 1826)”, si aggiunge ai tre segnalati per il Piemonte (1856, 1866, 1973) (PAVIA & BOANO, 2008).

Ciconiiformes

Ardeidae

**Tarabuso** *Botaurus stellaris* (Linnaeus, 1758)

678 m Portogruaro (VE), 10.09.1936

**Tarabusino** *Ixobrychus minutus* (Linnaeus, 1766)

649 f Portogruaro (VE), 02.10.1936; 650 m Caorle (VE), 26.05.1936

**Nitticora** *Nycticorax nycticorax* (Linnaeus, 1758)

671 m San Polo di Piave (TV), 06.04.1939; 836 f juv. Portogruaro (VE), 21.08.1958

**Sgarza ciuffetto** *Ardeola ralloides* (Scopoli, 1769)

651 m paludi di Portogruaro (VE), 06.04.1943; 652 f paludi di Portogruaro (VE), 08.04.1943; 653 m paludi di Portogruaro (VE)<sup>11</sup>, 21.04.1943.

Ess. citati da FAVERO (1943b) come presi assieme ad altri cinque ne “l’Estuario Veneto e le immense zone di bonifica limitrofe”<sup>12</sup>.

**Airone guardabuoi** *Bubulcus ibis* (Linnaeus, 1758)

859 m Civita Castellana (VT), 02.12.1956

Ardeide di comparsa occasionale in Italia sino alla fine degli anni Settanta con circa 50 segnalazioni (cfr. MOLTONI & BRICHETTI, 1978); questa cattura documenta la presenza della specie in regioni centrali della penisola in un’epoca sinora inedita (cfr. Fraticelli in TOSO, 1981).

**Garzetta** *Egretta garzetta* (Linnaeus, 1766)

661 m San Michele al tagliamento (VE), 12.06.1953; 662 m San Polo di Piave (TV), 06.04.1939; 663 f Treporti, Cavallino Treporti (VE), 10.02.1958; 664 f Caorle (VE), 18.04.1956

<sup>9</sup> Cfr. nota 1.

<sup>10</sup> La descrizione corrisponde a quella dell’attuale Canale Cornio.

<sup>11</sup> Cfr. nota 1.

<sup>12</sup> Tra Ottocento e metà Novecento, “Estuario Veneto” fu una espressione di una certa fortuna nella letteratura naturalistica (talvolta sovrapponibile a “Lagune Venete” o a “paludi venete”), che però lasciava del tutto indeterminate le località puntuali di osservazione o di raccolta: nel migliore dei casi indicava un territorio comprendente la Laguna di Venezia e le lagune di Caorle e Bibione, nel peggiore un’area costiera estesa tra il Po ed il Tagliamento (cfr. NINNI 1938 ma anche le opere di ARRIGONI DEGLI ODDI 1904 e 1929, in più punti).

**Airone bianco maggiore** *Casmerodius albus* (Linnaeus, 1758)

656 f San Michele al Tagliamento (VE), 17.12.1950

Ardeide che ha progressivamente incrementato il numero di individui svernanti dagli anni '90 del secolo scorso, con sporadiche nidificazioni registrate a partire dal 1993 (cfr. BON *et al.*, 2004).

**Airone cenerino** *Ardea cinerea* Linnaeus, 1758

672 m Valle Dogà, Venezia, 07.03.1938; 673 f Cimadolmo (TV), 21.04.1957

**Airone rosso** *Ardea purpurea* Linnaeus, 1766

674 m Valle Dogà, Venezia, 17.10.1937; 675 m San Polo di Piave (TV), 10.04.1937

Ciconiidae

**Cicogna nera** *Ciconia nigra* (Linnaeus, 1758)

667 m paludi di Portogruaro (VE)<sup>13</sup>, 03.09.1939 (cfr. FAVERO, 1940); 668 f juv. Portogruaro (VE), 13.09.1955

L'es. 667 faceva parte di un gruppo di 3, di cui due juv. abbattuti, 1 m in questione e 1 f (FAVERO, 1940).

**Cicogna bianca** *Ciconia ciconia* (Linnaeus, 1758)

669 m Zianigo (VE), 07.04.1933; 670 m San Michele al Tagliamento (VE), 24.04.1954.

L'es. 669 in FAVERO (1935c) risulta abbattuto a Mestre (VE); l'es. 670 raccolto morente, da un stormo di cinque, a Foci Tagliamento (VE) (FAVERO, 1955a); es. discussi in SEMENZATO (1987).

Threskiornithidae

**Mignattaio** *Plegadis falcinellus* (Linnaeus, 1766)

654 m Viareggio (LU), 20.04.1929; 655 f Venezia, 13.10.1933; 829 m Catania, 16.04.1956; 830 f Catania, 16.04.1956

**Spatola** *Platalea leucorodia* Linnaeus, 1758

660 m Catania, 18.10.1937; 849 m Catania, 13.05.1958

Phoenicopteriformes

Phoenicopteridae

**Fenicottero** *Phoenicopus roseus* Pallas, 1811

665 m Oristano, 08.12.1950; 666 m Oristano, 26.12.1956

Podicipediformes

Podicipedidae

**Tuffetto** *Tachybaptus ruficollis* (Pallas, 1764)

759 f Valle Dogà, Venezia, 10.01.1937; 760 f Mirano (VE), 14.08.1936; 761 f Caorle (VE), 03.04.1955; 762 m San Polo di Piave (TV), 02.11.1957; 893 juv. Portogruaro (VE), 01.09.1955

**Svasso maggiore** *Podiceps cristatus* (Linnaeus, 1758)

752 m Lova, Campagna Lupia (VE), 25.09.1933; 753 m Lago Maggiore, 02.08.1936; 754 f San Michele al Tagliamento (VE), 24.03.1955; 755 m Treporti, Cavallino-Treporti (VE), 22.03.1940.

<sup>13</sup> Cfr. nota 1.

**Svasso collaroso** *Podiceps grisegena* (Boddaert, 1783)  
750 m Canalon di Caorle (VE), 24.03.1955 ; 751 m Valle Dogà, Venezia, 20.08.1939  
Es. citati in FAVERO (1955b); es. 750 in MOLTONI (1956 a).

**Svasso cornuto** *Podiceps auritus* (Linnaeus, 1758)  
758 m Laguna di Venezia, 08.10.1936

**Svasso piccolo** *Podiceps nigricollis* C. L. Brehm, 1831  
756 m Venezia, 06.01.1936; 757 m Portogruaro (VE), 04.04.1930

Falconiformes

Accipitridae

**Falco pecchiaiolo** *Pernis apivorus* (Linnaeus, 1758)  
8 m Mirano (VE), 14.05.1933; 844 f San Vito al Tagliamento (PN), 19.05.1950

**Nibbio bruno** *Milvus migrans* (Boddaert, 1783)  
17 m Thiene (VI), 15.04.1932; 18 m Thiene (VI), 30.04.1932

**Nibbio reale** *Milvus milvus* (Linnaeus, 1758)  
15 m Palermo, 13.05.1956; 16 f dintorni di Roma, 12.02.1935

**Aquila di mare** *Haliaeetus albicilla* Linnaeus, 1758  
55 m Morsano al Tagliamento (PN), 16.01.1940; 56 m Laguna di Caorle (VE), 25.06.1940  
Es. 55 citato in FAVERO (1942a); l'es. 56 citato in FAVERO (1941) documenta una presenza in epoca inusuale (cfr. BRICHETTI & FRACASSO, 2003). Specie attualmente scarsa ed irregolare durante i movimenti migratori ed accidentale come svernante nell'area costiera veneziana (BON & SCARTON, 2012).

**Capovaccaio** *Neophron percnopterus* (Linnaeus, 1758)  
900 1 ad. s.l., s.d.  
Purtroppo non se ne conosce né provenienza né data di cattura.

**Grifone** *Gyps fulvus* (Hablizl, 1783)  
62 f Monte Gennargentu (NU-OG), 10.11.1929; 63 m Lanusei (OG), 15.01.1954  
I grifoni in collezione appartenevano ai nuclei della Sardegna orientale ancora esistenti sino agli anni Settanta del secolo scorso (cfr. GENERO, 1992).

**Biancone** *Circaetus gallicus* (J. F. Gmelin, 1788)  
64 m Mirano (VE), 29.03.1940  
Es. citato in FAVERO (1941).

**Falco di palude** *Circus aeruginosus* (Linnaeus, 1758)  
9 m Valle Dogà, Venezia, 08.08.1937; 10 08.01.1937; f Portogruaro (VE), 30.06.1949;  
11 m Laguna di Venezia, 04.09.1942  
L'es. 11 è parzialmente albino.

**Albanella reale** *Circus cyaneus* (Linnaeus, 1766)  
22 m Portogruaro (VE), 28.03.1953; 24 f Portogruaro (VE), 21.09.1953; 27 m Venezia, 15.01.1941; 28 f Paternò (CT) 20.09.1931; 29 f Portogruaro (VE), 18.11.1934  
Ess. 22 e 24 originariamente determinati come Albanella pallida *C. macrourus* (S. G. Gmelin, 1770); es. 29 citato in FAVERO (1935a).

**Albanella pallida** *Circus macrourus* (S. G. Gmelin, 1770)  
23 m Venezia, 18.04. 1936; 25 f Venezia 31.08.1954

**Albanella minore** *Circus pygargus* (Linnaeus, 1758)  
26 m Portogruaro (VE), 17.04.1937; 864 f Caorle (VE), 20.08.1958

**Astore** *Accipiter gentilis* (Linnaeus, 1758)

**2** f Alleghe (BL), 03.11.1935; **3** m Lanusei (OG), 20.11.1935; **4** m Monti Urzulei (OG), 26.03.1939; **5** m juv., Lanusei (OG), 10.11.1949

Es. 3 e 4 appartenenti alla forma *A. g. arrigonii* Kleinschmidt, 1901; es. 5 originariamente determinato come m di *Falco peregrinus peregrinus* Tunstall, 1711.

**Sparviere** *Accipiter nisus* (Linnaeus, 1758)

**37** f Portogruaro (VE), 07.01.1950; **38** f Chiarano (TV), 06.05.1937; **39** m San Polo di Piave (TV), 09.03.1939; **40** m Ilbono (OG) 25.10.1938; **847** f Lanusei (OG), 13.12.1954

Es. 40 e 847 appartenenti alla forma *A. n. wolterstorffi* Kleinschmidt, 1901. La data di cattura dell'es. 38 è indicativa di una possibile nidificazione in zona, inedita per l'epoca.

**Poiana** *Buteo buteo* (Linnaeus, 1758)

**12** m San Polo di Piave (TV), 10.01.1939; **14** m Nuoro 02.01.1955; **65** f Romania, Delta del Danubio, 06.05.1937

Es. 14 attribuito a *B. b. arrigonii* Picchi, 1903; es. 65 determinato come *B. b. zimmermannae* Ehmcke, 1893 (cfr. *B. b. vulpinus* Gloger, 1833).

**Poiana codabianca** *Buteo rufinus* (Cretzschmar, 1827)

**60** m Morsacco di Udine<sup>14</sup>, 30.03.1948 ; **61** f San Vito di Cadore (BL), agosto 1954<sup>15</sup>

Es. 60 citato in RIELLO (1948), MOLTONI (1955a) e MINGOZZI (1987); es. 61 citato in GIOL (1958b) e in MOLTONI (1961). In Italia rara ed irregolare sino agli anni Ottanta del Novecento (cfr. MINGOZZI, 1987), con recente incremento delle osservazioni anche in Veneto (BRICHETTI & FRACASSO, 2003).

**Poiana calzata** *Buteo lagopus* (Pontopiddan, 1763)

**13** m paludi di Venezia, 15.03.1932; **835** m Portogruaro (VE), 05.10.1950

Es. 13 citato in FAVERO (1933a). Svernante regolare nell'area costiera veneziana sino alla fine del secolo scorso, recentemente non più rilevata (BON *et al.*, 2014).

**Aquila anatraia maggiore** *Aquila clanga* Pallas, 1811

**58** f Valle Zignago, Concordia Sagittaria-Caorle (VE), 02.02.1941; **819** m Grave di Candèlù, Maserada (TV), 28.10.1958

Es. 58 citato in FAVERO (1943c); es. 819 catturato da Romano Orso che nella stessa località avrebbe preso un altro esemplare nel novembre 1957 (GIOL, 1959b). Nel Veneziano specie nel passato svernante regolare, irregolare sino al 1999, in seguito censita occasionalmente (cfr. BON *et al.*, 2014).

**Aquila anatraia minore** *Aquila pomarina* C. L. Brehm, 1831

**000** juv. Negrizia, Ponte di Piave (TV), 09.10.1960

Es. assente dal catalogo e privo di numero progressivo nel cartellino; cattura documentata in GIOL (1961a). Tre segnalazioni venete accettate da ARRIGONI DEGLI ODDI (1929); recenti osservazioni in Veneto ne documentano gli scarsi movimenti migratori: 1 ind. Salionze, Valeggio sul Mincio (VR), 06.09.2003 (A. Gargioni, M. Busetto, C. Martignoni, F. Roscelli in BON *et al.* 2004); 1 ind. Silea (TV), 08.03.2006 (Mezzavilla F., in MEL-LONE & SIGHELE, 2007); 1 ind. Colline moreniche del Garda (VR/MN/BS), 25.08.2008 (P. Bonvicini in SIGHELE *et al.* 2009); 1 ind. Ottava Presa, Caorle (VE), 22.10.2010 (Pan-zarin L., in SIGHELE *et al.*, 2011).

**Aquila reale** *Aquila chrysaetos* (Linnaeus, 1758)

**53** m Monti Urzulei (OG), 26.02.1954; **54** m Monti Urzulei (OG), 07.02.1932

<sup>14</sup> "Morsacco" è un probabile refuso da leggersi Morsano al Tagliamento (PN) o Moimacco (UD).

<sup>15</sup> Indicata come senza data, "forse ucciso nei primi anni '50", da MingoZZi (1992).

**Aquila del Bonelli** *Aquila fasciata* Vieillot, 1822

59 f Lentini (SR), 24.11.1933

Citato in FAVERO (1937b) come subadulto avuto assieme ad un juv. ancora da Lentini ma in epoca diversa. La cattura documenta la presenza di quest'aquila nella Sicilia sud-orientale da dov'è attualmente scomparsa (MASSA, 2008).

**Aquila imperiale** *Aquila heliaca* Savigny, 1809

57 f Campocroce di Mirano (VE), 00.10.1940

Es. documentato in FAVERO (1942 b). Accidentale in Veneto, nota per una sola altra segnalazione: 1 ind., 20.10.2007, Affi (VR) (C. Izzo, M. Sighele in BON *et al.*, 2008). La f di *Falco imperialis* Bechstein, 1812, presa a Chirignago (VE), 00.03.1847 (CONTARINI, 1847) è da NINNI (1938) attribuita ad *A. chrysaetos*; l'antica citazione dell'esistenza di *F. imperialis* nella Val di Zoldo e nel Cadore dovuta a CATULLO (1838), emendata già da SALVADORI (1872), fu certamente frutto di confusione con *A. chrysaetos* (TORMEN & DE COL, 2008 cfr. ZENATELLO *et al.*, 1998).

Pandionidae

**Falco pescatore** *Pandion haliaetus* (Linnaeus, 1758)

19 f Colfrancui, Oderzo (TV), 12.09.1953; 20 m Lago Maggiore, 15.09.1931

Falconidae

**Grillaio** *Falco naumanni* Fleischer, 1818

51 m Portogruaro (VE), 01.09.1950; 52 m Paternò (CT), 19.09.1931

L'es. 51 non compreso nell'elenco di NARDO (2001) che raccoglie le osservazioni nel Veneto orientale (VE-TV) sino agli anni '90 del secolo scorso, quando la specie era scarsa ed occasionale (cfr. BON *et al.*, 2014). Catture nelle "paludi di Musile" e osservazioni nelle paludi del Veneziano erano riferite da NINNI (1900).

**Gheppio** *Falco tinnunculus* Linnaeus, 1758

34 f San Polo di Piave (TV), 29.02.1939; 35 m San Polo di Piave (TV), 15.10.1937; 36 m Portogruaro (VE), 23.11.1931

**Falco cuculo** *Falco vespertinus* Linnaeus, 1766

47 f Concordia Sagittaria (VE), 24.04.1956; 48 f Portogruaro (VE), 04.05.1936; 49 m Pasiano di Pordenone (PN), 18.05.1956; 50 m Portogruaro (VE), 24.04.1939

**Smeriglio** *Falco columbarius* Linnaeus, 1758

44 f Portogruaro (VE), 23.10.1950; 45 f Paternò (CT), 28.10.1933; 46 m San Polo di Piave (TV), 28.10.1938

**Lodolaio** *Falco subbuteo* Linnaeus, 1758

41 m Portogruaro (VE), 24.09.1951; 42 f Mirano (VE), 23.05.1935; 43 juv. Portogruaro (VE), 18.08.1950

La data di cattura e l'età dell'es. 43 indicative di una possibile nidificazione in zona, inedita per l'epoca.

**Falco della regina** *Falco eleonora* Gené, 1839

30 f Lotzorai (OG), 04.10.1937; 31 m Montesanto (NU), 04.09.1953; 32 f Lanusei (OG), 10.02.1939

**Lanario** *Falco biarmicus* Temminck, 1825

21 f Paternò (CT), 10.11.1931

**Sacro** *Falco cherrug* J. E. Gray, 1834

1 f dintorni di Mestre, Venezia, 09.03.1938

Es. citato in FAVERO (1938b). Migratore occasionale in Pianura Padana (BRICHETTI & FRACASSO, 2003), da confermare come accidentale in Veneto (FRACASSO *et al.*, 2011).

**Falco pellegrino** *Falco peregrinus* Tunstall, 1771

**6** m Thiene (VI), 13.05.1939; **7** m Thiene (VI), 27.11.1956; **33** f Lanusei (OG), 17.12.1954; **868** juv. Lugo Vicentino (VI), 29.12.1955

Es. 33 attribuito a *F. p. brookei* Sharpe, 1873. Es. 868 discusso in SEMENZATO & SCARTON (1998), precedentemente determinato come *F. pelegrioides* Temminck, 1829.

Gruiformes

Rallidae

**Porciglione** *Rallus aquaticus* Linnaeus 1758

**531** m Caorle (VE), 05.04.1956; **591** m San Stino di Livenza (VE), 16.10.1937; **857** f juv. Caorle (VE), 20.08.1957

**Voltolino** *Porzana porzana* (Linnaeus, 1766)

**111** m Venezia, 15.03.1945; **613** m San Polo di Piave (TV), 25.08.1937; **831** m Portogruaro (VE), 07.08.1958

Es. 111 parzialmente albino.

**Schiribilla** *Porzana parva* (Scopoli, 1769)

**614** f Caorle (VE), 22.09.1956; **615** f Caorle (VE), 11.09.1954; **616** f Giare, Mira (VE), 05.04.1935; **633** f San Polo di Piave (TV), 10.08.1951; **880** f Caorle (VE), 22.03.1957

**Schiribilla grigiata** *Porzana pusilla* (Pallas, 1776)

**617** f Dogaletto, Mira (VE), 07.09.1936; **618** m Giare, Mira (VE), 04.04.1934

Specie accidentale per il Veneto (cfr. FRACASSO *et al.*, 2011).

**Re di quaglie** *Crex crex* (Linnaeus, 1758)

**611** f Giare, Mira (VE), 25.09.1934; **612** m Portogruaro (VE), 28.12.1951

**Gallinella d'acqua** *Gallinula chloropus* Linnaeus 1758

**528** f Cavarzere (VE), 28.09.1934; **529** m Portogruaro (VE), 29.04.1936; **530** f San Polo di Piave (TV), 20.10.1957

**Pollo sultano** *Porphyrio porphyrio* (Linnaeus, 1758)

**677** m Lentini (SR), 15.03.1949

Attualmente assente l'es. 676, in catalogo come f Lentini (SR), 28.03.1949, che verosimilmente era uno dei due, anche se entrambi segnalati come mm, citati da FAVERO (1949b) con la stessa data di cattura ma indicati come genericamente provenienti "dalla Sicilia". Gli esemplari collezionati appartenevano alla popolazione siciliana estinta intorno agli anni Cinquanta del secolo scorso, oggetto di reintroduzione nel 2000-02 presso il Biviere di Gela e a Foce Simeto (CT) (cfr. BRICHETTI & FRACASSO, 2004). Provengono da Lentini anche 1 m e 1 f del 1934 della collezione Perale (BIASIOLO & BON, 2005).

**Folaga** *Fulica atra* Linnaeus 1758

**66** m Valle Dogà (VE), 14.12.1937; **67** f Portogruaro (VE)<sup>16</sup>, 29.11.1953; **68** m Caorle (VE), 08.11.1954; **749** m Valle Dogà, Venezia, 12.10.1937

Ess. 66, 67, 68 parzialmente albini.

Gruidae

**Damigella di Numidia** *Grus virgo* (Linnaeus, 1758)

**837** ad. Lago Maggiore, 00.03.1958

Es. discusso da SEMENZATO & SCARTON (1998), ritenuto non selvatico da BOANO & PULCHER (2003). Non facilmente valutabile la provenienza dei pochi altri esemplari presi nell'Italia settentrionale: 1 es. "padovano", s. d., conservato nel Museo Zoologico

<sup>16</sup> FAVERO (1954b) registra come luogo di cattura Valle Zignago, Caorle (VE).

dell'Università di Padova (NINNI, 1885) la cui origine selvatica fu messa in dubbio da ARRIGONI DEGLI ODDI (1929); 1 es. Acqualunga, Borgo San Giacomo (BS), 18.03.1927 (BRICHETTI, 1982); 1 m ad. S. Giorgio di Nogaro (UD), 27.03.1942 (BRICHETTI, 1974); 1 es. 00.00.1970 Dogaletto di Mira (VE) (AA. VV., 1985); 1 es. 00.00.1976 Valproto (VI) (AA. VV., 1985); Parma, 00.00.1986 (BAGNI *et al.*, 2003).

**Gru** *Grus grus* (Linnaeus, 1758)

**657** m Pisa, 18.03.1951; **658** m Bari, 08.09.1938; **659** f Genova, provincia, 26.10.1939.

Otididae

**Gallina prataiola** *Tetrax tetrax* Linnaeus, 1758

**634** m Sindacale, Concordia Sagittaria (VE), 16.11.1949; **635** f Cesarlo, San Michele al Tagliamento (VE), 07.12.1953

Es. 634 citato in FAVERO (1950b); es. 635 citato in FAVERO (1954b) che segnala altri 4 es. osservati in località Pradis di San Michele al Tagliamento (VE), 24.12.1949 uno dei quali abbattuto. Una f rinvenuta a San Donà di Piave (VE), il 31.03.2012, costituisce la quarta segnalazione nota per il Veneto negli ultimi cinquant'anni (G. & E. Sgorlon in SIGHELE *et al.*, 2013).

Charadriiformes

Haematopodidae

**Beccaccia di mare** *Haematopus ostralegus* Linnaeus, 1758

**643** m Valle Vecchia, Caorle (VE), 20.03.1950; **644** m Viareggio (LU), 23.05.1951

Es. 643 segnalato in FAVERO (1951b). Nell'area costiera veneta la nidificazione di questa specie è stata nuovamente documentata, dopo quasi un secolo di assenza, a partire dal 1996; anche lo svernamento è presumibilmente molto recente (cfr. BON *et al.*, 2014).

Recurvirostridae

**Cavaliere d'Italia** *Himantopus himantopus* (Linnaeus, 1758)

**645** f Torre del Lago, Viareggio (LU), 14.04.1937; **646** f Portogruaro (VE), 24.05.1951

**Avocetta** *Recurvirostra avosetta* Linnaeus, 1758

**647** m Estuario Veneto<sup>17</sup>, 14.10.1931; **648** m San Michele al Tagliamento (VE), 20.03.1955

Es. 647 citato in FAVERO (1953a).

Burhinidae

**Occhione** *Burhinus oedicnemus* (Linnaeus, 1758)

**636** m Portogruaro (VE), 10.11.1954; **640** m Isola la Vacca, Carbonia-Iglesias (CL), 24.04.1949

Es. 640 citato in FAVERO (1949b).

Glareolidae

**Corriente biondo** *Cursorius cursor* (Latham, 1787)

**606** m Scaltenigo, Mirano (VE), 06.11.1932 ; **607** f Novi Ligure (AL), 22.10.1955

Es. 606 citato in FAVERO (1933b) e MOLTONI (1956c); la località di cattura è erroneamente registrata, prima da DI CARLO (1973) e poi da NORANTE (1980), come "Scaltempo di Merano". Es. 607 preparato da Mario Dugone di Torino; MOLTONI (1956) riporta una diversa data di cattura, 20.10.1955. Entrambe gli esemplari discussi in VERDUCCI *et al.* (2012). NINNI & TROIS (1881) citavano erroneamente *C. gallicus* tra le specie accidentali nel Veneziano, attribuendo a questa specie la descrizione di *Glareola pratincola* Linnaeus, 1766 fornita da CONTARINI (1847).

<sup>17</sup> Cfr. nota 8.

**Pernice di mare** *Glareola pratincola* Linnaeus, 1766

597 f Viareggio (LU), 02.05.1951; 598 f Valle Zignago, Concordia Sagittaria-Caorle (VE), 06.05.1948

Es. 598 citato in FAVERO (1950a), che indica la data 06.06.1948, preso da un gruppo di 10-12 ess.; alla dissezione era presente un uovo in via di sviluppo. La nidificazione di Pernice di mare è stata accertata nel 2002 a Valle Vecchia di Caorle (VE) (BON *et al.*, 2004), località prossima a quella possibile segnalata da FAVERO (l. c.).

Charadriidae

**Corriere piccolo** *Charadrius dubius* Scopoli 1786

620 f Venezia, 09.04.1933; 621 m Portogruaro (VE), 18.04.1951

**Corriere grosso** *Charadrius hiaticula* Linnaeus 1758

622 f Pisa, 10.05.1950; 623 f Murano (VE), 10.09.1933

**Fratino** *Charadrius alexandrinus* Linnaeus 1758

532 f Caorle (VE), 06.06.1956; 533 f Caorle (VE), 06.06.1956; 534 m Mestre, Venezia, 18.04.1935

**Piviere tortolino** *Charadrius morinellus* Linnaeus, 1758

599 m Foggia, 15.09.1929; 600 f San Severo (FG), 16.12.1933; 601 m Caorle (VE), 20.09.1941

**Piviere dorato** *Pluvialis apricaria* Linnaeus, 1758

602 m Venezia, 11.12.1932; 603 m San Polo di Piave (TV), 21.03.1939; 604 m Portogruaro, 03.12.1952; 605 f San Polo di Piave (TV), 20.10.1956

**Pivieressa** *Pluvialis squatarola* Linnaeus, 1758

558 f Caorle (VE), 03.06.1936; 559 m Paternò (CT), 21.12.1931; 560 m Paternò (CT), 02.07.1931

**Pavonella codabianca** *Vanellus leucurus* (Lichtenstein, 1823)

608 m Russia asiatica<sup>18</sup>, 00.10.1904

**Pavonella** *Vanellus vanellus* (Linnaeus, 1758)

609 m Caposile, Musile di Piave – San Donà di Piave (VE), 15.10.1937; 610 m Tezze di Piave, Vazzola (TV), 07.04.1938

Scolopacidae

**Piovanello maggiore** *Calidris canutus* Linnaeus, 1758

546 f Portogruaro (VE), 07.10.1920; 879 m Viareggio (LU), 20.04.1941

Nel Veneziano occasionale durante lo svernamento e i movimenti migratori (cfr. BON *et al.*, 2004).

**Piovanello tridattilo** *Calidris alba* (Pallas, 1754)

538 f Venezia, 21.05.1936; 539 m Viareggio (LU), 03.10.1936; 540 m Viareggio (LU), 27.05.1936

**Gambecchio comune** *Calidris minuta* (Leisler, 1812)

624 f Caorle (VE), 03.06.1956; 625 m Venezia, 12.10.1933; 895 f Caorle (VE), 15.06.1958; 896 m Caorle (VE), 28.11.1953

**Gambecchio nano** *Calidris temminckii* (Leisler, 1812)

626 m Venezia, 12.10.1933

<sup>18</sup> Dicitura riportata nel catalogo manoscritto.

**Piovanello comune** *Calidris ferruginea* (Pontoppidan, 1763)  
541 m Portogruaro (VE), 10.10.1941; 866 m Caorle (VE), 04.05.1958; 867 f Caorle (VE), 09.06.1957

**Piovanello pancianera** *Calidris alpina* Linnaeus, 1758  
535 f Marano Lagunare (UD), 16.12.1952; 536 m Portogruaro (VE), 02.04.1957; 537 m Murano, Venezia, 12.11.1933

**Gambecchio frullino** *Limicola falcinellus* (Pontoppidan, 1763)  
832 m Lago Taglio Foscari, Venezia, 12.08.1944

**Combattente** *Philomachus pugnax* Linnaeus, 1758  
561 m foci del Po (RO-FE), 06.05.1936; 562 m Lago di Massaciuccoli, Massarosa (LU), 07.15.1935; 563 m Lago di Massaciuccoli, Massarosa (LU), 15.05.1935; 564 m Caorle (VE), 10.04.1956; 565 m Valle Dogà, Venezia, 27.02.1939; 566 f Valle Dogà, Venezia, 15.03.1935; 883 f Caorle (VE), 28.05.1953

**Frullino** *Lymnocyptes minimus* (Brünnich, 1764)  
627 f Portogruaro (VE), 27.12.1952; 628 m Portogruaro (VE), 10.11.1937

**Beccaccino** *Gallinago gallinago* (Linnaeus, 1758)  
629 f Portogruaro (VE), 10.08.1938; 630 m Portogruaro (VE), 07.01.1957

**Croccolone** *Gallinago media* (Latham, 1787)  
631 f Malcontenta, Venezia, 05.04.1954; 632 m San Polo di Piave (TV), 16.04.1933

**Beccaccia** *Scolopax rusticola* Linnaeus, 1758  
593 m San Polo di Piave (TV), 06.11.1956; 594 f Brestovizza in Valle, Komen, Slovenia, 04.11.1936

**Pittima reale** *Limosa limosa* Linnaeus 1758  
553 m Valle Dogà, Venezia, 09.10.1937; 554 m Portogruaro (VE), 28.03.1950

**Pittima minore** *Limosa lapponica* Linnaeus 1758  
555 f Viareggio (LU), 10.10.1937

**Chiurlo piccolo** *Numenius phaeopus* (Linnaeus, 1758)  
638 m Valle Dogà, Venezia, 12.04.1937; 639 f Caorle (VE), 14.05.1956; 833 m Marano Lagunare (UD), 14.04.1958

**Chiurlo maggiore** *Numenius arquata* (Linnaeus, 1758)  
640 m Valle Dogà, 10.04.1937; 641 m Caorle (VE), 22.11.1955; 642 m Burano (VE), 04.04.1934  
L'esemplare 640 erroneamente determinato come Chiurlottello *Numenius tenuirostris* Vieillot, 1817.

**Piro piro piccolo** *Actitis hypoleucos* (Linnaeus, 1758)  
542 m Mirano (VE), 04.04.1934; 781 m Caorle (VE), 09.07.1955

**Piro piro culbianco** *Tringa ochropus* Linnaeus 1758  
544 m Caorle (VE), 20.07.1956; 545 m Conegliano (TV), 03.05.1944

**Totano moro** *Tringa erythropus* (Pallas, 1754)  
550 m Caorle (VE), 23.08.1955; 551 m Venezia, 04.05.1937; 592 f Valle Dogà, Venezia, 02.04.1936; 875 m Caorle (VE), 27.11.1958

**Pantana** *Tringa nebularia* (Gunnerus, 1767)  
556 f Portogruaro (VE), 06.04.1950; 557 f paludi di Portogruaro (VE)<sup>19</sup>, 02.09.1934

<sup>19</sup> Cfr. nota 1.

**Albastrello** *Tringa stagnatilis* (Bechstein, 1803)  
547 m Venezia, 22.08.1935; 548 m Portogruato (VE), 19.04.1952

**Piro piro boschereccio** *Tringa glareola* Linnaeus, 1758  
543 f Caorle (VE), 26.08.1956

**Pettegola** *Tringa totanus* Linnaeus, 1758  
549 m Caorle (VE), 30.04.1953; 552 f Venezia, 10.10.1933

**Voltapietre** *Arenaria interpres* (Linnaeus, 1758)  
595 m f Viareggio (LU), 12.04.1939; 596 f Viareggio (LU), 12.04.1939

**Falaropo beccosottile** *Phalaropus lobatus* (Linnaeus, 1758)  
870 m Caorle (VE), 22.08.1957  
In Veneto migratore scarso ed irregolare (cfr. FRACASSO *et al.*, 2011).

**Falaropo beccolargo** *Phalaropus fulicarius* (Linnaeus, 1758)  
619 m Foci del Serchio, Viareggio (LU), 28.11.1935  
Es. citato da FAVERO (1957a).

#### Stercorariidae

**Stercorario mezzano** *Stercorarius pomarinus* (Temminck, 1815)  
500 m Arcipelago Toscano (LI-GR) 19.09.1947; 501 m Marina di Pietrasanta<sup>20</sup> (LU),  
06.10.1939; 865 m Pratolino, Vaglia (FI), 28.10.1956  
In Toscana migratore irregolare e svernante localizzato (TELLINI FLORENZANO *et al.*,  
1997).

**Labbo** *Stercorarius parasiticus* (Linnaeus, 1758)  
499 m “foci del fiume Torre”, San Canzian d’Isonzo (GO)<sup>21</sup>, 00.03.1934; 826 f Caorle  
(VE), 25.09.1957

**Labbo codalunga** *Stercorarius longicaudus* Vieillot, 1819  
518 f Lago Maggiore, 14.11.1949; 519 m Valle Dogà, Venezia, 05.10.1939; 520 m Ve-  
nezia, 14.10.1938  
Es. 518 citato in FAVERO (1950b), leg. Cajelli, Lisanza (VA). Migratrice scarsa, relati-  
vamente regolare, nota per una decina di segnalazioni venete nell’ultimo trentennio  
(SIGHELE *et al.*, 2013).

**Stercorario maggiore** *Stercorarius skua* (Brünnich, 1764)  
502 m Ingólfshöfði, Austurland, Islanda, 10.06.1936

#### Laridae

**Gabbiano tridattilo** *Rissa tridactyla* (Linnaeus, 1758)  
514 m Viareggio (LU), 08.02.1932; 515 f Mare Tirreno, 29.01. 1952; 516 m Arcipelago  
Toscano (LI-GR); 517 m Mare Tirreno, 16.09.1952

**Gabbiano comune** *Chroicocephalus ridibundus* (Linnaeus, 1766)  
570 m Valle Dogà, Venezia, 04.11.1937; 571 m juv. Venezia, 15.06.1956; 572 f Caorle  
(VE), 07.06.1956; 573 m Venezia, 05.04.1935; 574 m Caorle (VE), 01.01.1955; 830 m  
Marano Lagunare (UD), 03.07.1957

**Gabbianello** *Hydrocoloeus minutus* (Pallas, 1776)  
578 f Viareggio (LU), 16.01.1935; 579 f juv. Pisa, 10.05.1950; 580 m Pisa, 08.05.1950

<sup>20</sup> Designata nel cartellino come “Marina di Lucca”.

<sup>21</sup> Interpretando la dicitura “foci” del cartellino originale come indicante la confluenza del tor-  
rente Torre nell’Isonzo nel territorio di San Canzian d’Isonzo.

**Gabbiano corallino** *Larus melanocephalus* Temminck, 1820  
575 m juv. Venezia, 10.11.1956; 576 m Viareggio 10.01.1939; 577 f Pisa, 06.04.1950;  
858 m juv. Palermo, 30.03.1957

**Gabbiano corso** *Larus audouinii* Payraudeau, 1826  
494 f Viareggio (LU), 07.04.1950; 495 f Viareggio (LU), 28.02.1939  
Es. 494 citato in FAVERO (1952), assieme ad un altro.

**Gavina** *Larus canus* Linnaeus, 1758  
492 m Mirano (VE), 20.12.1938; 493 f Caorle (VE), 27.01.1954

**Zafferano** *Larus fuscus* Linnaeus, 1758  
496 f Palermo, 10.01.1950; 497 m Grado (GO), 20.04.1956; 498 f Viareggio (LU),  
18.04.1951

**Gabbiano reale** *Larus michaellis* J. F. Naumann, 1840  
503 m Valle Dogà, Venezia (VE), 05.09.1937; 845 f juv. Caorle (VE), 23.07.1956

**Gabbiano glauco** *Larus hyperboreus* Gunnerus, 1767  
505 m coste della Sardegna, 15.01.1929  
Es. discusso in SCARTON & SEMENZATO (1998). Accidentale con 18 segnalazioni italiane  
(BRICHETTI & FRACASSO, 2006).

**Mugnaiaccio** *Larus marinus* Linnaeus, 1758  
504 m Cagliari, 15.12.1950  
Specie accidentale in Sardegna (BRICHETTI & FRACASSO, 2006).

Sternidae

**Fratricello** *Sternula albifrons* (Pallas, 1764)  
587 m Venezia, 11.08.1935; 886 m Caorle (VE), 08.06.1957

**Sterna zampenere** *Gelochelidon nilotica* (J. F. Gmelin, 1789)  
508 f Viareggio (LU), 23.05.1951; 509 m Campalto, Venezia, 19.04.1936

**Sterna maggiore** *Hydropogone caspia* (Pallas, 1770)  
490 f Viareggio (LU), 24.04.1951; 491 m palude di Portogruaro (VE), 04.04.1943; 854  
m juv. Morsano al Tagliamento (PN), 17.09.1955  
Es. 490 citato in FAVERO (1952); es. 491 citato in FAVERO (1943c). L'es. 854 citato da  
MOLTONI (1958a) con data 20.09.1955, era stato inanellato in Svezia il 07.07.1955 (cfr.  
PARODI, 2004).

**Sterna comune** *Sterna hirundo* Linnaeus, 1758  
512 m Caorle (VE), 29.06.1936; 513 m Laguna Veneta, 14.04.1935

**Mignattino piombato** *Chlidonias hybrida* (Pallas, 1811)  
590 f Campalto, Mestre, Venezia 10.05.1936

**Mignattino comune** *Chlidonias niger* Linnaeus, 1758  
588 f Venezia, 24.04.1936; 589 m Caorle (VE), 09.06.1955; 878 m juv. Caorle (VE),  
12.08.1956; 898 m Caorle (VE), 10.08.1956

**Mignattino alibianche** *Chlidonias leucopterus* (Temminck, 1815)  
581 f Torre del Lago Puccini, Viareggio (LU), 24.05.1936

**Beccapesci** *Sterna sandvicensis* Latham, 1787  
510 m Marina di Pisa, 06.04.1938; 511 m Pisa, 10.04.1950

Alcidae

**Gazza marina** *Alca torda* Linnaeus, 1758

**523** f Isole Eolie (ME), 29.01.1939; **524** m Isole Eolie (ME), 26.01.1939; **525** f Genova, 12.02.1956

**Pulcinella di mare** *Fratercula arctica* (Linnaeus, 1758)

**526** m La Maddalena, Olbia-Tempio (OT), 13.03.1949; **527** m Isola la Vacca, Carbonia-Iglesias (CL), 26.10.1931

Es. citato in FAVERO (1949b).

Pteroclitiformes

Pteroclitidae

**Sirratte** *Syrhaptes paradoxus* (Pallas, 1773)

**822** m Asia o Africa<sup>22</sup>, 00.00.1958; **823** f Asia o Africa<sup>23</sup>, 00.00.1958

Entrambe gli ess. acquistati il 18.10.1958 sul mercato di Padova.

Columbiformes

Columbidae

**Piccione selvatico** *Columba livia* Gmelin, 1789

**194** m Gorizia, 16.12.1956; **195** m Capodistria – Koper, Slovenia, 07.11.1948

**Colombella** *Columba oenas* Linnaeus, 1758

**196** m Murano (VE), 17.12.1953

**Colombaccio** *Columba palumbus* Linnaeus, 1758

**197** m S. Polo di Piave (TV), 06.10.1937

**Tortora dal collare** *Streptopelia decaocto* (Frivaldszky, 1838)

**191** m tenuta Brussa, Caorle (VE), 08.11.1944; **192** f Portogruaro (VE), 02.12.1956; **193** f S. Polo di Piave (TV), 31.10.1956

Es. 191 descritto in MOLTONI (1947), prima segnalazione certa per l'Italia (cfr. MOLTONI, 1955b); es. 192 isabellino citato in FAVERO (1957a); es. 193 raccolto da Luigi Bazzo (GIOL, 1957a).

**Tortora** *Streptopelia turtur* (Linnaeus, 1758)

**189** m Portogruaro (VE), 14.08.1939; **190** f Portogruaro (VE), 21.05.1953

Cuculiformes

Cuculidae

**Cuculo dal ciuffo** *Clamator glandarius* (Linnaeus, 1758)

**187** f Lori (GE), 28.02.1954 ; **188** m Viareggio (LU), 10.03.1951

Es. 187 citato in FAVERO (1954 b), raccolto da Confalonieri; es. 188 citato in FAVERO (1952).

**Cuculo** *Cuculus canorus* Linnaeus, 1758

**184** m Montale (PT), 09.09.1935; **185** f Mirano (VE), 12.05.1935; **186** m San Polo di Piave (TV), 09.06.1939

Es. 185 citato in FAVERO (1936).

<sup>22</sup> Così nel catalogo.

<sup>23</sup> Cfr. nota precedente.

Strigiformes

Tytonidae

**Barbagianni** *Tyto alba* (Scopoli, 1769)

479 m San Polo di Piave (TV), 15.11.1945; 473 f Portogruaro (VE), 10.03.1952; 860 m Lanusei (OG), 18.01.1958

Es. 473 attribuito a *T. a. guttata* (C.L. Brehm, 1831); es. 860 attribuito a *T. a. ernesti* (Kleinschmidt, 1901).

Strigidae

**Assiolo** *Otus scops* (Linnaeus, 1758)

481 m San Polo di Piave (TV), 11.04.1959; 486 m Paternò (CT), 10.03.1930

**Gufo reale** *Bubo bubo* (Linnaeus, 1758)

489 m Asiago (VI), 03.11.1948; 488 m Thiene (VI), 14.10.1956

**Civetta nana** *Glaucidium passerinum* (Linnaeus, 1758)

818 f Thiene (VI), 12.11.1954; 877 m Thiene (VI), 28.09.1957

Dalla stessa località FAVERO (1955b) segnala un altro es. avuto da Marzaro il 23.11.1954. Entrambi gli esemplari citati in SEMENZATO *et al.*, in stampa.

**Civetta** *Athene noctua* (Scopoli, 1769)

480 m San Polo di Piave (TV), 05.07.1937; 485 m San Polo di Piave (TV), 25.11.1956

**Allocco** *Strix aluco* Linnaeus 1758

474 f San Polo di Piave (TV), 12.12.1937; 475 f Cansiglio (TV), 17.12.1957

**Allocco degli Urali** *Strix uralensis* Pallas, 1771

476 f Novouzensk (Oblast' di Saratov, Russia)<sup>24</sup>, 21.09.1938; 487 m Cividale del Friuli (UD), 20.11.1952

Es. attribuiti a *S. u. liturata* Lindroth, 1788; es. 487 segnalato da TOSCHI (1953), preparato da Sabbadini, Cividale del Friuli (UD), citato da MOLTONI (1956 b). Sino a fine anni '70 specie accidentale nota con meno di venti catture (cfr. MOLTONI & BRICHETTI, 1978); nidificante nell'Italia nord orientale a partire dal 1994 (cfr. BRICHETTI & FRACASSO, 2006).

**Gufo comune** *Asio otus* (Linnaeus, 1758)

478 m San Polo di Piave (TV), 23.02.1939

**Gufo di palude** *Asio flammeus* (Pontoppidan, 1763)

477 m San Donà di Piave (VE), 12.11.1938

**Civetta capogrosso** *Aegolius funereus* (Linnaeus, 1758)

482 m Altipiano di Asiago (VI), 26.10.1952; 483 f Maniago (PN), 08.11.1952; 484 m Trentino, 16.10.1938

Gli ess. 482 e 483 citati in FAVERO (1953). L'es. 483 conferma il fenomeno dei movimenti autunnali verso l'area pedemontana e la pianura noto per il Friuli-Venezia Giulia (PARODI, 2004). Il recente rinvenimento di un ind. a Spresiano (TV), il 10 febbraio 2013 (MEZZAVILLA & FRASSON, 2014) attesta anche per il Trevigiano questa fenologia, documentata nel passato per la pianura veneziana, 1 m Mirano (VE), 14.11.1950 (FAVERO, 1952), il Polesine, 1 es. Canalvecchio, Loreo (RO), 00.12.1873 (DAL FIUME, 1896), la pianura veronese, 1 f Bussolengo (VR) 23.10.1893 e 1 f San Giovanni Lupatoto (VR) 02.11.1898 (ARRIGONI DEGLI ODDI, 1899; cfr. FOSCHI *et al.* 1996) e quella padovana, 1 es. tra Torre, Padova e Cadoneghe (PD) 15.02.1897 (FOSCHI *et al.* 1996).

<sup>24</sup> Nel catalogo indicata come località appartenente alla "Svezia".

Caprimulgiformes

Caprimulgidae

**Succiacapre** *Caprimulgus europaeus* Linnaeus, 1758

**211** f Mirano (VE), 05.05.1934; **212** m San Polo di Piave (TV), 05.04.1956

Apodiformes

Apodidae

**Rondone** *Apus apus* (Linnaeus, 1758)

**117** f San Polo di Piave (TV), 06.06.1939; **118** m San Polo di Piave (TV), 05.06.1939

**Rondone maggiore** *Apus melba* (Linnaeus, 1758)

**114** m Livinallongo (BL), 12.05.1930; **115** m Livinallongo (BL), 06.06.1940; **116** f Livinallongo (BL), 16.05.1956

Coraciiformes

Alcedinidae

**Martin pescatore** *Alcedo atthis* (Linnaeus, 1758)

**255** m Colfrancui, Oderzo (TV), 08.01.1936; **256** f San Polo di Piave (TV), 12.12.1945

Meropidae

**Grucione** *Merops apiaster* Linnaeus, 1758

**257** m Palermo, 08.05.1956; **258** f Ventotene (LT), 18.05.1956; **259** m Roma, 12.05.1956

Coraciidae

**Ghiandaia marina** *Coracias garrulus* Linnaeus, 1758

**181** m Palermo, 17.05.1955; **182** f Laguna di Venezia, 03.05.1939 ; **183** f Palermo 08.05.1955

Es. 182 citato in FAVERO (1940) e compreso nell'elenco di NARDO (2001) che raccoglie le segnalazioni note per il Veneto orientale (VE e TV). Nel Veneziano migratrice ed estivante occasionale sino allo scorso decennio; le prime nidificazioni sono state accertate nell'area costiera del Veneto orientale nel 2012 (SIGHELE *et al.*, 2013).

Upupidae

**Upupa** *Upupa epops* Linnaeus, 1758

**213** m San Polo di Piave (TV), 08.04.1955

Piciformes

Picidae

**Torcicollo** *Jynx torquilla* Linnaeus, 1758

**161** m San Polo di Piave (TV), 15.05.1939

**Picchio cenerino** *Picus canus* (J.F. Gmelin, 1788)

**153** m Alleghe (BL), 19.09.1939; **154** f Bolzano, 20.10.1956

Specie nel passato ritenuta nidificante scarsa e localizzata, meno rara sulle Alpi orientali (BRICHETTI & FRACASSO, 2007).

**Picchio verde** *Picus viridis* (Linnaeus, 1758)

**150** m San Polo di Piave (TV), 06.02.1937; **151** m San Polo di Piave (TV), 06.11.1938;

**152** juv. San Polo di Piave (TV), 08.05.1937

Es. attribuiti a *P. v. pronus* Hartert, 1911, forma messa in sinonimia con *P. v. karelini* Brant, 1841 (cfr. BRICHETTI & FRACASSO, 2007). L'es. 152 documenta una probabile riproduzione in zona: la specie scomparsa dall'area planiziale intorno agli anni Sessanta del Novecento, l'ha progressivamente rioccupata a partire dalla metà degli anni Novanta (cfr. MEZZAVILLA *et al.*, 1999).

**Picchio nero** *Dryocopus martius* (Linnaeus, 1758)

147 f Alleghe (BL), 10.12.1937; 148 f Vallada (BL), 05.10.1952; 149 m Levico (TN), 20.09.1930

**Picchio rosso maggiore** *Dendrocopos major* (Linnaeus, 1758)

156 m Treviso, 16.10.1934; 157 f San Polo di Piave (TV), 12.01.1937; 158 m Lanusei (OG), 03.03.1953; 159 f San Polo di Piave (TV), 10.12.1957

Es. attribuiti a *D. m. italiae* (Stresemann, 1919).

**Picchio rosso mezzano** *Picooides medius* (Linnaeus, 1758)

817 m Bolzano, 03.12.1956

Es. commentato in SEMENZATO & SCARTON (1998) che riassumono le poche informazioni disponibili per il Veneto. Scarsi i reperti anche per il resto dell'Italia settentrionale: tre storici rispettivamente nel Friuli-Venezia Giulia (PARODI, 2006) e in Liguria (BAGHINO *et al.*, 2012), due nel Piemonte (BOANO & PULCHER, 2003) e due recenti in Emilia Romagna (BAGNI *et al.*, 2003). Una recente osservazione in Veneto riguarda 1 ind. visto più volte a Torre di Mosto (VE), tra 18.11.2000 e 07.01.2001 (L. Panzarin in ARCAMONE & BRICHETTI, 2001).

**Picchio rosso minore** *Dendrocopos minor* (Linnaeus, 1758)

160 m Mirano (VE), 19.03.1938

Es. citato da FAVERO (1938b) che ne riporta la cattura assieme ad un altro es., probabilmente il m della collezione Perale con stessa località e stessa data (BIASIOLO & BON, 2005). Specie in Veneto scarsa ed irregolare durante le migrazioni, recentemente rinvenuta in periodo riproduttivo nel Bellunese (VARASCHIN *et al.*, 2011).

**Picchio tridattilo** *Picooides tridactylus* (Linnaeus, 1758)

155 m Vittorio Veneto (TV), 00.10.1946

Es. appartenente a *P. t. alpinus* (C.L. Brehm, 1831); dono di mons. Buffon, preparato da Marchesini di Conegliano (GIOL, 1957a). Specie localizzata nelle Alpi centro-orientali e nel passato forse sottostimata: sino a metà degli anni Settanta erano note solo una quindicina di catture (MOLTONI & BRICHETTI, 1978).

Passeriformes

Alaudidae

**Calandra** *Melanocorypha calandra* (Linnaeus, 1766)

414 f Capodistria – Koper, Slovenia, 22.11.1939; 415 f Foggia, 15.10.1933

**Calandrella** *Calandrella brachydactyla* (Leisler, 1814)

107 m Foggia, 21.08.1936; 405 m Venezia, 10.05.1956; 406 m Palermo, 19.11.1954

Es. 107 isabellino.

**Cappellaccia** *Galerida cristata* (Linnaeus, 1758)

413 f f San Polo di Piave (TV), 10.10.1957

**Tottavilla** *Lullula arborea* (Linnaeus, 1758)

112 m San Biagio di Callalta (TV), 02.10.1957; 411 f Mirano (VE), 22.10.1953; 412 m Mirano (VE), 15.10.1938

Es. 112 albino citato in GIOL (1958b).

**Allodola** *Alauda arvensis* Linnaeus, 1758

**103** m Giare, Mira (VE), 23.10.1941; **0105** f Asiago (VI), 23.10.1955; **106** f Foggia, 08.11.1935; **108** f Portogruaro (VE), 22.03.1957; **408** m Capodistria – Koper, Slovenia, 22.11.1939, **409** m f San Polo di Piave (TV), 20.11.1957  
Es. 103 isabellino; es. 105 parzialmente albino; es. 106 isabellino; es. 108 melanico citato in FAVERO (1957a).

**Allodola golagialla** *Eremophila alpestris* (Linnaeus, 1758)

**407** m Altopiano di Asiago (VI), 09.11.1941  
Es. citato in FAVERO (1943a).

Hirundinidae

**Topino** *Riparia riparia* (Linnaeus, 1758)

**121** m Portogruaro (VE), 20.09.1952; **122** m Marano Lagunare (UD), 03.09.1933

**Rondine montana** *Ptyonoprogne rupestris* (Scopoli, 1769)

**119** m Caprile (BL), 27.08.1952; **120** m Agordo (BL), 18.10.1938

**Rondine** *Hirundo rustica* Linnaeus, 1758

**123** m San Polo di Piave (TV), 10.07.1939; **124** f San Polo di Piave (TV), 13.07.1939

**Balestruccio** *Delichon urbica* (Linnaeus, 1758)

**125** m Mirano (VE), 23.04.1933; **126** f San Polo di Piave (TV), 08.08.1939

Motacillidae

**Calandro maggiore** *Anthus richardi* Vieillot, 1818

**401** m Thiene (VI), 12.10.1956; **402** m Mirano (VE), 06.11.1937  
Es. 402 citato in FAVERO (1938a). Specie considerata migratrice rara ed irregolare fino agli anni Settanta del secolo scorso (cfr. MOLTONI & BRICHETTI, 1978).

**Calandro** *Anthus campestris* (Linnaeus, 1758)

**102** f Foggia, 17.11.1933; **403** f Bassano del Grappa (VI), 24.09.1957; **404** f Giare, Mira (VE), 17.03.1933  
Es. 102 isabellino.

**Prispolone** *Anthus trivialis* (Linnaeus, 1758)

**110** m Thiene (VI), 05.09.1935; **386** m San Polo di Piave (TV), 14.10.1938; **388** m Portogruaro (VE), 07.09.1950; **809** m juv. Bassano del Grappa (VI), 15.09.1958; **810** m San Polo di Piave (TV), 20.10.1958  
Es. 110 albino; es. 809 parzialmente albino.

**Pispola** *Anthus pratensis* (Linnaeus, 1758)

**109** f Portogruaro (VE), 19.09.1950; **392** f San Polo di Piave (TV), 09.10.1939; **393** m f San Polo di Piave (TV), 06.10.1950  
Es. 109 parzialmente albino.

**Pispola golarossa** *Anthus cervinus* (Pallas, 1811)

**387** m Portogruaro (VE), 14.10.1951; **394** m f San Polo di Piave (TV), 21.10.1951; **395** m f San Polo di Piave (TV), 29.10.1956; **396** m Portegrandi, Quarto d'Altino (VE), 13.10.1935; **397** f San Polo di Piave (TV), 11.10.1957; **398** m San Polo di Piave (TV), 19.10.1957; **399** f San Polo di Piave (TV), 11.10.1957; **400** f San Polo di Piave (TV), 19.10.1957; **808** m San Polo di Piave (TV), 02.10.1958  
Es. 395 raccolto da Luigi Bazzo, citato in GIOL (1957a); es. 808 citato in GIOL (1959b).

**Spioncello** *Anthus spinoletta* (Linnaeus, 1758)

**390** m San Polo di Piave (TV), 07.11.1957; **391** f San Polo di Piave (TV), 08.11.1938

**Spioncello del Pacifico** *Anthus rubescens* (Tunstall, 1771)

389 m Thiene (VI), 13.11.1951

L'es. determinato ed attribuito a *A. r. rubescens* (Tunstall, 1771) da MOLTONI (1952 b), risulta privo dell'unghia posteriore alla zampa sinistra, perduta durante la determinazione al Museo di Storia Naturale di Milano (MOLTONI, l. c.). Di questa specie accidentale a distribuzione oloartica ristretta, in Italia è nota un'altra cattura: 1 f Noventa Padovana (PD), 26.10.1960, determinata come *A. r. japonicus* Temminck & Schlegel, 1847 (BONFIO, 1962); entrambe le segnalazioni sono accettate nella check-list regionale (FRACASSO *et al.*, 2011).

**Cutrettola** *Motacilla flava* Linnaeus, 1758

420 m San Giuliano, Mestre (VE), 30.05.1936; 421 m Giare, Mira (VE), 02.10.1932

**Ballerina gialla** *Motacilla cinerea* Tunstall 1711

418 f San Polo di Piave (TV), 10.04.1933; 419 m San Polo di Piave (TV), 17.10.1938

**Ballerina bianca** *Motacilla alba* Linnaeus, 1758

416 m Portogruaro (VE), 10.10.1952; 417 m Ceggia (VE), 15.12.1937; 785 m San Polo di Piave (TV), 08.10.1958

Bombycillidae

**Beccofrusone** *Bombycilla garrulus* (Linnaeus, 1758)

233 m Cansiglio (TV), 27.11.1937; 234 f Zianigo, Mirano (VE), 03.03.1933; 782 m Portogruaro (VE), 01.02.1945; 802 m Pendici del Cansiglio (TV), 15.11.1958

L'es. 802 è verosimilmente uno dei tre catturati nella zona tra Serravalle, Vittorio Veneto e Cappella Maggiore citati da GIOL (1958c). Le date di cattura degli es. 234 e 802 rientrano negli anni di comparsa invasiva elencati da BRICHETTI & FRACASSO (2007).

Cinclidae

**Merlo acquaiolo** *Cinclus cinclus* (Linnaeus, 1758)

253 f Alleghe (BL), 20.11.1934; 254 f Maniago (PN), 20.11.1953

Troglodytidae

**Scricciolo** *Troglodytes troglodytes* (Linnaeus, 1758)

438 m San Polo di Piave (TV), 11.09.1936

Prunellidae

**Passera scopaiola** *Prunella modularis* Linnaeus, 1758

263 m San Polo di Piave (TV), 02.03.1938

**Sordone** *Prunella collaris* (Scopoli, 1769)

260 m Thiene (VI), 15.12.1935; 261 f Asiago (VI), 06.11.1956; 262 m Alleghe (BL), 19.09.1938

Turdidae

**Pettirosso** *Erithacus rubecula* (Linnaeus, 1758)

93 f Lucca, 20.11.1935; 318 m San Polo di Piave (TV), 14.01.1957; 319 m San Polo di Piave (TV), 10.03.1957; 899 m juv. Vallada (BL), 16.08.1958

Es. 93 parzialmente albino.

**Usignolo** *Luscinia megarhynchos* C. L. Brehm, 1831

380 m San Polo di Piave (TV), 21.04.1939

**Pettazzurro** *Luscinia svecica* (Linnaeus, 1758)

**429** f Portogruaro (VE), 17.03.1947; **430** m Ferrara, 30.09.1933; **431** f Ferrara, 30.09.1933; **432** m Paradiso, Pocenìa (UD), 10.04.1956; **433** m San Vito al Tagliamento (PN), 30.08.1954

Es. 429 citato in FAVERO (1948a). Es. 429, 432 e 433 appartengono alla forma *L. s. cyaneacula* (Meisner, 1804), es. 430 e 431 a *L. s. svecica* (Linnaeus, 1758).

**Codirosso spazzacamino** *Phoenicurus ochruros* (S. G. Gmelin, 1774)

**320** m San Polo di Piave (TV), 21.01.1936; **321** f San Polo di Piave (TV), 05.01.1939

**Codirosso** *Phoenicurus phoenicurus* (Linnaeus, 1758)

**434** m San Polo di Piave (TV), 18.09.1938

**Stiaccino** *Saxicola rubetra* Linnaeus, 1758

**315** m juv., San Massimo all'Adige, Verona, 20.10.1935

In catalogo, tra parentesi, "Dal Nero"; presumibilmente riferibile a dono di Vittorio Dal Nero (1862-1948), tassidermista collaboratore di Ettore Arrigoni degli Oddi e primo direttore del Museo Civico di Storia Naturale di Verona (cfr. BARBAGLI & VIOLANI, 2002).

**Saltimpalo** *Saxicola torquata* Linnaeus, 1758

**316** m San Polo di Piave (TV), 14.04.1939; **317** f San Polo di Piave (TV), 09.01.1939

**Culbianco** *Oenanthe oenanthe* Linnaeus, 1758

**329** m San Polo di Piave (TV), 02.10.1939; **330** m San Polo di Piave (TV), 12.10.1950

**Monachella** *Oenanthe hispanica* (Linnaeus, 1758)

**325** m Thiene (VI), 06.10.1944; **326** m Foggia, 15.08.1936; **327** f Thiene (VI), 15.05.1938  
Ess. ascrivibili al fenotipo *O. h. melanoleuca* (Guldenstadt, 1775).

**Monachella del deserto** *Oenanthe deserti* (Temminck, 1825)

**328** f fiume Astico, Passo di Riva, Dueville (VI), 30.12.1950

Es. raccolto da Marzaro e Leoni, citato in FAVERO (1952); specie migratrice e svernante irregolare con 24 segnalazioni note per l'Italia (BRICHETTI & FRACASSO, 2008); cattura accettata nella check-list regionale (FRACASSO *et al.*, 2011).

**Codirossone** *Monticola saxatilis* Linnaeus, 1766

**229** m Mirano (VE), 07.05.1937; **230** f La Consuma (AR-FI), 14.08.1936; **231** f pendici del Cansiglio (TV), 27.12.1957; **232** m pendici del Cansiglio (TV), 27.12.1957

L'es. 229 documenta la specie in una località inusuale; es. 231 e 232 attestano un inedito caso di svernamento in una località ove la specie è attualmente ritenuta una nidificante possibile (MEZZAVILLA & BETTIOL, 2007).

**Passero solitario** *Monticola solitarius* (Linnaeus, 1758)

**226** m Palermo, 20.03.1954; **227** f Palermo, 17.12.1953; **228** m Massa-Carrara, 02.12.1953; **804** m pendici del Cansiglio (TV), 01.12.1958; **805** f pendici del Cansiglio (TV), 01.12.1958

Gli es. 804 e 805 documentano la specie in una località attualmente disertata (cfr. MEZZAVILLA & BETTIOL, 2007).

**Tordo dorato** *Zootera dauma* (Latham, 1790)

**221** m Giappone, 09.03.1917

In catalogo, tra parentesi, "Dal Nero"; presumibilmente da attribuire a dono di Vittorio Dal Nero (1862-1948), tassidermista collaboratore di Ettore Arrigoni degli Oddi (cfr. BARBAGLI & VIOLANI, 2002).

**Merlo dal collare** *Turdus torquatus* Linnaeus, 1758

**214** m Mirano (VE), 22.03.1940; **215** f Sacile (PN) 26.09.1936; **216** m Vittorio Veneto (TV), 26.10.1957; **794** m pendici del Cansiglio (TV), 30.10.1958; m **795** pendici del

Cansiglio (TV), 10.11.1958; m **796** pendici del Cansiglio (TV), 30.11.1958; f **797** pendici del Cansiglio (TV), 30.10.1958  
Es. attribuiti a *T. t. alpestris* (C.L. Brehm, 1831). Es. 214 segnalato in FAVERO (1941): in pianura le presenze sono occasionali (cfr. BRICHETTI & FRACASSO, 2008).

**Merlo** *Turdus merula* Linnaeus, 1758

**75** m Lanusei (OG), 20.12.1955; **76** m San polo di Piave (TV), 13.04.1938, ; **77** m Viareggio (LU), 10.03.1950; f **78** Mirano (VE), 08.01.1941; **79** m Teglio (SO), 10.12.1951; **80** m San Polo di Piave (TV), 15.12.1930; **81** m Mestre (VE), 30.12.1930; **217** m San Polo di Piave (TV), 12.10.1937; **218** f San Polo di Piave (TV), 15.10.1937; **798** f San Polo di Piave (TV), 08.09.1958  
Es. 75 albino; ess. da 76 a 81 parzialmente albini; es. 79 teratologico con la porzione distale della mandibola superiore rivolta verso l'alto.

**Cesena** *Turdus pilaris* Linnaeus, 1758

**74** m Palazzolo sulla Stella (UD), 17.12.1951; **219** m San Polo di Piave (TV), 20.10.1936; **220** f San Polo di Piave (TV), 15.11.1936; **856** m Pocenia (UD), 19.02.1959  
Es. 74 melanico; es. 856 albino.

**Tordo bottaccio** *Turdus philomelos* C. L. Brehm, 1831

**69** m Sesto Fiorentino (FI), 06.10.1938; **0225** m San Polo di Piave (TV), 04.10.1941  
Es. 69 parzialmente albino.

**Tordo sassello** *Turdus iliacus* Linnaeus 1766

**70** f Foggia 24.01.1935; **71** m Mirano (VE), 04.12.1941; **72** f Cappella maggiore (TV), 11.12.1956 ; **73** m San Polo di Piave (TV), 27.11.1939; **224** m San Polo di Piave (TV), 06.10.1937  
Ess. 70, 71, 72 parzialmente albini; es. 73 melanico; es. 72 citato in GIOL (1957a).

**Tordela** *Turdus viscivorus* Linnaeus 1758

**222** m San Polo di Piave (TV), 03.12.1938; **223** f San Polo di Piave (TV), 04.10.1934; **876** m San Polo di Piave (TV), 03.02.1952

Sylviidae

**Usignolo di fiume** *Cettia cetti* (Temminck, 1820)

**381** f Paternò (CT), 11.01.1931; **382** m Lago di Lesina (FG), 12.11.1954

**Beccamoschino** *Cisticola juncidis* (Rafinesque, 1810)

**422** m Viareggio (LU), 08.12.1938

**Forapaglie macchiettato** *Locustella naevia* (Boddaert, 1783)

**889** m Portogruaro (VE), 28.09.1958

**Pagliarolo** *Acrocephalus paludicola* (Vieillot, 1817)

**423** m Giare, Mira (VE), 15.08.1934; **894** m Portogruaro (VE), 05.10.1952

Tra gli altri pochi reperti noti per il territorio veneziano, 1 m paludi della Rana, Marghera, Venezia, 05.09.1892 in collezione Bisacco Palazzi (BON *et al.*, 1993); generiche indicazioni di nidificazione erano fornite da NINNI & TROIS (1881) per il Veneziano e da DAL FIUME (1896) per il Polesine. In Italia la specie parrebbe estinta come nidificante dalla prima metà del XX secolo, forse prima (cfr. BRICHETTI & FRACASSO, 2010); attualmente è un migratore raro ma regolare (SPINA & VOLPONI, 2008).

**Forapaglie comune** *Acrocephalus schoenobaenus* (Linnaeus, 1758)

**424** m Giare, Mira (VE), 10.08.1934; **891** f Portogruaro (VE), 04.10.1950

**Cannaiola** *Acrocephalus scirpaceus* (Hermann, 1804)

**425** m Portogruaro (VE), 08.10.1930

**Cannareccione** *Acrocephalus arundinaceus* (Linnaeus, 1758)

0427 m Mirano (VE), 11.06.1933

**Canapino maggiore** *Hippolais icterina* (Vieillot, 1817)

426 f Thiene (VI), 25.10.1954; 428 f Lucca, 07.09.1937

**Capinera** *Sylvia atricapilla* (Linnaeus, 1758)

92 m Treviso, 06.01.1929; 384 m San Polo di Piave (TV), 15.12.1937; 385 f San Polo di Piave (TV), 15.12.1937; 815 m San Polo di Piave (TV), 18.09.1958; 816 f San Polo di Piave (TV), 18.09.1958

Es. 92 albino.

**Beccafico** *Sylvia borin* (Boddaert, 1783)

383 m San Polo di Piave (TV), 06.09.1938

**Bigia padovana** *Sylvia nisoria* (Bechstein, 1792)

309 m Portogruaro (VE), 04.05.1934

**Bigiarella** *Sylvia curruca* (Linnaeus, 1758)

307 m Portogruaro (VE), 26.04.1939; 308 f Portogruaro (VE), 25.05.1956

**Sterpazzola** *Sylvia communis* Latham, 1787

303 m San Polo di Piave (TV), 25.09.1938; 304 m Portogruaro (VE), 02.09.1956; 305 m Portogruaro (VE), 19.05.1956; 306 m Mirano (VE), 26.04.1939

**Sterpazzola della Sardegna** *Sylvia conspicillata* Temminck, 1820

0302 m Lanusei (OG), 20.09.1931; 0892 m Cagliari, 15.04.1958

**Magnanina comune** *Sylvia undata* (Boddaert, 1783)

298 m Lucca 16.04.1935

**Magnanina sarda** *Sylvia sarda* Temminck, 1820

296 m Arzana (OG), 05.09.1939; 297 m Lucca, 18.04.1934

**Sterpazzolina comune** *Sylvia cantillans* (Pallas, 1764)

299 m Paternò (CT), 16.04.1931; 300 f Randazzo (CT), 04.04.1956; 301 f Catania, 14.04.1956

Es. riconducibili alla forma nominotipica.

**Occhiocotto** *Sylvia melanocephala* (J. F. Gmelin, 1789)

369 f Palermo, 26.12.1950; 370 f Paternò (CT), 06.02.1930; 371 m Ustica (PA), 02.05.1950; 372 m Paternò (CT), 02.02.1930

**Lui bianco** *Phylloscopus bonelli* (Vieillot, 1819)

442 m Vallada Agordina (BL), 12.08.1953

**Lui verde** *Phylloscopus sibilatrix* (Bechstein, 1793)

443 m San Polo di Piave (TV), 20.04.1939; 783 m San Polo di Piave (TV), 10.06.1958

Es. 783 precedentemente classificato come *P. collybita* (Vieillot, 1817)

**Lui piccolo** *Phylloscopus collybita* (Vieillot, 1817)

439 m San Polo di Piave (TV), 10.03.1939

**Lui grosso** *Phylloscopus trochilus* (Linnaeus, 1758)

441m Mirano (VE), 05.04.1939; 440 m San Polo di Piave (TV), 10.03.1931

Es. 441 precedentemente classificato come *P. bonelli* (Vieillot, 1819); es. 440 precedentemente classificato come *P. collybita* (Vieillot, 1817).

**Regolo** *Regulus regulus* (Linnaeus, 1758)

435 m San Polo di Piave (TV), 12.12.1938; 436 f San Polo di Piave (TV), 11.01.1939

**Fiorrancino** *Regulus ignicapillus* (Temminck, 1820)  
437 f Mirano (VE), 13.10.1932

Muscicapidae

**Pigliamosche** *Muscicapa striata* (Pallas, 1764)  
373 m San Polo di Piave (TV), 01.05.1939; 374 m San Polo di Piave (TV), 10.04.1956

**Pigliamosche pettirosso** *Ficedula parva* (Bechstein, 1792)  
375 m San Fior di Sotto, San Fior (TV), 00.10.1947; 376 m Vazzola (TV), 24.09.1957;  
000 es. Cimavilla, Codognè (TV), 11.09.1959  
Es. 375 raccolto da Felice De Beni, citato in GIOL (1957a); es. 376 raccolto da Adriano Boccardini, preparato da Cirillo Zanchetta, citato in GIOL (1958b) e in MOLTONI (1958b); es. 000 citato in GIOL (1960a). In Veneto irregolare durante i movimenti migratori (FRACASSO *et al.*, 2011).

**Pigliamosche mugimaki** *Ficedula mugimaki* (Temminck, 1835)  
813 f San Vendemiano (TV), 20.10.1957  
Es. catturato da Federico Huster presso Fossamerlo di San Vendemiano, determinato da R. W. Sims del British Museum of Natural History di Londra (GIOL, 1959a); cattura citata in COVA (1969) e in TOSCHI (1969). La segnalazione di questa specie nidificante in Siberia orientale e Cina nord-orientale e svernante in Asia sudorientale fino alle Filippine e all'Indonesia, non è stata convalidata dalla Commissione Ornitologica Italiana (cfr. BACCETTI *et al.*, 2014), al contrario di una più recente, riferita ad 1 m Passo della Berga (BS), 06.10.2011 (R. Barezani in JANNI & FRACASSO, 2013). Sebbene la cattura della collezione Giol sia stata attribuita a specie esotica importata (BRICHETTI, 2002), altre osservazioni effettuate in Europa e in Nord America suggerirebbero di reconsiderarne la validità (cfr. FRACASSO, 2012).

**Balia dal collare** *Ficedula albicollis* (Temminck, 1815)  
377 m Portogruaro (VE), 15.05.1955  
Es. segnalato in FAVERO (1956).

**Balia nera** *Ficedula hypoleuca* (Pallas, 1764)  
378 m San Polo di Piave (TV), 08.10.1937; 379 f San Polo di Piave (TV), 10.04.1957;  
884 f Portogruaro (VE), 28.03.1958; 885 f Portogruaro (VE), 14.04.1952  
Es. 885 precedentemente determinato come Balia dal collare *Ficedula albicollis* (Temminck, 1815).

Timaliidae

**Basettino** *Panurus biarmicus* (Linnaeus, 1758)  
446 m Legnago (VR), 25.10.1938; 447 m Caorle (VE), 11.01.1956; 448 f Mestre (VE), 17.03.1945

Aegithalidae

**Codibugnolo** *Aegithalos caudatus* (Linnaeus, 1758)  
458 m San Polo di Piave (TV), 12.11.1937; 459 m Portogruaro (VE), 04.03.1950; 460 f San Polo di Piave (TV), 10.10.1938; 461 f Portogruaro (VE), 08.02.1953  
Es. 459, 460 e 461 attribuiti a *Ae. c. caudatus* (Linnaeus, 1758); es. 459 citato in FAVERO (1951b). Attribuzione sottospecifica delle popolazioni nidificanti nell'Italia settentrionale da definire (BRICHETTI & FRACASSO, 2011).

Paridae

**Cinciarella** *Cyanistes caeruleus* (Linnaeus, 1758)  
453 m San Polo di Piave (TV), 09.12.1936; 454 f San Polo di Piave (TV), 05.12.1936

**Cinciallegra** *Parus major* Linnaeus, 1758

91 m Salzano (VE), 20.10.1930; 449 m San Polo di Piave (TV), 18.04.1937; 450 m Portogruaro (VE), 03.02.1952

Es. 91 isabellino.

**Cincia dal ciuffo** *Lophophanes cristatus* (Linnaeus, 1758)

451 m Vallada Agordina (BL), 24.12.1951

Manca l'es. 452 f San Vito di Cadore (BL), 18.10.1938, presente nel catalogo manoscritto.

**Cincia mora** *Periparus ater* (Linnaeus, 1758)

456 f San Polo di Piave (TV), 14.10.1941; 457 m Vallada Agordina (BL), 24.12.1951

**Cincia alpestre** *Poecile montanus* (Conrad, 1826)

455 m San Polo di Piave (TV), 18.04.1937

Es. precedentemente determinato come Cincia bigia *Poecile palustris* (Linnaeus, 1758). Rinvenimenti al di fuori dell'ambiente alpino erano finora noti per tutte le aree pianiziali dell'Italia settentrionale ma non per la Pianura Veneta (cfr. BRICHETTI & FRACASSO, 2011).

Sittidae

**Picchio muratore** *Sitta europaea* Linnaeus, 1758

323 m Mirano (VE), 06.03.1937; 324 m Mirano (VE), 08.11.1936

Svernante poco comune nella pianura veneziana (cfr. BON *et al.*, 2014).

Tichodromadidae

**Picchio muraiolo** *Tichodroma muraria* (Linnaeus, 1766)

322 m Mirano (VE), 16.10.1932

Es. 322 segnalato in FAVERO (1934a). Specie presente al di fuori dell'areale riproduttivo alpino come svernante nei centri storici del Veneto (cfr. BRICHETTI & FRACASSO, 2011).

Certhiidae

**Rampichino alpestre** *Certhia familiaris* Linnaeus, 1758

264 m Pieve di Cadore (BL), 08.11.1950; 265 m Pieve di Cadore (BL), 18.10.1938; 268 m San Polo di Piave (TV), 11.10.1951; 269 m San Polo di Piave (TV), 11.10.1951

Ess. 268 e 269 precedentemente determinati come *C. brachydactyla* C. L. Brehm, 1820. Numerose osservazioni nell'inverno 2011 sono state registrate per la bassa Pianura Veneta orientale (SIGHELE *et al.*, 2012). Evidenze di comparse in pianura anche nel passato sono fornite dalla cattura di 1 m nelle risaie di Bagnolo, Lonigo (VI) il 23.10.1890 (GIANESE, 1891).

**Rampichino comune** *Certhia brachydactyla* C. L. Brehm, 1820

266 f Portogruaro (VE), 01.02.1953

Manca l'es. 267, in catalogo come m San Polo di Piave (TV) del 06.10.1950. Lo status della specie presente nella Pianura Veneta durante gli erratismi autunnali ed invernali, va riconsiderato alla luce delle recenti osservazioni di individui appartenenti a *C. familiaris* (cfr. BON *et al.*, 2014).

Remizidae

**Pendolino** *Remiz pendulinus* (Linnaeus, 1758)

444 m Fornaci<sup>25</sup> presso Mirano (VE), 17.03.1941; 445 m San Giuliano, Mestre (VE), 26.02.1936

<sup>25</sup> Toponimo probabilmente riferibile alla località "Fornase", ma appartenente al confinante territorio di Spinea (VE).

Es 444 citato in FAVERO (1941); l'es. 445 è citato in FAVERO (1936b) come proveniente dai canneti prossimi alla Laguna di Venezia.

#### Oriolidae

**Rigogolo** *Oriolus oriolus* (Linnaeus, 1758)

**146** m San Polo di Piave (TV), 06.06.1936; **799** m juv. San Polo di Piave (TV), 15.06.1958; **800** m San Polo di Piave (TV), 15.06.1958

#### Laniidae

**Averla piccola** *Lanius collurio* Linnaeus, 1758

**245** m San Polo di Piave (TV), 16.04.1938; **246** f San Polo di Piave (TV), 16.04.1938;

**Averla cenerina** *Lanius minor* J. F. Gmelin, 1788

**248** f Mirano (VE), 27.08.1933; **249** m Conegliano (TV), 20.10.1940

**Averla maggiore** *Lanius excubitor* Linnaeus, 1758

**250** m Treviso, 12.12.1936; **251** f San Polo di Piave (TV), 20.12.1939; **252** f Vicenza, 12.01.1955

**Averla capirossa** *Lanius senator* Linnaeus, 1758

**247** m Mirano (VE), 20.05.1932; **793** m San Polo di Piave (TV), 00.06.1957

La data di cattura dell'es. 793 è un possibile indizio di nidificazione in zona: attualmente questa averla è localmente estinta come nidificante (MEZZAVILLA & BETTIOL, 2007).

#### Corvidae

**Ghiandaia** *Garrulus glandarius* Linnaeus, 1758

**136** m San Polo di Piave (TV), 08.08.1937; **137** m Macomer (NU) 05.02.1950; **138** f Macomer (NU), 25.04.1935

Ess. 137 e 138 attribuiti a *G. g. ichnusae* Kleinschmidt, 1903.

**Gazza** *Pica pica* (Linnaeus, 1758)

**135** m San Polo di Piave (TV), 08.11.1937; **820** m Pasiano di Pordenone (PN), 14.12.1957

**Nocciolaia** *Nucifraga caryocatactes* (Linnaeus, 1758)

**139** m Alleghe (BL), 18.11.1937; **140** m Alleghe (BL) 18.02.1936

Es. appartenenti a *N. c. caryocatactes* (Linnaeus, 1758).

**Gracchio alpino** *Pyrrhocorax graculus* (Linnaeus, 1766)

**132** m Alleghe (BL), 14.12.1935; **839** f Alleghe (BL), 10.12.1957

**Gracchio corallino** *Pyrrhocorax pyrrhocorax* (Linnaeus, 1758)

**133** f Palermo, 21.05.1950; **838** m Valdieri (CN), 08.11.1957

**Taccola** *Corvus monedula* (Linnaeus, 1758)

**134** m San Canziano d'Isonzo (GO), 10.11.1936; **871**f Ragusa, 02.03.1956; **872** m San Vito al Tagliamento (PN), 01.02.1958

Es. attribuiti a *C. m. spermologus* Vieillot, 1817; es. 872 mancante della mandibola superiore.

**Corvo comune** *Corvus frugilegus* Linnaeus, 1758

**129** m Mirano (VE), 20.02.1955

Nel Veneziano, diversamente dal passato, questo corvide è ora un migratore ed uno svernante presente in scarso numero (BON *et al.*, 2014).

**Cornacchia nera x Cornacchia grigia**

**821** m Thiene (VI), 20.10.1956

Es. precedentemente determinato come ibrido tra *C. frugilegus* Linnaeus, 1758 e *C. cornix* Linnaeus, 1758.

**Cornacchia nera** *Corvus corone* Linnaeus, 1758  
130 m San Vito di Cadore (BL), 08.10.1950

**Cornacchia grigia** *Corvus cornix* Linnaeus, 1758  
131 m Gorizia, 06.11.1939; 846 f Portogruaro (VE), 25.10.1950

**Corvo imperiale** *Corvus corax* Linnaeus, 1758  
127 m Monti Urzulei (OG), 18.03.1929; 128 m Lanusei (OG), 01.11.1954  
Es. determinati come *C. c. sardus* Kleinschmidt, 1903, forma ora messa in sinonimia con *C. c. hispanus* E.J.O Hartert & Kleinschmidt, 1901 (cfr. BRICHETTI & FRACASSO, 2011).

#### Sturnidae

**Sturno** *Sturnus vulgaris* Linnaeus, 1758  
82 m Fusina, Mestre (VE), 06.01.1935; 83 f San Polo di Piave (TV), 23.02.1936; 141 f San Polo di Piave (TV), 10.09.1937; 0142 m San Polo di Piave (TV), 08.09.1937  
Es. 82 albino; es. 83 isabellino.

**Sturno nero** *Sturnus unicolor* Temminck, 1820  
143 m Macomer (NU), 02.02.1935

**Sturno roseo** *Sturnus roseus* (Linnaeus, 1758)  
144 m Zianigo di Mirano (VE), 05.06.1937; 145 m Zianigo di Mirano (VE), 07.06.1937; 806 f Thiene (VI), 31.05.1957  
Es. 144 preso da un gruppo di circa 30 ind. (FAVERO, 1937a); es. 145 preso assieme ad altri 3 ind. da un gruppo di cinque (FAVERO, l. c.); entrambi gli es., citati in MOLTONI (1969), furono catturati durante un'annata invasiva (BRICHETTI & FRACASSO, 2013). Un m ad. preso da Zuccon a Riva di Motta di Livenza (TV) il 05.06.1960, documentato da GIOL (1961b) cfr. MOLTONI (l. c.), è presente nella collezione ma non nel catalogo manoscritto.

#### Passeridae

**Passera europea** *Passer domesticus* (Linnaeus, 1758)  
94 f Conegliano (TV), 16.03.1954; 95 m Mirano (VE), 04.02.1941; 96 m Mirano (VE), 16.12.1953; 97 m San Polo di Piave (TV), 15.10.1940; 467 f San Polo di Piave (TV), 05.11.1937; 0468 f Torre di Fine, Eraclea (VE), 10.10.1957; 469 m San Polo di Piave (TV), 08.11.1937; 470 m Portogruaro (VE), 04.09.1938; 786 m Tolmezzo (UD), 03.05.1937; 787 m Tolmezzo (UD), 07.11.1957; 788 f Paularo (UD), 15.05.1957  
Es. 94 melanico, raccolto da Della Barba; es. 95 parzialmente albino; es. 96 isabellino; es. 97 albino. Ess. 94, 95, 96, 97, 467, 468, 469, 470 originariamente determinati come *P. i. italiae* (Veillot, 1817); es. 786, 787, 788 come *P. d. domesticus* (Linnaeus, 1758).

**Passera sarda** *Passer hispaniolensis* (Temminck, 1820)  
465 m Nuoro, 20.04.1931; 466 f Nuoro, 06.01.1953

**Passera mattugia** *Passer montanus* (Linnaeus, 1758)  
98 f Mirano (VE), 24.08.1936; 99 m Santa Maria di Sala (VE), 27.01.1936; 100 f Portogruaro (VE), 02.10.1956; 101 m Portogruaro (VE), 22.12.1956; 471 m San Polo di Piave (TV), 14.04.1939; 472 m Tezze di Piave, Vazzola (TV), 15.11.1957.  
Es. 98 isabellino; es. 99, 100, 101 parzialmente isabellini.

**Passera lagia** *Petronia petronia* (Linnaeus, 1766)  
462 m Palermo, 07.10.1954; 463 m Palermo, 19.10.1954; 464 m Palermo, 19.10.1954; 881 m Lanusei (OG), 14.02.1958; 882 f Lanusei (OG), 14.02.1958  
Es. 881 e 882 originariamente attribuiti a *P. p. hellmayri* Arrigoni degli Oddi, 1902, ora messa in sinonimia con la forma nominotipica (BRICHETTI & FRACASSO, 2013).

**Fringuello alpino** *Montifringilla nivalis* (Linnaeus, 1766)  
284 m Val Venosta (BZ), 15.12.1952; 285 f Alleghe (BL), 24.10.1935

Fringillidae

**Fringuello** *Fringilla coelebs* Linnaeus, 1758

86 f Portogruaro (VE), 20.11.1938; 87 f Murano (VE), 09.09.1939; 88 m Cimetta, Codognè (TV), 15.04.1957; 113 f Cansiglio (TV), 20.12.1957; 286 m San Polo di Piave (TV), 14.09.1936

Es. 86 parzialmente albino; es. 87 parzialmente isabellino; es. 88 affetto da eritrismo; es. 113 isabellino.

**Peppola** *Fringilla montifringilla* Linnaeus, 1758

90 m Fregona (TV), 11.12.1956; 104 f Cimetta, Codognè (TV), 02.12.1957; 287 m San polo di Piave (TV), 25.09.1936; 288 m Cansiglio (TV), 02.12.1937 ; 289 m Cappella Maggiore (TV), 07.11.1956; 290 f Cimetta, Codognè (TV), 11.11.1957

Es. 90 parzialmente albino citato in GIOL (1957a); es. 104 parzialmente albino.

**Fringuello x Peppola**

784 m Portogruaro (VE), 15.12.1953; 801 f Rai, San Polo di Piave (TV), 11.10.1958

Es. 801 citato in GIOL (1959b), raccolto da Francesco Celotto, gestore del "paretaio Giol".

**Verzellino** *Serinus serinus* (Linnaeus, 1766)

312 f Palermo, 06.09.1937; 313 m Palermo, 22.11.1954; 314 f San Polo di Piave (TV), 15.03.1931; 811 f San Polo di Piave (TV), 14.11.1958

**Verdone** *Carduelis chloris* (Linnaeus, 1758)

89 m San Polo di Piave (TV), 18.10.1938; 280 f San Polo di Piave (TV), 24.12.1938; 281 m San Polo di Piave (TV), 06.01.1939

Es. 89 isabellino.

**Cardellino** *Carduelis carduelis* (Linnaeus, 1758)

279 m San Polo di Piave (TV), 09.09.1937

**Venturone alpino** *Carduelis citrinella* (Pallas, 1764)

282 m Thiene (VI), 02.11.1952; 283 m pendici del Cansiglio (TV), 14.11.1957; 812 m pendici del Cansiglio (TV), 20.10.1958

Es. 282 citato in FAVERO (1953a) preso con altri 2 ess., uno in coll. Favero; es. 812 citato in GIOL (1959b). In Veneto specie occasionalmente osservata durante i movimenti migratori (cfr. BRICHETTI & FRACASSO, 2013); indizi di nidificazione possibile sulle Alpi bellunesi furono forniti da MEZZAVILLA (1989).

**Lucherino** *Carduelis spinus* (Linnaeus, 1758)

311 f San Polo di Piave (TV), 25.05.1954; 312 m San Polo di Piave (TV), 21.10.1939; 890 f Maniago (PN), 04.06.1950

Es. 890 albino.

**Fanello** *Carduelis cannabina* (Linnaeus, 1758)

276 m Portogruaro (VE), 16.10.1954; 277 f Portogruaro (VE), 16.10.1954; 278 m Mirano (VE), 17.10.1938

**Fanello nordico** *Carduelis flavirostris* (Linnaeus, 1758)

000 m Grave di Vidor (TV), 19.11.1959

Es. documentato in GIOL (1960b); discusso in FANTIN (1975). Specie accidentale per il Veneto e l'Italia (cfr. FRACASSO *et al.*, 2011).

**Organetto** *Carduelis flammea* (Linnaeus, 1758)

270 f Alleghe (BL), 20.09.1938; 271 m Portogruaro (VE), 28.05.1952; 272 m Treviso, 08.10.1934; 273 m San Vendemiano (TV), 01.11.1957; 274 m Cansiglio (TV), 19.12.1957; 275 m Cansiglio (TV), 08.10.1934.

Tutti gli es. attribuiti a *C. f. cabaret* (P.L. Stadius Müller, 1776).

**Crociere fasciato** *Loxia leucoptera* J.F. Gmelin, 1789

244 f Asiago (VI), 21.12.1956

L'es. 244 citato in FAVERO (1957a) faceva parte di una dozzina di individui provenienti dalla zona di Thiene (VI), sulla determinazione complessiva dei quali Favero stesso si era in seguito ricreduto (FAVERO, 1961); questa e le poche altre segnalazioni della specie in Veneto sono riassunte in BRICHETTI & FRACASSO (2013). Inoltre, CATULLO (1829) citava 1 ind. osservato in Cadore da A. Doglioni (cfr. CATULLO, 1838) che SALVADORI (1872) riteneva essere la prima segnalazione di questo crociere per l'Italia; ancora in Cadore fu catturato un altro ind. nel 1846 (FULCIS, 1871); commentando questi dati MARCUZZI (1956) segnalava una comparsa invasiva nel 1943 seguita da nidificazione, che BRICHETTI & FRACASSO (l. c.) ritengono inattendibile. Dal Veronese provenivano 1 es. catturato nel settembre 1853 (E. H. Giglioli in GARBINI, 1904), conservato nella collezione dei Padri Barnabiti di Lodi (GARBINI, l. c.) e 1 es. da Ceraino, Dolcé (VR) del dicembre 1869 (E. De Betta in GARBINI, 1904).

**Crociere** *Loxia curvirostra* Linnaeus, 1758

237 f Pieve di Cadore (BL), 06.10.1933; 238 f Vittorio Veneto (TV), 10.11.1956; 239 m Cansiglio, Fregona (TV), 11.11.1956; 240 m Pieve di Cadore (BL), 06.10.1933; 241 m Santa Maria di Sala (VE), 06.10.1935; 242 m Asiago (VI), 31.10.1956; 243 m Cansiglio, Fregona (TV), 11.12.1956; 897 f Asiago (VI), 17.10.1956

Ess. 241, 242, 243, precedentemente determinati come *L. leucoptera* J.F. Gmelin, 1789; l'esemplare 242 faceva parte dei 12 es. presi nelle uccellande della zona di Thiene (VI), tra il 21.10.1956 e il 21.12.1956 (FAVERO, 1957); es. 243 citato in GIOL (1957a) e MOLTONI (1957). Es. 897 parzialmente albino. Es. 238, 239, 241, 242, 243, 897, catturati durante gli anni degli erratismi riportati da BRICHETTI & FRACASSO (2013).

**Ciuffolotto scarlatto** *Capodarcus erythrinus* (Pallas, 1760)

814 f Thiene (VI), 02.10.1952

Specie irregolare per il Veneto (cfr. FRACASSO *et al.*, 2011).

**Ciuffolotto** *Pyrrhula pyrrhula* (Linnaeus, 1758)

291 m Vittorio Veneto (TV), 06.11.1956; 292 f Vittorio Veneto (TV), 08.12.1956; 293 m San Polo di Piave (TV), 01.12.1937; 294 f San Polo di Piave (TV), 01.12.1937; 295 f Portogruaro (VE), 18.11.1949

**Frosone** *Coccothraustes coccothraustes* (Linnaeus, 1758)

84 f Salzano (VE), 16.08.1936; 85 f Viareggio (LU), 16.08.1936; 235 m San Polo di Piave (TV), 09.11.1937; 236 f San Polo di Piave (TV), 09.11.1937; 803 m Pendici del Cansiglio (TV), 01.12.1958

Ess. 84 albino; es. 803 parzialmente albino

Emberizidae

**Zigolo della Lapponia** *Calcarius lapponicus* (Linnaeus, 1758)

361 m San Polo di Piave (TV), 23.10.1956; 362 m San Polo di Piave (TV), 23.10.1956; 363 m San Polo di Piave (TV), 25.10.1956; 364 m San Polo di Piave (TV), 25.10.1956; 365 f Thiene (VI), 00.11.1951; 366 f San Polo di Piave (TV), 24.10.1956; 367 m San Polo di Piave (TV), 03.11.1956; 368 m Torre di Fine, Eraclea (VE), 22.11.1957; 791 f San Polo di Piave (TV), 18.10.1958

Ess. 361, 362, 363, 364 e 366 citati in GIOL (1957a); es. 365 citato in FAVERO (1952), catturato con altri 4 ess. da Marzaro; ess. 364 e 365 raccolti da Dacomo e Bonotto. In Veneto migratore scarso ed irregolare (FRACASSO *et al.*, 2011).

**Zigolo delle nevi** *Plectrophenax nivalis* (Linnaeus, 1758)

331 m San Michele al Tagliamento (VE), 08.12.1954; 332 m San Michele al Tagliamento (VE), 04.12.1954; 333 m Mirano (VE), 11.12.1933; 334 f Mirano (VE), 11.12.1933; 789 f Fontigo<sup>26</sup>, Sernaglia della Battaglia (TV), 06.11.1958; 780 m Pendici del Cansiglio (TV), 01.12.1958

<sup>26</sup> Nel catalogo il luogo di cattura è indicato con l'inesistente "Fontanego di Sernaglia".

L'es. 333 corrisponde certamente all'ind. catturato a Murano (VE) nella stessa data ma indicato come preso a Mirano (VE) in seguito ad un refuso tipografico (cfr. FAVERO, 1934b) ripreso anche in MOLTONI (1934). Specie nel Veneziano localmente svernante in scarso numero (BON *et al.*, 2014).

**Zigolo golarossa** *Emberiza leucocephalos* S. G. Gmelin, 1771

342 m Sernaglia della Battaglia (TV), 21.11.1956; 343 m Altipiano di Asiago (VI), 19.01.1940; 344 m Cansiglio (TV), 21.12.1957; 345 m San Vito al Tagliamento (PN), 18.11.1950; 346 m Thiene (VI), 23.01.1941; 792 f Fontigo<sup>27</sup>, Sernaglia della Battaglia (TV), 07.11.1958

Es. 342 citato in GIOL (1957a); es. 343 citato in FAVERO (1942a); es. 345 citato in FAVERO (1952) preso con altri 2 mm, 1 in coll. Favero, 1 in coll. Golfetto (cfr. MOLTONI, 1951).

**Zigolo giallo** *Emberiza citrinella* Linnaeus, 1758

337 m Alleghe (BL), 12.02.1933; 338 f Vittorio Veneto (TV), 08.11.1957

**Zigolo nero** *Emberiza cirrus* Linnaeus 1766

339 m Paternò (CT), 06.11.1931; 340 m Lanusei (OG), 23.04.1937; 341 m pendici Cansiglio (TV), 30.11.1957

**Zigolo muciatto** *Emberiza cia* Linnaeus, 1766

347 m Breonio, Fumane (VR), 07.11.1935; 348 f Pescantina (VR), 12.11.1935; 349 m Cappella Maggiore (TV), 15-10-1947; 350 m Vittorio Veneto (TV), 16.10.1956; 351 f San Polo di Piave (TV), 12.10.1956

**Ortolano** *Emberiza hortulana* Linnaeus, 1758

0352 m Mirano (VE), 28.04.1954

**Zigolo boschereccio** *Emberiza rustica* Pallas, 1776

355 m Thiene (VI), 30.12.1954

Es. citato in FAVERO (1955b); specie accidentale per il Veneto (cfr. FRACASSO *et al.*, 2011).

**Zigolo minore** *Emberiza pusilla* Pallas, 1776

353 m Rai, San Polo di Piave (TV), 10.11.1956; 354 m Thiene (VI), 23.10.1955

es. 353 citato in GIOL (1957a); specie irregolare per il Veneto (cfr. FRACASSO *et al.*, 2011).

**Migliarino di palude** *Emberiza schoeniclus* (Linnaeus, 1758)

356 m Portogruaro (VE), 04.04.1939; 357 f Valle Dogà, Venezia, 06.04.1959; 358 f San Donà di Piave (VE), 05.10.1938; 359 f Treporti, Cavallino Treporti (VE), 06.11.1957; 360 f San Polo di Piave (VE), 08.11.1957; 887 f Caorle (VE), 30.05.1956; 888 m Caorle (VE), 13.05.1953

**Zigolo capinero** *Emberiza melanocephala* Scopoli, 1769

335 m Vicenza, 15.08.1910; 336 m Navacchio, Cascina (PI), 15.05.1953

Accidentale per il Veneto (cfr. FRACASSO *et al.*, 2011); nidificazioni furono segnalate nel Veronese, maggio 1855 (Perini in GARBINI, 1904) e Parona di Valpolicella, maggio 1887 (Arrigoni degli Oddi in GARBINI, 1904). In Toscana migratore raro e nidificante molto localizzato (TELLINI FOLERENZANO *et al.*, 1997).

**Strillozzo** *Emberiza calandra* Linnaeus, 1758

410 m Mirano (VE), 20.10.1933

### *Discussione e conclusioni*

Dall'esame dell'occorrenza dei diversi ordini sistematici (Tab.1), emerge la prevalenza dei Passeriformi (379 es.), seguiti da Caradriformi (139 es.) e Anseriformi (87 es.), ovvero degli ordini di maggiore interesse venatorio. In anni prossimi

<sup>27</sup> Vedi nota precedente.

alla realizzazione della collezione, TOSCHI (1933) documentava nel Veneto l'esistenza di 587 impianti di aucupio, con una densità di 2,3 siti di cattura/100 kmq (in Italia la maggiore dopo la Lombardia); in particolare, la provincia di Vicenza registrava la massima densità italiana con 9,7 siti di cattura/100 kmq (TOSCHI, l. c.). Americo Giol fu egli stesso proprietario dell'impianto di cattura alla Torre di Rai di San Polo di Piave, dismesso intorno agli anni Sessanta del secolo scorso (INNOCENTE, 2002). Anche la grande estensione delle zone umide costiere del Veneto ha favorito l'esercizio venatorio rivolto a molte specie svernanti o migratrici; in anni coevi all'ingresso in collezione di molti esemplari, l'abbattimento annuale nell'area costiera alto adriatica consisteva di alcune decine di migliaia di capi tra Anseriformi e Caradriformi (cfr. MONTANARI, 1948). Considerazioni legate prevalentemente all'interesse venatorio spiegano la presenza di diversi Galliformi (39 ess.) ma non quella di molti Falconiformi (73 ess.) i quali, oltre che abbattuti casualmente, furono, evidentemente, oggetto di ricerche mirate alla loro acquisizione in tempi in cui la cattura era ancora consentita o tollerata.

Ordini	n° es.	%
Passeriformes	381	42,5
Charadriiformes	151	16,8
Anseriformes	87,0	9,7
Galliformes	36	4,0
Gruiformes	29	3,2
Ciconiiformes	28	3,1
Falconiformes	73	8,1
Strigiformes	20	2,2
Piciformes	16	1,8
Podicipediformes	14	1,6
Pelicaniformes	12	1,3
Procellariiformes	10	1,1
Columbiformes	9	1,0
Coraciiformes	9	1,0
Gaviformes	6	0,7
Cuculiformes	5	0,6
Apodiformes	5	0,6
Phoenicopteriformes	2	0,2
Pteroclidiformes	2	0,2
Caprimulgiformes	2	0,2
totale	897	100,0

1

Per quanto riguarda l'origine geografica (Fig. 1), il Veneto con 654 esemplari è il più rappresentato, ma è consistente la quantità, 228 es., proveniente da altre regioni italiane, prevalentemente, da Toscana, Sardegna e Sicilia (Tab. 2).

Un confronto con le note ornitologiche di Leandro Favero, relative anche alla sua collezione, e con i cataloghi delle raccolte di Gino Fortunato Panont (ZANETTI, 1997) e di Giuseppe Perale (BIASIOLO & BON, 2005) allestite nella stessa area geografica e negli stessi anni, evidenzia anche nella collezione Giol la ricerca attiva di specie "rare" o di esemplari "anomali": una pratica che caratterizzò molto collezionismo venatorio ed amatoriale dell'epoca; improntata ad un spirito di


	n° es.	%
Toscana	53	23
Sardegna	48	21
Sicilia	43	19
Friuli	35	15
Puglia	11	5
Trentino	11	5
Liguria	10	4
Lombardia	6	3
Piemonte	5	2
Lazio	4	2
Emilia Romagna	2	1
	228	100

2

Tab. 1. Consistenza della collezione.


Tab. 2. Esemplari provenienti da altre Regioni Italiane.

Fig. 1. Provenienza degli esemplari in collezione.



pura documentazione naturalistica è invece la collezione di Giacomo Bisacco Palazzi (BON *et al.*, 1993) di poco antecedente. Da altre nazioni provengono 15 esemplari che, con l'eccezione di Pavoncella codabinaca *Vanellus leucurus* e di Serratte *Syrnhaptes paradoxus* acquistate nel mercato di Padova e di Tordo dorato *Zootera dauma*, ottenuta da Dal Nero, di probabile provenienza asiatica, sono tutte riferibili all'Europa. All'interno del Veneto (Fig. 2), Venezia e Treviso, sono le province da cui proviene il maggior numero di esemplari, seguite da Belluno e Vicenza entrambe con la stessa quantità: queste province nell'insieme corrispondono all'area geografica di maggiore attività di ricerca e cattura.

Fig. 2. Provenienza degli esemplari raccolti nel Veneto.



Un'ulteriore analisi (Fig. 3) mette in luce come la maggior parte degli esemplari collezionati in questo comparto geografico, provenga dal luogo natale di A. Giol, San Polo di Piave, con 158, dalla Laguna di Venezia, 98 (dei quali 36 catturati solo in Valle Dogà), da Portogruaro e vicine paludi, con 95, da Caorle e laguna, con 90. Cansiglio e alta pianura trevigiana orientale, dove erano installati molti impianti di cattura (cfr. INNOCENTE, 2002), contano nell'insieme 47 esemplari; un caso a parte, eccentrico rispetto all'area indicata, è costituito da Mirano (VE), cittadina nella quale Leandro Favero risiedette per una parte della sua vita (FANTIN, 1970) e da cui provengono 31 esemplari frutto di acquisti da quest'ultimo.





Fig. 3. Provenienza della maggior parte degli esemplari raccolti in provincia di Venezia e Treviso.

Gli esemplari della collezione risalenti ai primi due decenni del Novecento ammontano a poche unità, mentre si registra un ingresso regolare tra il 1929 e il 1941, con picchi tra gli anni 1935 e 1939, per poi drasticamente diminuire negli anni Quaranta e poi riprendere ancora negli anni Cinquanta, con picchi nel 1950 e tra il 1955 e il 1958 (Fig. 4). Eventi ignoti hanno limitato la ricerca, e l'acquisto presso altri collezionisti e tassidermisti, in alcuni periodi e, soprattutto, durante gli anni del conflitto bellico, nei quali erano probabilmente in vigore restrizioni dell'esercizio venatorio. Il collezionismo ornitologico privato sembra prendere vigore proprio negli anni seguenti la denuncia di ARRIGONI DEGLI ODDI (1929) riguardante il declino della ricerca ornitologica negli istituti museali e universitari; gli articoli e le note brevi, comparse tra gli anni Trenta e Sessanta nella Rivista Italiana di Ornitologia, nelle quali si segnalavano specie accidentali o poco comuni, testimoniano della diffusione di questo interesse. Alcuni di questi scritti furono le fonti d'informazione che stimolarono l'acquisto degli esemplari in collezione, di cui danno testimonianza le numerose ricevute rilasciate da L. Favero ad A. Giol - conservate in allegato agli estratti dei lavori di L. Favero pubblicati nella Rivista Italiana di Ornitologia - tra cui quella per

Fig. 4. Frequenza delle raccolte dai i primi del novecento fino alla fine degli anni cinquanta.



la cessione del primo individuo preso in Italia di Tortora dal collare *Streptopelia decaocto* (Fig. 5) e quella relativa alla prima cattura italiana di Spioncello del Pacifico *Anthus rubescens* (Fig. 6); gli esemplari complessivamente ceduti da L. Favero ad A. Giol assommano a 91, il 10% circa del totale della collezione. Alcuni criteri di selezione possono aver condizionato la scelta degli esemplari collezionati; oltre alla presunta rarità, la variabilità degli abiti rivestita nelle diverse classi d'età, il sesso, nelle specie con accentuato dimorfismo, o l'attrattiva suscitata da anomalie nel piumaggio (cfr. REPETTO, 1973) o da teratologie (cfr. MOLTONI, 1949), all'epoca particolarmente ricercate. La raccolta Giol conta 52 esemplari caratterizzati da particolarità fenotipiche e da teratologie e 3 ibridi, per circa il 6% dell'intera collezione. Per quanto riguarda la *sex-ratio* - attendibile, poiché tutti gli individui furono sessati all'atto della preparazione da parte di tassidermisti esperti - il maggior numero di maschi presenti con 565 esemplari, rispetto alle femmine con 326, è probabilmente determinato dalla consistente presenza di Passeriformi e Anseriformi che annoverano quasi tutte specie a spiccato dimorfismo e che complessivamente costituiscono poco più della metà degli individui dell'intera raccolta.

Le catture più controverse conservate nella collezione, relative a specie accidentali nel Palearctico note con l'unica segnalazione, per quanto riguarda la Berta di Jouanin *Bulweria fallax* e, probabilmente, con la prima per quanto riguarda il Pigliamosche mugimaki *Ficedula mugimaki*, furono ben documentate, essendo disponibile anche la descrizione dei modi in cui avvenne la cattura (GIOL, 1957b; GIOL, 1959a). I pochi esemplari mancanti o smarriti sono indicati nei commenti; in particolare, 1 m di venturone corso *Carduelis corsicana* (Koenig, 1899) preso a Campolongo di Conegliano (TV) il 18.10.1959, segnalato in GIOL (1960c) come *C. citrinella corsicana* (Koenig, 1899), raccolto da Da Dalt<sup>28</sup>, man-

<sup>28</sup> Nel palchetto che accoglie i venturoni della collezione, è collocato un fringillide di non facile determinazione, forse un ibrido: il cartellino, senza località e data di cattura, che riporta solo la dicitura "Lucherino", potrebbe riferirsi all'individuo oggetto di quest'insolita segnalazione. Il presunto *C. corsicana*, rinvenuto quand'era già in cattività, e ufficialmente dichiarato come proveniente da un paretai, si mostrava confidente (GIOL, 1960c): quest'ultimo particolare suggerisce l'eventualità di una cattura sospetta sulla quale lo stesso Giol potrebbe essersi ricreduto.

D I C H I A R A Z I O N E

Io sottoscritto dichiaro di aver ceduto al Sig. AMERICO GIOL di San Polo di Piave la

191

TORTORA dal COLLARE ORIENTALE (*Streptopelia decaocto decaocto*; Frivaldszky) catturata nell'aia del Palazzo patronale della Tenuta Brussa di Caorle la mattina del 8 Novembre 1944. e pubblicata dal Prof. Edgardo Moltoni nella Rivista Italiana di Ornitologia Anno XVII serie II<sup>o</sup> pag. 64+ 67.

In fede

*L. Favero*  
1<sup>a</sup> Cattura Italiana. —

PORTOGRUARO... 10. ott. 1956...

Dott. EDGARDO MOLTONI

Uccisione di una Tortora dal collare orientale - *Streptopelia decaocto decaocto* (Frivaldszky) - in quel di Caorle (Venezia)

Nell'ottobre 1946 il sig. Leandro Favero, residente a Portogruaro, mi mandò in esame un esemplare montato di Tortora a Lui sconosciuto, che era stato ucciso nell'aia del Palazzo patronale della Tenuta Brussa di Caorle la mattina dell'8 novembre 1944.

191

Detta Tortora era scesa affamata a beccare i chicchi di grano rimasti colà giacchè precedentemente sull'aia erano stati distesi ad asciugare dei cereali. Mentre era intenta a cibarsi fu uccisa dal proprietario della Tenuta, sig. Pietro Lovati, che la poté avvicinare con facilità.

Per combinazione il giorno seguente l'uccisione capitò a Caorle il sig. Favero a cui fu mostrata, ed avendola Egli riconosciuta per un individuo di Tortora diverso dalla solita specie se lo fece dare e lo preparò per la sua Collezione privata, ove ora si conserva, quantunque sia stato un po' sciupato dalla fucilata.

Si tratta di un individuo adulto di Tortora dal collare orientale — *Streptopelia decaocto decaocto* (Frivaldszky) — il quale non presenta alcun segno di subita schiavitù, per cui si può supporre non sia un soggetto fuggito da qualche allevamento.

La *Streptopelia decaocto decaocto* (Friv.) abita l'Europa sud-orientale, l'Asia Minore, il Turkestan, la Cina settentrionale ed il Giappone e si estende alla Siberia, l'Est Russia, l'India

Fig. 5. Copia della ricevuta rilasciata da L. Favero ad A. Giol per la cessione del primo individuo di Tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*) catturato in Italia.

D i c h i a r a z i o n e

Io sottoscritto dichiaro di aver ceduto al Sig. Americo Giol da S. Polo di Piave, lo SPIONCELLO AMERICANO - *Anthus spinoletta rubescens* (Tunstall) catturato nei pressi di Thiene (Vicenza) il 13 Novembre 1951 e determinato dal Prof. Edgardo Moltoni Direttore del Museo Civico di Milano come risulta dalla sua pubblicazione nella Rivista Italiana di Ornitologia anno XXII<sup>o</sup> serie II pag. 59 e 61.-

389

IN FEDE


Portogruaro li,  
18 aprile 1957.-

*L. Favero*

EDGARDO MOLTONI

Prima cattura accertata per l'Italia di Spioncello americano - *Anthus spinoletta rubescens* (Tunstall) -

Il sig. Leandro Favero, noto collezionista di Portogruaro e possessore di una ricca Collezione di uccelli italiani, mi mandò i primi giorni dello scorso gennaio uno Spioncello con caratteri



389

Fig. 1 — Lo Spioncello americano ucciso nei pressi di Thiene il 13-XI-1951.

Fig. 6. Copia della ricevuta rilasciata da L. Favero ad A. Giol per la cessione del primo individuo di Spioncello del Pacifico (*Anthus rubescens*) catturato in Italia.

ca sia dalla collezione, sia dal catalogo. Per il Veneto e l'Italia settentrionale costituirebbe un rinvenimento del tutto inusuale; infatti, le poche segnalazioni continentali note interessano la Toscana costiera ed il crinale appenninico tosco-emiliano (TELLINI FLORENZANO *et al.*, 1997).

L'interesse della collezione è principalmente dovuto alla registrazione esauriente di tutti gli individui catturati; infatti, la corretta documentazione di specie accidentali, localmente poco comuni, estinte o recentemente insediatesi, fornisce preziose informazioni, la cui interpretazione consente una comprensione di fenomeni biologici quali i movimenti migratori, i cambiamenti di status e di areale (BRICHETTI, 202); inoltre, molti degli esemplari collezionati offrono un'indiretta testimonianza delle trasformazioni ambientali avvenute nel territorio del Veneto orientale e nella prospiciente area costiera, in un periodo storico cruciale, nel quale furono realizzate bonifiche e decisive trasformazioni del paesaggio agrario planiziale e montano.

### *Ringraziamenti*

Giancarlo Fracasso (Arcugnano, VI) e Luca Sattin (Mira, VE) la cui cortese disponibilità ha consentito un esame più accurato di alcuni esemplari della collezione; Franco Gurian (Martellago, VE), David Marin (Caorle, VE), Roberto Palma (Venezia), Enrico Romanazzi (Trevignano, TV), Adriano Valeri (Vicenza) per informazioni e contributi.

### *Bibliografia*

- AA.VV. (1977) – Atlante internazionale del Touring Club Italiano. Ristampa aggiornata dell'VIII edizione. Touring Club Italiano, Milano.
- AA.VV. (1985) – Carta delle vocazioni faunistiche del Veneto. Regione Veneto, Venezia.
- ANONIMO (2008) – Dizionario dei comuni delle circoscrizioni amministrative delle frazioni e delle località. Casa Editrice La Tribuna, Piacenza.
- ARCAMONE E. & BRICHETTI P., eds. (2001) – Nuovi avvistamenti. *Avocetta*, **29**: 305-317.
- ARRIGONI DEGLI ODDI E. (1894) – Materiali per la fauna padovana degli animali vertebrati, parte 2, Uccelli. *Atti Soc. Ital. Sci. Nat.*, **34**: 367-433.
- ARRIGONI DEGLI ODDI E. (1898) – Notes on some Specimens of Anatidae in the late Count Ninni's Collection. *Ibis*, **January 1898**: 67-74.
- ARRIGONI DEGLI ODDI E. (1899) – Note ornitologiche sulla provincia di Verona. *Atti Soc. Ital. Sci. Nat.*, **38**: 75-191.
- ARRIGONI DEGLI ODDI E. (1904) – Manuale di ornitologia italiana. Hoepli, Milano.
- ARRIGONI DEGLI ODDI E. (1929) – Ornitologia italiana. Hoepli, Milano.
- ASPES A., ed. (1999) – Musei naturalistici del Veneto. Electa, Milano.
- BAGHINO L., BORGIO E., BOTTERO M., GALLI L. & VALFIORITO R. (2012) – Check-list degli uccelli di Liguria. *Riv. ital. Orn.*, **81**: 15-42.
- BAGNI L., SIGHELE M., PASSARELLA M., PREMUDA G., TINARELLI R., COCCHI L. & LEONI G. (2003) - Check-list degli Uccelli dell'Emilia Romagna. *Picus*, **56**: 85-107.
- BACCETTI N., DALL'ANTONIA P., MAGAGNOLI P., MELEGA L., SERRA C., SOLDATINI C. & ZENATELLO M. (2002) – Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia: distribuzione, stima e trend delle popolazioni nel 1991-2000. *Biol. Cons. Fauna*, **111**: 1-240.
- BACCETTI N., FRACASSO G., & GOTTI C. (2014) – La lista CISO-COI degli uccelli italiani – Parte seconda: le specie naturalizzate (cat. C) e le categorie “di servizio” (cat. D, E, X). *Avocetta*, **38**: 1-21.
- BARBAGLI F. & VIOLANI C. (2002) – Cento brevi biografie di ornitologi italiani. In BRICHETTI P. & GARIBOLDI L.A., Manuale di Ornitologia, Calderini, Bologna, **3**: 307-330.

- BIASIOLO M. & BON M. (2005) - Catalogo della collezione ornitologica Giuseppe Perale conservata al Museo civico di Storia Naturale di Venezia. *Boll. Mus. Civ. St. nat. Venezia*, **56**: 165-185.
- BISACCO PALAZZI G. (1935) – Contributo all'avifauna veneta. *Boll. Soc. ven. Sci. Nat.*, **1**: 157-166.
- BOANO G. & PULCHER C. (2003) – Check-list degli Uccelli di Piemonte e Val d'Aosta aggiornata al dicembre 2000. *Boll. Mus. reg. Sci. nat. Torino*, **20**: 177-230.
- BON M., RICHARD J. & SEMENZATO M. (1993) - La collezione di Vertebrati di Giacomo Bisacco Palazzi come testimonianza delle trasformazioni dell'ambiente planiziaro e costiero veneto. *Lavori Soc. ven. Sc. nat., Venezia*, **18**: 133-171.
- BON M. & SCARTON F. (2012) – Lo svernamento degli uccelli acquatici in provincia di Venezia (1993-2012). Provincia di Venezia – Assessorato alla Caccia, Venezia.
- BON M., SCARTON F., STIVAL E., SATTIN L. & SGORLON G., eds., (2014) – Nuovo Atlante degli Uccelli nidificanti e svernanti in provincia di Venezia. Associazione Faunisti Veneti, Museo di Storia Naturale di Venezia, Venezia.
- BON M. SEMENZATO M., SCARTON F., FRACASSO G. & MEZZAVILLA F. (2004) - Atlante faunistico provinciale. Provincia di Venezia, Associazione Faunisti Veneti - Assessorato Caccia, Pesca, Polizia Provin., Venezia.
- BON M. SEMENZATO M., FRACASSO G. & MARCONATO E. (2008) – Sintesi delle conoscenze sui vertebrati alloctoni del Veneto. *Boll. Mus. civ. Stor. nat. Venezia*, suppl. vol. **58**: 37-64.
- BON M., SIGHELE M. & VERZA E. (2005) - Rapporto ornitologico per per la regione Veneto 2004. *Boll. Mus. Stor. Nat. Venezia*, **56**: 187-211.
- BON M., SIGHELE M. & VERZA E. (2008) - Rapporto ornitologico per la regione Veneto 2007. *Boll. Mus. Stor. Nat. Venezia*, **59**: 129-150.
- BONFIO A. (1962) - Catturata in Italia una nuova forma di Spioncello: *Anthus spinoletta japonicus*. *Riv. ital. Orn.*, **32**: 51-54.
- BOZZO M. (2005) – I luoghi della scienza. Guida ai musei e alle raccolte scientifiche italiane. Di Renzo Editore, Roma.
- BRICHETTI P. (1974) – Segnalazioni inedite di specie attualmente conservate nella mia collezione con brevi considerazioni sulle stesse. *Riv. ital. Orn.*, **44**: 74-78.
- BRICHETTI P. (1982) – Uccelli del bresciano. Guida ornitologica dell'avifauna bresciana. Amm. Provinciale di Brescia – Ass. Agricoltura, Caccia e Pesca, Brescia.
- BRICHETTI P. (2002) – Gli uccelli di comparsa accidentale in Italia: Passeriformes. Aggiornamento Dicembre 1999. In Brichetti P. & Gariboldi A. L., Manuale di ornitologia, Edagricole, Bologna: 203-232.
- BRICHETTI P. & FRACASSO G. (2003) – Ornitologia italiana. 1 Gaviidae – Falconidae. Alberto Perdisa Editore, Bologna.
- BRICHETTI P. & FRACASSO G. (2004) – Ornitologia italiana. 2 Tetraonidae – Scolopacidae. Alberto Perdisa Editore, Bologna.
- BRICHETTI P. & FRACASSO G. (2006) – Ornitologia italiana. 3 Stercorariidae – Caprimulgidae. Alberto Perdisa Editore, Bologna.
- BRICHETTI P. & FRACASSO G. (2007) – Ornitologia italiana. 4 Apodidae – Prunellidae. Alberto Perdisa Editore, Bologna.
- BRICHETTI P. & FRACASSO G. (2008) – Ornitologia italiana. 5 Turdidae – Cisticolidae. Alberto Perdisa Editore, Bologna.
- BRICHETTI P. & FRACASSO G. (2010) – Ornitologia italiana. 6 Sylviidae – Paradoxornithidae. Alberto Perdisa Editore, Bologna.
- BRICHETTI P. & FRACASSO G. (2011) – Ornitologia italiana. 7 Paridae – Corvidae. Alberto Perdisa Editore, Bologna.
- BRICHETTI P. & FRACASSO G. (2013) – Ornitologia italiana. 8 Sturnidae – Fringillidae. Alberto Perdisa Editore, Bologna.
- CATERINI F. (1952) - Numerose nuove catture dell'Uccello delle tempeste a coda forcuta - *Oceanodroma leucorhoa leucorhoa* (Vieillot) - in Toscana. *Riv. Ital. Orn.*, **22**: 62-68.

- CATULLO T.A. (1829) – Sulla “*Loxia bifasciata*”. *Giornale di Treviso*, **17**: 186.
- CATULLO T. A. (1838) – Animali del Canale di S. Croce, cui si aggiungono quelli che si reputano i più speziosi delle alpi bellunesi. In Catullo T. A., Trattato sopra le costituzione Geognostica-fisica dei terreni alluviali e post-diluviali delle Provincie Venete. Cartallier e Sicca, Padova: 150-198.
- CICOGNA A. E. (1847) - Saggio di bibliografia veneziana. Merlo, Venezia.
- CONTARINI N.<sup>29</sup> (1847) – Ornitologia. Prospetto degli uccelli finora osservati nelle venete provincie, con alcune notizie sopra la loro comparsa, permanenza, e partenza, se nidificano o no, se sieno stazionari o rari, e qualche cenno sui loro costumi. In “Venezia e le sue lagune”, Antonelli, Venezia, **2**: 157-259.
- COVA C. (1969) – Atlante degli Uccelli italiani. Hoepli, Milano.
- CRAMP S. & SIMMONS K.E. L., eds. (1977) - Handbook of the Birds of Europe, the Middle East, and North Africa: The Birds of the Western Palearctic, vol.1, Ostrich-Ducks, The Royal Society for the Protection of Birds, Oxford University Press, Oxford.
- CUCCO M., LEVI L., MAFFEI G. & PULCHER C. (1996) – Atlante degli uccelli di Piemonte e Valle d’Aosta in inverno (1986-1992). *Monografie Mus. Reg. Sci. Nat. Torino*, **19**: 1-395.
- DAL FIUME C. (1896) – Contributo allo studio dell’avifauna del Polesine. Elenco delle specie d’uccelli osservate coi nomi volgari locali e colle notizie sulla frequenza. *Atti Soc. Ven.-Trent. Sci. Nat.*, **3**: 3-40.
- DI CARLO E. A. (1973) - Aspetti della migrazione degli Uccelli attraverso il ponte delle isole circumsiciliane. *Lav. Soc. Ital. Biogeogr.*, **3**: 815-852.
- FANTIN G. (1970) – Ricordo di Leandro Favero. *Riv. ital. Orn.*, **40**: 75-76.
- FANTIN G. (1975) – Il Fanello nordico (*Carduelis flavirostris*). *Riv. ital. Orn.*, **45**: 241-251.
- FAVERO L. (1933a) - Della Poiana calzata. *Riv. ital. Orn.*, **3**: 185.
- FAVERO L. (1933b) - La cattura di un Corriente biondo. *Riv. ital. Orn.*, **3**: 186.
- FAVERO L. (1934a) - *Tichodroma muraria* (L.).- *Riv. ital. Orn.*, **4**: 43.
- FAVERO L. (1934b) - *Plectrophenax nivalis nivalis*. *Riv. ital. Orn.*, **4**: 83-84.
- FAVERO L. (1934c) - Passi eccezionali. *Riv. ital. Orn.*, **4**: 84-86.
- FAVERO L. (1935a) - Del genere *Circus*; *Recurvirostra a. avosetta* L. *Riv. ital. Orn.*, **5**: 55-56.
- FAVERO L. (1935b) - *Netta rufina* Pall. *Riv. ital. Orn.*, Milano, **5**: 56.
- FAVERO L. (1935c) - *Ciconia c. ciconia* L. *Riv. ital. Orn.*, **5**: 56-57.
- FAVERO L. (1935d) – *Phalacrocorax pygmaeus* L. *Riv. ital. Orn.*, **5**: 230-231.
- FAVERO L. (1936) - *Cuculus canorus canorus* L. *Riv. ital. Orn.*, **6**: 39-40.
- FAVERO L. (1937a) – *Pastor roseus*. *Riv. ital. Orn.*, **7**: 296-297.
- FAVERO L. (1937b) – Sull’Aquila del Bonelli. *Riv. ital. Orn.*, **7**: 298.
- FAVERO L. (1938a) - Osservazioni ornitologiche. *Riv. ital. Orn.*, **8**: 43-44.
- FAVERO L. (1938b) - La Poiana dalla coda bianca. *Riv. ital. Orn.*, **8**: 148-151.
- FAVERO L. (1939) - Catture rare. *Riv. ital. Orn.*, **9**: 113-115.
- FAVERO L. (1940) - Osservazioni Ornitologiche in Provincia di Venezia. *Riv. ital. Orn.*, **10**: 59-62.
- FAVERO L. (1941) - Avifauna veneta. *Riv. ital. Orn.*, **11**: 80-82.
- FAVERO L. (1942a) - Avifauna veneta. *Riv. ital. Orn.*, **12**: 30-31.
- FAVERO L. (1942b) - Comparsa dell’Aquila Imperiale in Italia. *Riv. ital. Orn.*, **12**: 62-63.
- FAVERO L. (1943a) - Note Ornitologiche. *Riv. ital. Orn.*, **13**: 58-60.
- FAVERO L. (1943b) - Considerazioni su alcune catture importanti. *Riv. ital. Orn.*, **13**: 115-118.
- FAVERO L. (1943c) - Notizie su alcune catture. *Riv. ital. Orn.*, **13**: 121-122.
- FAVERO L. (1948a) - Osservazioni ornitologiche. *Riv. ital. Orn.*, **18**: 94-95.

<sup>29</sup> Benché si tratti di un’opera anonima è assegnata a questo autore sulla scorta delle attribuzioni fatte prima da CICOGNA (1847) e poi da ARRIGONI DEGLI ODDI (1929).

- FAVERO L. (1949b) - Osservazioni ornitologiche in Prov. di Venezia. *Riv. ital. Orn.*, **19**: 172-174.
- FAVERO L. (1950a) - Notizie Ornitologiche. *Riv. ital. Orn.*, **20**: 70-71.
- FAVERO L. (1950b) - Notizie ornitologiche. *Riv. ital. Orn.*, **20**: 84-88.
- FAVERO L. (1951) - Brevi note dal Veneto. *Riv. ital. Orn.*, **21**: 79-80.
- FAVERO L. (1952) - Notizie ornitologiche. *Riv. ital. Orn.*, **22**: 35-39.
- FAVERO L. (1953a) - Civetta capogrosso. *Riv. ital. Orn.*, **23**: 80-81.
- FAVERO L. (1954) - Notizie ornitologiche. *Riv. ital. Orn.*, **24**: 137-140.
- FAVERO L. (1955a) - Notizie ornitologiche. *Riv. ital. Orn.*, **25**: 77-78.
- FAVERO L. (1955b) - Note di ornitologia. *Riv. ital. Orn.*, **25**: 204-206.
- FAVERO L. (1956) - Notizie ornitologiche anno 1955. *Riv. ital. Orn.*, **26**: 189-191.
- FAVERO L. (1957) - Notizie ornitologiche. *Riv. ital. Orn.*, **27**: 163-167.
- FAVERO L. (1959) - I Pellicani sono comparsi ancora in Italia. *Riv. ital. Orn.*, **29**: 52-53.
- FAVERO L. (1961) - Sulla cattura di un Crociere dalle fascie rosse (*Loxia rubrifasciata*, Brehm). *Riv. ital. Orn.*, **31**: 121-122.
- FAVERO L. (1962) - Americo Giol. *Riv. ital. Orn.*, Milano, **32**: 75.
- FOSCHI U. F., BULGARINI F., CIGNINI B., LIPPERI M., MELLETTI M., PIZZARI T. & VISENTIN M. (1996) - Catalogo della collezione ornitologica "Arrigoni degli Oddi" del Museo Civico di Zoologia di Roma. *Ric. Biol. Selvaggina*, **97**: 1-311.
- FRACASSO G. (2012) - Photographs of Mugimaki Flycatcher collected at Treviso, Italy, in October 1957. *Dutch Birding*, **34**: 109-110.
- FRACASSO G., MEZZAVILLA F. & SCARTON F. (2011) - Check-list degli uccelli del Veneto (maggio 2010). In Bon M., Mezzavilla F. & Scarton F., eds., Atti 6° Convegno Faunisti Veneti. *Boll. Mus. Civ. St. Nat. Venezia*, suppl. vol. **61**: 103-117.
- FRACASSO G., BACCETTI N., & SERRA L. (2009) - La lista CISO-COI degli Uccelli italiani - Parte prima: liste A, B e C. *Avocetta*, **33**: 5-24.
- FULCIS A. (1871) - Catalogo della raccolta zoologica di Angelo Nob. Doglioni. Tip. Naz. F. Avessago, Belluno.
- GARBINI A. (1904) - Aves. In Sormani Moretti L., ed., Monografia della Provincia di Verona. Tip. Franchini, Verona: 27-51<sup>30</sup>.
- GENERO F. (1992) - Grifone *Gyps fulvus* (Hablizl, 1783). In Brichetti P., De Franceschi P. & Baccetti N., eds., Fauna d'Italia. XXIX. Aves. I, Gaviidae-Phasianidae. Edizioni Calderini, Bologna: 494-514
- GIANESE M., (1891) - Notizie di caccia e note ornitologiche. *Boll. Natur.*, **11**: 18-20.
- GIOL A. (1957a) - Note ornitologiche. *Riv. ital. Orn.*, **27**: 116-118.
- GIOL A. (1957b) - Cattura di *Bulweria fallax*, Jouanin. *Riv. ital. Orn.*, **27**: 118-121.
- GIOL A. (1958a) - Cattura di un Pigliamosche pettirosso - *Muscicapa parva* Bech. - in provincia di Treviso. *Riv. ital. Orn.*, **28**: 231.
- GIOL A. (1958b) - Note ornitologiche. *Riv. ital. Orn.*, **28**: 234-235.
- GIOL A. (1958c) - Importante passo di Beccofrusoni nel Veneto. *Riv. ital. Orn.*, **28**: 235-237.
- GIOL A. (1959a) - Cattura di *Muscicapa mugimaki* Temminck nella provincia di Treviso. *Riv. ital. Orn.*, **29**: 11-13.
- GIOL A. (1959b) - Note ornitologiche. *Riv. ital. Orn.*, **29**: 50-52.
- GIOL A. (1960a) - Ancora sul Pigliamosche pettirosso. *Riv. ital. Orn.*, **30**: 93-94.
- GIOL A. (1960b) - Cattura di un Fanello nordico - *Carduelis f. flavirostris* (L.) - in provincia di Treviso. *Riv. ital. Orn.*, **30**: 158-161.
- GIOL A. (1960c) - Cattura di un Venturone meridionale *Carduelis citrinella corsicana* (Knig). *Riv. ital. Orn.*, **30**: 203.
- GIOL A. (1961a) - Cattura di un'Aquila anatraia minore *Aquila p. pomarina*, Brehm in provincia di Treviso. *Riv. ital. Orn.*, **31**: 1-6.

<sup>30</sup> Una singolare numerazione delle pagine di quest'opera contrassegna le pagine riguardanti i Vertebrati con lo stesso numero, il 368: ad esponente è posta una cifra progressiva che per gli Uccelli va da 27 a 51.

- GIOL A. (1961b) - Cattura di uno Storno roseo in provincia di Treviso. *Riv. ital. Orn.*, **31**: 38.
- INNOCENTE M. (2002) - Gli impianti di aucupio nella marca trevigiana. Ricerca storico ambientale. Provincia di Treviso – Assessorato alla Caccia., Treviso.
- JANNI O. & FRACASSO G. (2013) – Commissione Ornitologica Italiana (COI) – Report 25. *Avocetta*, **37**: 67-74.
- MASSA B., ed. (2008) – Atlante della Biodiversità della Sicilia: Vertebrati terrestri. Studi e Ricerche, Arpa Sicilia, **6**: 1-536.
- MARCUZZI G. (1956) – Fauna delle Dolomiti. *Mem. Ist. Veneto Sci. Lett. Arti*, **31**: 1-595.
- MARTORELLI G. (1931) – Gli uccelli d'Italia. Seconda edizione a cura di E. Moltoni e C. Vandoni. Rizzoli, Milano, 752 pp.
- MELLONE U. & SIGHELE M. (2007) - Resoconto Ornitologico Italiano – Anno 2007. *Avocetta*, **31**: 79-86.
- MEZZAVILLA F. (1989) – Atlante degli Uccelli nidificanti nelle province di Treviso e Belluno (Veneto), 1983-1988. Museo Civico di Storia e Scienze Naturali di Montebelluna, Montebelluna.
- MEZZAVILLA F. & BETTIOL K. (2007) – Nuovo Atlante degli Uccelli nidificanti in provincia di Treviso (2003-2006). Associazione Faunisti Veneti, Venezia.
- MEZZAVILLA F. & FRASSON L. (2014) – Su una civetta capogrosso, *Aegolius funereus*, rinvenuta in pianura. *Lavori Soc. Ven. Sci. Nat.*, **39**: 93-94.
- MEZZAVILLA F., STIVAL E., NARDO A. & ROCCAFORTE P. (1999) – Rapporto ornitologico veneto orientale. Anni 1991-1998. Centro Ornitologico Veneto Orientale, Montebelluna.
- MINGOZZI T. (1987) – Revisione critica delle segnalazioni italiane di Poiana codabianca (*Buteo rufinus* Cr.). Rapaci mediterranei. III. *Suppl. Ric. Biol. Selvaggina*, **12**: 155-167.
- MINGOZZI T. (1992) – Poiana codabianca *Buteo rufinus* (Cretzschmar, 1827). In Brichetti P., De Franceschi P. & Baccetti N., eds., Fauna d'Italia. XXIX. Aves. I, Gaviidae-Phasianidae. Edizioni Calderini, Bologna: 576-583.
- MOLTONI E. (1934) – Comparsa dello Zigolo della neve nell'autunno 1933-34 in Italia. *Riv. ital. Orn.*, **4**: 178-179.
- MOLTONI E. (1947) – Uccisione di una Tortora dal collare orientale - *Streptopelia decaocto decaocto* (Frivaldszky) in quel di Caorle (Venezia). *Riv. ital. Orn.*, **17**: 64-67.
- MOLTONI E. (1949) – Alaudidi ed altri uccelli a becco anomalo presi in Italia. *Riv. ital. Orn.*, **19**: 145-166.
- MOLTONI E. (1951) – Notizie su due specie di Zigoli (*Emberiza*) considerati rari per l'Italia. *Riv. ital. Orn.*, **21**: 45-51.
- MOLTONI E. (1952a) – Sugli uccelli delle tempeste codaforcuta, *Oceanodroma leucorhoa leucorhoa* (Vieillot), presi in Italia nel 1951. *Riv. Ital. Orn.*, **22**: 72-74.
- MOLTONI E. (1952b) – Prima cattura accertata per l'Italia di Spioncello americano *Anthus spinoletta rubescens* (Tunstall). *Riv. Ital. Orn.*, **22**: 59-61.
- MOLTONI E. (1955a) – Aggiornamento della lista delle Poiane codabianca *Buteo rufinus rufinus* (Cretzschmar) prese in Italia. *Riv. ital. Orn.*, **25**: 203-204.
- MOLTONI E. (1955b) – La Tortora dal collare orientale (*Streptopelia decaocto*) in Italia. Acta XI Congr. Int. Orn., Basel, pp. 504-505.
- MOLTONI E. (1956a) - Presenza dello Svasso collarosso - *Podiceps griseigena* (Bodd.) - nell'Estuario Veneto. *Riv. ital. Orn.*, **26**: 28-30.
- MOLTONI E. (1956b) - Il Gufo degli Urali - *Strix uralensis liturata*, Tengmalm - in Italia. *Riv. ital. Orn.*, **26**: 33-35.
- MOLTONI E. (1956c) - Il Corriente biondo, *Cursorius cursor cursor* (Latham) in Italia. *Riv. ital. Orn.*, **10**: 82-85.
- MOLTONI E. (1957a) – Notizie sul passo del Crociere – *Loxia curvirostra* – in Italia nel 1956-57. *Riv. ital. Orn.*, **27**: 121-124.
- MOLTONI E. (1957b) – Elenco degli Edredoni – *Somateria m. mollissima* (L.) – catturati in Italia. *Riv. ital. Orn.*, **27**: 154-157.

- MOLTONI E. (1958a) – La Rondine di mare maggiore – *Hydropogone caspia* (Pallas) – in Italia. *Riv. ital. Orn.*, **28**: 218-223.
- MOLTONI E. (1958b) – Le catture di Pigliamosche pettirosso in Italia. *Riv. ital. Orn.*, **28**: 232-233.
- MOLTONI E. (1961) – Altre Poiane codabianca – *Buteo rufinus rufinus* Cretzschmar - prese in Italia. *Riv. ital. Orn.*, **31**: 121.
- MOLTONI E. (1962) – Passo di Anatidi non comuni in Alta Italia nel novembre-dicembre 1961 e gennaio 1962. *Riv. ital. Orn.*, **32**: 285-289.
- MOLTONI E. (1969) – Lo Storno roseo - *Pastor roseus* (L.) - in Italia. *Riv. ital. Orn.*, **39**: 128-157.
- MOLTONI E., & BRICHETTI P. (1978) – Elenco degli Uccelli italiani. *Riv. ital. Orn.*, **48**: 65-142.
- MOLTONI E. & FRUGIS S., (1967) – Gli Uccelli delle Isole Eolie (Messina, Sicilia). *Riv. ital. Orn.*, **37**: 91-226.
- MONTANARI V. (1948) – La caccia e la pesca nelle acque interne delle Venezia. *Agricolt. Venezia*, **2**: 661-682.
- NARDO A. (2001) – Il Grillaio *Falco naumanni* e la Ghiandaia marina *Coracias garrulus* nel Veneto: nuovi avvistamenti e analisi delle segnalazioni note. *Picus*, **27**: 15-18.
- NINNI A. P. (1885) - Materiali per una fauna veneta. VI. Aves. *Atti Ist. Ven. Sc. Lett. Arti*, **6 (3)**: 607-639.
- NINNI A. P., (1888) – La “*Somateria spectabilis*” nel Veneziano. *Boll. Natur.*, **8**: 137.
- NINNI A. P. & TROIS E. F. (1881) - Uccelli. In Sormani-Moretti L., ed., La provincia di Venezia, monografia statistica economica amministrativa. Antonelli, Venezia: 106-109.
- NINNI E., (1900) - Note ornitologiche per la provincia di Venezia (Grallae et Palmipedes). *Atti Soc. ital. Sc. Nat.*, **39**: 155-170.
- NINNI E. (1904) – Sopra un esemplare di *Somateria spectabilis*, L. colta in laguna di Venezia. *Avicula*, **7**: 159-161.
- NINNI E., (1924) - La Collezione ornitologica G. Bisacco - Palazzi in Chirignago (Mestre). *Riv. ital. Orn.*, **6**: 22-26.
- NINNI E. (1938) - Gli uccelli delle lagune venete. *Atti Soc. Ital. Progr. Sci.*, **5**: 132-163.
- NORANTE N. (1980) - Il Corriente biondo, *Cursorius cursor cursor* (Latham). *Uccelli d'Italia*, **5**: 242-252.
- OLSON S. L. (1985) – The Italian specimen of *Bulweria fallax* (Procellariidae). *Bull. Brit. Orn. Cl.*, **105**: 55-62.
- ORLANDO C. (1958) – Nuove catture per la Sicilia di Pellicano (*Pelecanus onocrotalus* Linnaeus). *Riv. ital. Orn.*, **28**: 135-138.
- PARODI R. (2004) – Avifauna in provincia di Pordenone. Provincia di Pordenone, Pordenone.
- PARODI R. (2006) – Check-list degli Uccelli del Friuli Venezia Giulia. *Gortania. Atti Mus. Friul. St. Nat.*, **28**: 207-242.
- PAVIA M. & BOANO G. (2009) - Check-list degli Uccelli del Piemonte e della Valle d'Aosta aggiornata al dicembre 2008. *Riv. ital. Orn.*, **79**: 23-47.
- PEDRINI P, CALDONAZZI M. & ZANGHELLINI S. (2005) – Atlante degli uccelli nidificanti e svernanti in provincia di Trento. Museo Tridentino di Scienze Naturali, Trento.
- REPETTO L. (1973) - Soggetti albini-melanici-isabellini della Collezione Repetto. *Riv. ital. Orn.*, **43**: 489-491.
- RIELLO L. (1948) – Senza titolo. *Riv. ital. Orn.*, **18**:141.
- SALVADORI T. (1872) – Fauna d'Italia. Parte seconda. Uccelli. Vallardi, Milano.
- SEMENZATO M. (1987) - La cicogna bianca *Ciconia ciconia* (Linneo) nella Pianura Veneta centro-orientale (Provv. di Treviso, Venezia, Padova e Rovigo). *Lavori Soc. Ven. Sc. Nat.*, **12**: 61-70.
- SEMENZATO M., SARTORI A. & SATTIN L. (in stampa) - Segnalazioni di civetta nana *Glaucidium passerinum* (Linnaeus, 1758) nella Pianura Padana. *Lavori Soc. Ven. Sc. Nat.*, **40**.
- SEMENZATO M. & SCARTON F. (1998) – Interessanti reperti conservati nella collezione “Americo Giol” di Oderzo (TV). *Riv. ital. Orn.*, **68**: 189-192.

- SIGHELE M., BON M. & VERZA E. (2009) – Rapporto ornitologico per la regione Veneto 2008. *Boll. Mus. Stor. Nat. Venezia*, **60**: 143-168.
- SIGHELE M., BON M. & VERZA E. (2011) – Rapporto ornitologico per la regione Veneto 2010. *Boll. Mus. Stor. Nat. Venezia*, **62**: 181-218.
- SIGHELE M., BON M. & VERZA E. (2012) – Rapporto ornitologico per la regione Veneto 2011. *Boll. Mus. Stor. Nat. Venezia*, **63**: 135-171.
- SIGHELE M., BON M. & VERZA E. (2013) – Rapporto ornitologico per per la regione Veneto 2012. *Boll. Mus. Stor. Nat. Venezia*, **64**: 81-114.
- SPINA F. & VOLPONI S. (2008) - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), Roma.
- TELLINI FLORENZANO G., ARCAMONE E., BACCETTI N., MESCHINI E. & SPOSIMO P., eds. (1997) – Atlante degli uccelli nidificanti e svernanti in Toscana (1982-1992). *Monografie Quad. Mus. Stor. Nat. Livorno*, Livorno.
- TORMEN G. & DE COL S. (2008) – Rapaci diurni e notturni della provincia di Belluno. In Gruppo Natura Bellunese, 2° Convegno Aspetti Naturalistici della provincia di Belluno, Gruppo Natura Bellunese, Belluno: 183-217.
- TOSCHI A. (1933) - Sulla distribuzione delle uccellande in Italia. *Ricerche di zoologia applicata alla caccia*, Bologna, **7**: 1-32.
- TOSCHI A. (1953) – Cattura di un Gufo degli Urali (*Strix uralensis liturata* Tengmalm). *Riv. ital. Orn.*, **22**: 130-131.
- TOSCHI A. (1969) – Avifauna italiana. Editoriale Olimpia, Firenze.
- TOSO S. (1981) – Nuovi avvistamenti. *Avocetta*, **5**: 103-106.
- VARASCHIN M., ZENATELLO M. & VILLA M. (2011) – C'è ma non si vede? Il Picchio rosso minore *Dendrocopos minor* in Veneto. In BON M. MEZZAVILLE F. & SCARTON F., eds., Atti 6° Convegno Faunisti Veneti. *Boll. Mus. Civ. St. Nat. Venezia*, suppl. vol. **61**: 245-249.
- VERDUCCI D., BIONDI M., SIGHELE M. & NORANTE N. (2012) - Revisione degli avvistamenti e delle catture di corriere biondo *Cursorius cursor* in Italia con cenni sul suo status in Europa. *Uccelli d'Italia*, **37**: 16-32.
- ZANETTI M., ed. (1997) – Collezione ornitologica “Donazione Gino Fortunato Panont”. Biblioteca Comunale di S. Stino di Livenza - Comune di Santo Stino di Livenza, 23 pp.
- ZENATELLO M., BASSO S., RASI S., & TORMEN G. (1997) – Primo caso di nidificazione di Smergo maggiore, *Mergus serrator*, in Italia. *Riv. ital. Orn.*, **66**: 211-214.
- ZENATELLO M., TORMEN G. & DE FAVERI A. (1998) – Check-list degli Uccelli della provincia di Belluno. In Gruppo Natura Bellunese, Atti Convegno Aspetti Naturalistici della provincia di Belluno, Gruppo Natura Bellunese, Belluno: 327-339.
- ZONFRILLO B. (1988) – Notes and comments on the taxonomy of Jouanin's Petrel *Bulweria fallax* and Bulwer's Petrel *Bulweria bulwerii*. *Bull. Bri. Orn. Cl.*, **108**: 71-75.

