

Questo comportamento mi ha permesso di osservare per qualche istante la Rondine montana, e quindi riuscire ad identificarla.

La segnalazione riportata è, per quanto mi risulta, una delle pochissime note per la specie (se non l'unica) per la provincia di Venezia.

Boll. Cen. Orn. Veneto Or. 6: 35 (1995)

Rondine, *Hirundo rustica*, che si alimenta di un insetto adulto dell'ordine degli Odonati (Odonata, Anisoptera)

EMANUELE STIVAL

*Centro Orn. Veneto Or., Museo di Storia Naturale, Via Piave 51. I, 31044 Montebelluna
TV*

Il giorno 20/08/95 in una zona di campagna alberata a Gaggio di Marcon (VE) ho osservato un adulto di Rondine portare l'imbeccata a dei giovani da poco involati e posati su dei cavi aerei del telefono. Un giovane che aveva afferrato la preda, piuttosto voluminosa, dopo vari tentativi di ingerirla la perdeva e cadeva a terra. Ho potuto così avvicinarmi a controllare l'insolita imbeccata che si è rivelata essere un adulto di Odonato, sottordine Anisoptera.

L'insetto della lunghezza totale di circa 50 mm, e con addome rossastro sembrava all'esame un individuo della specie *Crocothemis erythraea* (cfr. PECILE 1984).

In Europa la Rondine è stata osservata alimentarsi di insetti appartenenti all'ordine degli Odonati, sottordine Zygoptera ("damsel flies") (CRAMP 1988); sembra quindi non siano noti in precedenza casi di predazione di insetti adulti del sottordine Anisoptera.

Bibliografia

CRAMP S. (ed.) 1988 - The Birds of the Western Palearctic. Vol. V. *Oxford University Press, Oxford.*

PECILE I. 1984 - Libellule. *Ed. Lorenzini, Udine.*