DISTINZIONE DELLE SOTTOSPECIE DI CODIBUGNOLO IN PIEMONTE

A cura di G.Boano

GPSO, 2012


In Italia sono segnalate quattro sottospecie (razze geografiche) di codibugnolo *Aegithalus caudatus*

- Codibugnolo testabianca Aegithalos caudatus caudatus Linnaeus, 1758. Type locality: Sweden. Non più conservato.
- Codibugnolo europeo *Aegithalos caudatus europaeus* Hermann, 1804. Type locality: Basel, Switzerland. Non più conservato
- Codibugnolo grigio Aegithalos caudatus italiae Jourdain, 1910. Type: male, Cremona, cons. nel British Museum cat. N. 1190
- Codibugnolo siciliano *Aegithalos caudatus siculus* Whitaker, 1901, Interiors of Sicily (Bosco di Ficuzza) 3-4.II.1901. Holotype: BMNH Reg.no.1939.12

Caratteri diagnostici

Codibugnolo testabianca Aegithalos caudatus caudatus

- Capo bianco puro nettamente demarcato dal nero della parte posteriore del collo e del mantello
- Parti inferiori quasi totalmente bianche, solo una minima sfumatura rosea ai fianchi
- Scapolari bianco puro (popolazioni orientali) o con una sfumatura rosea
- Ampi bordi bianchi a secondarie e terziarie



Jansen J.J.F.J. & Nap W. 2008 - Identification of White-headed Longtailed Bushtit and occurrence in the Netherlands. Dutch Birding 30: 293-308.

 $[http://www.dutchbirding.nl/\sim dbaftp/wietze/Pagina\%\,27s\%\,20van\%\,20DB\%\,2030\%\,285\%\,292008.pdf]$

Caratteri diagnostici

Codibugnolo europeo Aegithalos caudatus europaeus


- Ampie bande nere ai lati del capo
- Le bande nere proseguono senza soluzione di continuita nel mantello nero
- Parti inferiori biancastre con sfumatura rosa sul ventre, fianchi e sottocoda rosati
- Scapolari rosa scuro evidenti e contrastanti con il nero del dorso
- Copritrici auricolari appena macchiettate di bruno



Caratteri diagnostici

Codibugnolo grigio Aegithalos caudatus italiae

- Bande nere ai lati del capo meno nette, stria centrale spesso biancastra
- Mantello grigio. Le bande nere non proseguono nel mantello. Nella descrizione originale basata su un individuo di Cremona il dorso è definito "più chiaro e più ardesia della ssp. britannica, mentre la stria bianca mediana del capo è più stretta".
- Sfumatura rosato alle scapolari chiara e ridotta
- Copritrici auricolari macchiettate di bruno









Serie pelli MCCI – con e senza flash













PROPOSTA PER I BW PIEMONTESI

- In seguito a questa disamina si propone ai soci del GPSO e ai collaboratori della piattaforma "aves.piemonte" di indicare la sottospecie per tutte quelle osservazioni di codibugnolo effettuate in ottime condizioni di visibilità e con distinta visione del dorso. Pur essendo consapevoli che le determinazioni a livello sottospecifico vadano intese come "individuo con i caratteri della sottospecie Xy", questa indicazione potrebbe contribuire nel tempo ad una più chiara individuazione della distribuzione delle due forme.
- La foto successiva riassume più delle parole il concetto.

