

CENSIMENTO DEGLI UCCELLI ACQUATICI SVERNANTI IN PROVINCIA DI ROVIGO – ANNO 2025



riccardo f a è

A cura di:

Associazione Culturale Naturalistica Sagittaria

Sommario

| | |
|--------------------------------------------------|-----------|
| 1 - Introduzione, materiali e metodi..... | 3 |
| 2 - Risultati e discussione..... | 7 |
| Aspetti generali | 7 |
| Anseriformi | 11 |
| Rallidi e Gru | 19 |
| Podicipedidi e Strolaghe | 22 |
| Falacrococacidi..... | 23 |
| Ibis, Spatola, Ardeidi, Fenicottero | 25 |
| Caradriformi – Limicoli | 30 |
| Caradriformi – Laridi e Sternidi..... | 36 |
| Rapaci | 39 |
| 3 - Bibliografia e ringraziamenti..... | 40 |

1 - Introduzione, materiali e metodi

Come di consueto, l'Associazione Sagittaria ha svolto nel gennaio 2025 il censimento dell'Avifauna acquatica svernante presso tutte le zone umide della provincia di Rovigo, previsto secondo lo schema dei censimenti IWC (International Waterbird Census). Trattasi di un importante appuntamento in grado di coniugare una raccolta dati standardizzata ad ampio spettro, un'analisi dello stato di salute del territorio e un tradizionale meeting per tecnici e addetti ai lavori.

Per il gennaio 2025 l'Associazione Sagittaria ha svolto i censimenti in maniera del tutto volontaristica e senza alcun sostegno finanziario.

I metodi utilizzati per il censimento sono rimasti gli stessi:

- dati raccolti da censitori esperti coadiuvati da aiutanti (mediamente 2 o 3 persone per ogni gruppo), organizzati in squadre;
- dati raccolti mediante strumentazione ottica di precisione (cannocchiali e binocoli), sia da punti sopraelevati (ad es. torrette, casoni, argini), sia percorrendo tratti in auto, sia da natanti.

Il censimento è stato effettuato durante tre giornate ravvicinate, così suddivise:

- 13 gennaio 2025: Delta centro-settentrionale (a nord di Pila) e occidentale, comprendente soprattutto i complessi vallivi, le lagune e alcuni settori del Po.
- 14 gennaio 2025: Delta meridionale, caratterizzato dalle lagune, dai rami del Po e dalle piane di bonifica.
- 15 gennaio 2025: zone umide dell'interno.

Le condizioni meteoclimatiche sono state particolarmente favorevoli per quanto riguarda la visibilità, ma hanno creato diverse difficoltà logistiche alle squadre di rilevatori, a causa della presenza di un forte vento di bora. Tale situazione ha comunque generato in molte specie un effetto di maggiore aggregazione, rendendo paradossalmente più facile il loro conteggio. Nonostante le succitate condizioni climatiche, si ritiene che i dati siano stati raccolti in maniera completa e standardizzata.

Le aree monitorate sono state tutte le zone umide della provincia di Rovigo, come da elenco pregresso (Verza, 2006), ad esclusione di quelle indicate in tabella.

ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURALISTICA
SAGITTARIA



Tempistiche censimento di gennaio 2025.

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Adige, Begosso - Badia Pol. | RO0101 |
| Adige, Badia Pol. - Lusia | RO0102 |
| Adige, Lusia - Boara | RO0103 |
| Adige, Boara - Anguillara V. | RO0104 |
| Adige, Anguillara V. - Cavazzeri | RO0105 |
| Adige, Cavazzeri - Romea | RO0106 |
| Fiume Adige Romea-foce | RO0201 |
| Po di Levante | RO0215 |
| Lit. Po Levante - Po Maistra | RO0225 |
| Bonello di Ca' Zuliani | RO0235 |
| vasche Zucch. Contarina | RO0237 |
| Lit. Po Maistra - Po Pila | RO0239 |
| Po di Tolle, P. Cam. - foce | RO0243 |
| Busa del Bastimento | RO0244 |
| Lit. Po di Pila - Po di Tolle | RO0251 |
| Lit. Po di Tolle - Po di Goro | RO0252 |
| Vasche Zucc. Cavanella Po | RO0304 |
| Gorgo di Bergantino | RO0501 |
| Gorghetto di Giacciano con Baruc. | RO0502 |

Zone umide non censite.

ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURALISTICA
SAGITTARIA



Rilievi da terra presso le zone umide minori del Polesine occidentale.



Rilievi sugli scanni del Delta del Po.

ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURALISTICA
SAGITTARIA



Rilievi nelle Valli del Delta del Po.



Rilievi mediante natante alle foci del Po.



Rilievi nelle Valli del Delta del Po.

7

2 - Risultati e discussione


Aspetti generali

Nel gennaio 2025 sono stati censiti una quantità di uccelli acquatici in linea con l'anno precedente, anche se con una lieve flessione.

| Anno | Individui |
|------|-----------|
| 1997 | 60.845 |
| 1998 | 78.363 |
| 1999 | 70.297 |
| 2000 | 72.268 |
| 2001 | 93.446 |
| 2002 | 136.885 |
| 2003 | 135.271 |
| 2004 | 105.059 |
| 2005 | 125.769 |
| 2006 | 141.211 |

ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURALISTICA
SAGITTARIA


| | |
|------|---------|
| 2007 | 123.653 |
| 2008 | 163.257 |
| 2009 | 134.713 |
| 2010 | 141.733 |
| 2011 | 153.944 |
| 2012 | 127.505 |
| 2013 | 131.768 |
| 2014 | 151.011 |
| 2015 | 146.373 |
| 2016 | 181.932 |
| 2017 | 162.773 |
| 2018 | 193.692 |
| 2019 | 200.147 |
| 2020 | 110.337 |
| 2021 | 140.824 |
| 2022 | 100.484 |
| 2023 | 109.786 |
| 2024 | 140.939 |
| 2025 | 133.931 |



Le Valli da pesca e da caccia ospitano la maggior parte del contingente svernante provinciale, con oltre il 90% degli esemplari censiti.

ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURALISTICA
SAGITTARIA

| | Valli | Altre aree |
|------|-------|------------|
| 2019 | 92% | 8% |
| 2020 | 83% | 17% |
| 2021 | 86% | 14% |
| 2022 | 82% | 18% |
| 2023 | 80% | 20% |
| 2024 | 89% | 11% |
| 2025 | 91% | 9% |



9

I siti con la maggior parte di esemplari censiti sono, come di consueto, le Valli da pesca e da caccia. Tra i siti più importanti compare chiaramente anche il Sistema lagunare costiero di Scardovari.

| | | |
|---------------------|---------|--------|
| Valle Ripiego | RO0229 | 28.990 |
| Valle Ca' Zuliani | RO0234 | 20.535 |
| Valle Ca' Pasta | RO0223 | 13.044 |
| Valle S. Leonardo | RO0221 | 11.027 |
| Valle Ca' Pisani | RO0222 | 8.326 |
| Valle Bagliona | RO0216a | 7.339 |
| Valle Morosina | RO0205 | 5.409 |
| Valle Boccavecchia | RO0202 | 5.141 |
| Valle S. Carlo | RO0230 | 4.381 |
| Sacca di Scardovari | RO0247 | 4.269 |
| Valle Sacchetta | RO0217 | 3.484 |

N° individui censiti, gennaio 2025.

ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURALISTICA
SAGITTARIA

Per quanto riguarda le peculiarità prettamente ornitologiche, per il gennaio 2025 vanno sottolineati i seguenti aspetti:


- censite specie particolari per il periodo e rare, fra cui Moretta tabaccata (2), Casarca (1), Zafferano (1), Aquila anatraia maggiore (1), Corriere piccolo (2), Piovanello maggiore (6), Beccapesci (6);
- record di presenze dal 1997 per Canapiglia (2.968) e Fenicottero (8.081).

Anseriformi



Anatidi - censimenti di metà gennaio - provincia di Rovigo

11



Abbastanza positiva la situazione degli Anseriformi, che si attestano sulle 90.000 unità censite. Le specie più numerose, in ordine decrescente, sono risultate: Alzavola, Volpoca, Fischione e Germano reale.

L'Alzavola mostra una fase di relativa stabilizzazione negli ultimi inverni, con circa 20.000 esemplari presenti; la Volpoca, in lieve flessione complessiva; il Fischione nuovamente in calo numerico; il Germano reale con il miglior inverno degli ultimi 6 anni.

Anni di maggior presenza per la Canapiglia, con numero record censito dal 1997; anche il Mestolone con il miglior inverno degli ultimi 6 anni, mentre la Moretta con la terza migliore annata dal 1997.


ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURALISTICA
SAGITTARIA

Tra le specie particolari rilevata 1 Casarca e due esemplari di Moretta tabaccata. Sempre scarsi Codone e Oca selvatica. Assente l'Oca lombardella.

Si conferma la preponderante presenza di Anseriformi all'interno delle aree cacciabili delle Valli, situazione ben nota e consolidata.

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zone cacciabili | 73.935 | 145.343 | 128.629 | 64.449 | 96.998 | 53.694 | 62.423 | 89.224 | 80.684 |
| Oasi | 43.882 | 9.605 | 17.101 | 9.912 | 7.421 | 7.528 | 10.358 | 8.419 | 9.351 |


Anseriformi






Anseriformi nel Delta del Po, gennaio 2025.

Smergo minore - censimenti di metà gennaio - provincia di Rovigo




Volpoca - censimenti di metà gennaio - provincia di Rovigo




ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURALISTICA
SAGITTARIA


Cigno reale - censimenti di metà gennaio - provincia di Rovigo




Fischione - censimenti di metà gennaio - provincia di Rovigo



Germano reale - censimenti di metà gennaio - provincia di Rovigo




Alzavola - censimenti di metà gennaio - provincia di Rovigo




ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURALISTICA
SAGITTARIA

Canapiglia - censimenti di metà gennaio - provincia di Rovigo




Mestolone - censimenti di metà gennaio - provincia di Rovigo




ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURALISTICA
SAGITTARIA

Moretta - censimenti di metà gennaio - provincia di Rovigo



Moriglione - censimenti di metà gennaio - provincia di Rovigo



ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURALISTICA
SAGITTARIA

| | | | | | | | |
|-------|---------------|----------------------|--------------|-------|-------------------|----------------------|--------------|
| CYGOL | Cigno reale | Oasi | 71 | ANAPL | Germano reale | Oasi | 1753 |
| | | non Oasi | 967 | | | non Oasi | 13234 |
| | | Oasi+non Oasi | 1038 | | | Oasi+non Oasi | 14987 |
| ANSAN | Oca selvatica | Oasi | 22 | ANAAC | Codone | Oasi | 0 |
| | | non Oasi | 80 | | | non Oasi | 250 |
| | | Oasi+non Oasi | 102 | | | Oasi+non Oasi | 250 |
| TADFE | Casarca | Oasi | 0 | ANACL | Mestolone | Oasi | 14 |
| | | non Oasi | 1 | | | non Oasi | 7803 |
| | | Oasi+non Oasi | 1 | | | Oasi+non Oasi | 7817 |
| TADTA | Volpoca | Oasi | 5567 | AYTFF | Moriglione | Oasi | 832 |
| | | non Oasi | 17217 | | | non Oasi | 488 |
| | | Oasi+non Oasi | 22784 | | | Oasi+non Oasi | 1320 |
| ANAPE | Fischione | Oasi | 4 | AYTFU | Moretta | Oasi | 202 |
| | | non Oasi | 15230 | | | non Oasi | 400 |
| | | Oasi+non Oasi | 15234 | | | Oasi+non Oasi | 602 |
| ANAST | Canapiglia | Oasi | 10 | AYTNY | Moretta tabaccata | Oasi | 2 |
| | | non Oasi | 2958 | | | non Oasi | 0 |
| | | Oasi+non Oasi | 2968 | | | Oasi+non Oasi | 2 |
| ANACR | Alzavola | Oasi | 873 | MERSE | Smergo minore | Oasi | 1 |
| | | non Oasi | 22038 | | | non Oasi | 18 |
| | | Oasi+non Oasi | 22911 | | | Oasi+non Oasi | 19 |

Rallidi e Gru




Rallidi (J. Peruzzo).


ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURALISTICA
SAGITTARIA

Continua il trend positivo per la Folaga, con oltre 15.000 esemplari censiti. Porciglione e Gallinella d'acqua vengono censiti, come ben noto, in numeri non attendibili rispetto alla loro reale consistenza numerica. In fase di affermazione la Gru, oramai stabilmente presente. Viene censita in alimentazione nelle piane di bonifica della loc. Mea di Porto Viro e secondariamente anche nell'Isola della Donzella.

Folaga - censimenti di metà gennaio - provincia di Rovigo



Gru - censimenti di metà gennaio - provincia di Rovigo





Folaga nel Delta del Po, gennaio 2025.

| | | | |
|-------|---------------------------|----------------------|--------------|
| RALAQ | Porciglione | Oasi | 2 |
| | | non Oasi | 0 |
| | | Oasi+non Oasi | 2 |
| GALCH | Gallinella d'acqua | Oasi | 150 |
| | | non Oasi | 119 |
| | | Oasi+non Oasi | 269 |
| FULAT | Folaga | Oasi | 1117 |
| | | non Oasi | 14071 |
| | | Oasi+non Oasi | 15188 |
| GRUGR | Gru | Oasi | 150 |
| | | non Oasi | 9 |
| | | Oasi+non Oasi | 159 |

Podicipedidi e Strolaghe




©Vanni Bellettato

Svassi maggiori (V. Bellettato).

22

I Podicipedidi non accennano ad invertire il loro trend negativo, con il 2025 come secondo peggior anno di presenza numerica dal 1997.
Del tutto assenti le strolaghe.

Svassi - censimenti di metà gennaio - provincia di Rovigo



| | | | |
|-------|------------------------|----------------------|------------|
| TACRU | Tuffetto | Oasi | 78 |
| | | non Oasi | 46 |
| | | Oasi+non Oasi | 124 |
| PODCR | Svasso maggiore | Oasi | 60 |
| | | non Oasi | 221 |
| | | Oasi+non Oasi | 281 |
| PODNI | Svasso piccolo | Oasi | 71 |
| | | non Oasi | 305 |
| | | Oasi+non Oasi | 376 |

Falacrocoracidi



23

Jessica Peruzzo

Cormorano (J. Peruzzo).


Per quanto riguarda il Cormorano, quest'anno si registra una buona congruenza tra il numero censito in diurna e quello ai roost serali. La tabella seguente mostra i roost con presenza della specie.

Come per gli anni precedenti, non è stato possibile tracciare con sufficiente precisione la presenza serale del Marangone minore, i cui roost restano non noti o posizionati al di fuori della provincia di Rovigo.

Non sono stati censiti esemplari di Marangone dal ciuffo.

ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURALISTICA
SAGITTARIA

| <u>Roost WI 2025 Rovigo</u> | | Cormorano | Marangone minore |
|--------------------------------|-------------|------------|------------------|
| | | - | - |
| Po di Maistra (Oasi Valpisani) | 341 | | |
| Ca' Cornera (Golena Madonnina) | 114 | | |
| Cavanella Po | 270 | | |
| Ca' Dolfin | 143 | 2 | |
| Valle Ca' Zuliani | 351 | 156 | |
| Bacucco | 110 | 25 | |
| Isola della Batteria | 30 | | |
| Canalnovo | 268 | 75 | |
| Valle Boccavecchia | 30 | | |
| S. Egidio | 3 | | |
| Vasche Isola Verde | 30 | | |
| Le Gorghe di Fiesso Umbertiano | 33 | | |
| Gorghi di Trecenta | 8 | 15 | |
| Cave Danà | 15 | | |
| | 1746 | 273 | |



24

| | | | |
|-------|-------------------------|----------------------|-------------|
| PHACA | Cormorano | Oasi | 1068 |
| | | non Oasi | 913 |
| | | Oasi+non Oasi | 1981 |
| PHAPY | Marangone minore | Oasi | 367 |
| | | non Oasi | 370 |
| | | Oasi+non Oasi | 737 |

Presenza diurna.

Ibis, Spatola, Ardeidi, Fenicottero



Ibis sacri (F. Guglielmo).

25


Il costante aumento del Fenicottero nel Delta del Po ha portato il 2025 ad essere anno record per la specie, con oltre 8.000 individui censiti.

Ibis sacro leggermente calato rispetto al 2024, ma specie comunque in rapidissima ascesa numerica. Buona presenza di Spatola e Mignattaio.


Non si inverte il trend negativo di lungo periodo di Garzetta, Airone bianco maggiore e Airone cenerino, ai minimi storici. In progressiva crescita, invece, l'Airone guardabuoi. Rilevata anche la Nitticora.

ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURALISTICA
SAGITTARIA

Fenicottero - censimenti di metà gennaio - provincia di Rovigo




Ibis sacro - censimenti di metà gennaio - provincia di Rovigo




ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURALISTICA
SAGITTARIA


Spatola - censimenti di metà gennaio - provincia di Rovigo



Airone cenerino, Garzetta, Airone bianco maggiore -
provincia di Rovigo



Airone guardabuoi - censimenti di metà gennaio - provincia di Rovigo



Fenicottero nel Delta del Po, gennaio 2025.

**ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURALISTICA
SAGITTARIA**

| | | | |
|-------|-------------------------------|----------------------|-------------|
| ARDCI | Airone cenerino | Oasi | 101 |
| | | non Oasi | 64 |
| | | Oasi+non Oasi | 165 |
| EGRAL | Airone bianco maggiore | Oasi | 51 |
| | | non Oasi | 70 |
| | | Oasi+non Oasi | 121 |
| EGRGA | Garzetta | Oasi | 82 |
| | | non Oasi | 95 |
| | | Oasi+non Oasi | 177 |
| NYCNY | Nitticora | Oasi | 9 |
| | | non Oasi | 0 |
| | | Oasi+non Oasi | 9 |
| BUBIB | Airone guardabuoi | Oasi | 10 |
| | | non Oasi | 176 |
| | | Oasi+non Oasi | 186 |
| PLALE | Spatola | Oasi | 69 |
| | | non Oasi | 0 |
| | | Oasi+non Oasi | 69 |
| PHORO | Fenicottero | Oasi | 1836 |
| | | non Oasi | 6245 |
| | | Oasi+non Oasi | 8081 |
| THRAE | Ibis sacro | Oasi | 18 |
| | | non Oasi | 74 |
| | | Oasi+non Oasi | 92 |
| PLEFA | Mignattaio | Oasi | 0 |
| | | non Oasi | 26 |
| | | Oasi+non Oasi | 26 |

Caradriformi – Limicoli



Avocetta (E. Fregnan).

La situazione dei Limicoli appare sempre eterogenea, per la presenza di specie con trend
e esigenze ecologiche differenziate.


Il totale mostra però una sensibile flessione negli ultimi tre anni.

Il voltapietre mostra un costante incremento nelle ultime sei annate; ai minimi termini la popolazione svernante di Fratino, con soli due esemplari rilevati; sempre di difficile interpretazione il trend del Piovanello panciera, tipicamente altalenante, così come quello della Pavoncella. Comunque buona la presenza della Beccaccia di mare, anche se inferiore rispetto al recente passato; decisa flessione, invece, per l'Avocetta, e flessione anche per il Chiurlo maggiore.


Interessante presenza delle specie Corriere piccolo e Piovanello maggiore; decisamente sottostimati Beccaccia, Beccaccino e Piro-piro piccolo, i cui rilievi non risultano mai del tutto attendibili per capillarità di presenza di queste specie anche al di fuori delle zone umide e in fasce boscate e rete scolante delle zone intensamente coltivate.

ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURALISTICA
SAGITTARIA

Limicoli - provincia di Rovigo




Piovanello pancianera - provincia di Rovigo




ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURALISTICA
SAGITTARIA

Voltapietre - provincia di Rovigo




Beccaccia di mare - provincia di Rovigo




ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURALISTICA
SAGITTARIA

Pavoncella - provincia di Rovigo




Avocetta - provincia di Rovigo



ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURALISTICA
SAGITTARIA

Chiurlo maggiore - provincia di Rovigo





Limicoli nel Delta del Po, gennaio 2025.

ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURALISTICA
SAGITTARIA

| | | | | | | | |
|-------|-------------------|---------------|-----|-------|-----------------------|---------------|------|
| HAEOS | Beccaccia di mare | Oasi | 69 | TRITO | Pettegola | Oasi | 23 |
| | | non Oasi | 16 | | | non Oasi | 3 |
| | | Oasi+non Oasi | 85 | | | Oasi+non Oasi | 26 |
| RECAV | Avocetta | Oasi | 359 | TRINE | Pantana | Oasi | 54 |
| | | non Oasi | 218 | | | non Oasi | 50 |
| | | Oasi+non Oasi | 577 | | | Oasi+non Oasi | 104 |
| VANVA | Pavoncella | Oasi | 206 | TRIOC | Piro piro culbianco | Oasi | 2 |
| | | non Oasi | 285 | | | non Oasi | 12 |
| | | Oasi+non Oasi | 491 | | | Oasi+non Oasi | 14 |
| PLUSQ | Pivieressa | Oasi | 335 | ACTHY | Piro piro piccolo | Oasi | 9 |
| | | non Oasi | 317 | | | non Oasi | 9 |
| | | Oasi+non Oasi | 652 | | | Oasi+non Oasi | 18 |
| PLUAP | Piviere dorato | Oasi | 0 | GALGA | Beccaccino | Oasi | 0 |
| | | non Oasi | 15 | | | non Oasi | 5 |
| | | Oasi+non Oasi | 15 | | | Oasi+non Oasi | 5 |
| CHAHI | Corriere grosso | Oasi | 5 | CALAL | Piovanello pancianera | Oasi | 1618 |
| | | non Oasi | 0 | | | non Oasi | 3955 |
| | | Oasi+non Oasi | 5 | | | Oasi+non Oasi | 5573 |
| CHADU | Corriere piccolo | Oasi | 2 | CALCA | Piovanello maggiore | Oasi | 0 |
| | | non Oasi | 0 | | | non Oasi | 6 |
| | | Oasi+non Oasi | 2 | | | Oasi+non Oasi | 6 |
| CHAAL | Fratino | Oasi | 2 | AREIN | Voltapietre | Oasi | 7 |
| | | non Oasi | 0 | | | non Oasi | 18 |
| | | Oasi+non Oasi | 2 | | | Oasi+non Oasi | 25 |
| NUMAR | Chiurlo maggiore | Oasi | 0 | SCORU | Beccaccia | Oasi | 2 |
| | | non Oasi | 121 | | | non Oasi | 3 |
| | | Oasi+non Oasi | 121 | | | Oasi+non Oasi | 5 |
| TRIER | Totano moro | Oasi | 9 | CALAA | Piovanello tridattilo | Oasi | 150 |
| | | non Oasi | 0 | | | non Oasi | 0 |
| | | Oasi+non Oasi | 9 | | | Oasi+non Oasi | 150 |


Caradriformi – Laridi e Sternidi



Gabbiano roseo (V. Bellettato).

ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURALISTICA
SAGITTARIA


Le proporzioni tra le varie specie restano sostanzialmente invariate, con preponderanza del Gabbiano comune; Gabbiano roseo altalenante, presente ancora con numeri relativamente ridotti; interessante segnalazione di specie quali Zafferano e Beccapesci e assenza, invece, di altre quali il Gabbiano corallino.



| | Gavina | Gabbiano reale | Gabbiano comune | Altre specie |
|------|--------|----------------|-----------------|--------------|
| 2015 | 46 | 2.336 | 8.020 | 73 |
| 2016 | 1145 | 2.740 | 8.362 | 0 |
| 2017 | 324 | 3.714 | 8.321 | 22 |
| 2018 | 29 | 1.485 | 6.757 | 8 |
| 2019 | 56 | 2.580 | 7.069 | 3 |
| 2020 | 9 | 1.902 | 8.942 | 3 |
| 2021 | 182 | 3.509 | 8.653 | 57 |
| 2022 | 522 | 2.583 | 4.424 | 167 |
| 2023 | 185 | 4.588 | 3.010 | 7 |
| 2024 | 303 | 3.372 | 6.933 | 64 |
| 2025 | 52 | 2.865 | 4.998 | 10 |

ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURALISTICA
SAGITTARIA

Gabbiano roseo - provincia di Rovigo



| | | | |
|-------|------------------------|----------------------|-------------|
| LARCA | Gavina | Oasi | |
| | | non Oasi | |
| | | Oasi+non Oasi | 52 |
| LARCM | Gabbiano reale | Oasi | |
| | | non Oasi | |
| | | Oasi+non Oasi | 2865 |
| LARFU | Zafferano | Oasi | |
| | | non Oasi | |
| | | Oasi+non Oasi | 1 |
| LARRI | Gabbiano comune | Oasi | |
| | | non Oasi | |
| | | Oasi+non Oasi | 4998 |
| STESA | Beccapesci | Oasi | |
| | | non Oasi | |
| | | Oasi+non Oasi | 6 |
| LARGE | Gabbiano roseo | Oasi | |
| | | non Oasi | |
| | | Oasi+non Oasi | 3 |

Rapaci




39


Aquila anatraia maggiore (C. Bellato).

Interessante presenza di un esemplare di Aquila anatraia maggiore segnalato in Po di Maistra. Purtroppo, sempre estremamente limitata la presenza dell'Albanella reale, e Falco di palude ritornato in media dopo il picco rilevato nel 2024.

Albanella reale - provincia di Rovigo



Falco di palude - provincia di Rovigo



| | | | |
|-------|---------------------------------|----------------------|-----------|
| CIRAE | Falco di palude | Oasi | 22 |
| | | non Oasi | 16 |
| | | Oasi+non Oasi | 38 |
| CIRCY | Albanella reale | Oasi | 0 |
| | | non Oasi | 4 |
| | | Oasi+non Oasi | 4 |
| AQUCL | Aquila anatraia maggiore | Oasi | 1 |
| | | non Oasi | 0 |
| | | Oasi+non Oasi | 1 |

3 - Bibliografia e ringraziamenti

Verza E. (a cura di), 2006. Censimento degli uccelli acquatici svernanti in provincia di Rovigo, gennaio 2006. Associazione Cult. Nat. Sagittaria. Provincia di Rovigo. Relazione tecnica.

Un particolare ringraziamento va all'Ente Produttori Selvaggina e alle Aziende Faunistico-venatorie.

Si ringraziano i fotografi per la fornitura delle immagini e tutti i rilevatori e collaboratori che hanno partecipato ai monitoraggi.