

CENSIMENTO DEGLI UCCELLI ACQUATICI SVERNANTI IN PROVINCIA DI ROVIGO – ANNO 2026



Enrico Cecconello
photography

A cura di:

Associazione Culturale Naturalistica Sagittaria

Sommario

1 - Introduzione, materiali e metodi	3
2 - Risultati e discussione	8
Aspetti generali	8
Anseriformi	10
Rallidi e Gru	20
Podicipedidi e Strolaghe	24
Falacrocoracidi	26
Ibis, Spatola, Ardeidi, Fenicottero	29
Caradriformi – Limicoli	33
Caradriformi – Laridi e Sternidi	37
Rapaci	40
3 - Bibliografia e ringraziamenti	41

1 - Introduzione, materiali e metodi

Anche per il 2026 l'Associazione Sagittaria ha garantito il corretto svolgimento del censimento dell'Avifauna acquatica svernante presso tutte le zone umide della provincia di Rovigo, previsto secondo lo schema dei censimenti IWC (International Waterbird Census). Per il gennaio 2026 l'Associazione Sagittaria ha svolto i censimenti in maniera del tutto volontaristica e senza alcun sostegno finanziario.

I metodi utilizzati per il censimento sono rimasti gli stessi:

- dati raccolti da censitori esperti coadiuvati da aiutanti (mediamente 2 o 3 persone per ogni gruppo), organizzati in squadre;
- dati raccolti mediante strumentazione ottica di precisione (cannocchiali e binocoli), sia da punti sopraelevati (ad es. torrette, casoni, argini), sia percorrendo tratti in auto, sia da natanti.

Il censimento è stato effettuato durante tre giornate ravvicinate, così suddivise:

- 5 gennaio 2026: Delta meridionale e occidentale, caratterizzato dalle lagune, dai rami del Po e dalle piane di bonifica.
- 6 gennaio 2026: Delta centro-settentrionale (a nord di Pila), comprendente soprattutto i complessi vallivi, le lagune e alcuni settori del Po
- 7 gennaio 2026: zone umide dell'interno.

Le condizioni meteorologiche hanno reso parte del censimento particolarmente difficoltoso, in particolare il 6 gennaio per forte vento di bora con frequenti episodi di pioggia.

Nonostante le succitate condizioni climatiche, si ritiene che i dati siano stati raccolti in maniera completa e standardizzata.

Le aree monitorate sono state tutte le zone umide della provincia di Rovigo, come da elenco pregresso (Verza, 2006), ad esclusione di quelle indicate in tabella.

ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURALISTICA
SAGITTARIA



Tempistiche censimento di gennaio 2026.

Adige, Begosso - Badia Pol.	RO0101
Adige, Badia Pol. - Lusia	RO0102
Adige, Lusia - Boara	RO0103
Adige, Boara - Anguillara V.	RO0104
Adige, Anguillara V. - Cavarzere	RO0105
Adige, Cavarzere - Romea	RO0106
Lit. Po Levante - Po Maistra	RO0225
Vasche Zucch. Contarina	RO0237
Lit. Po Maistra - Po Pila	RO0239
Lit. Po di Tolle - Po di Goro	RO0252
Vasche Zucc. Cavanella Po	RO0304
Gorgo di Bergantino	RO0501
Gorghetto di Giacciano con Baruc.	RO0502
Gorghi di Pincara	RO0505
Gorgo di Fiesso U.	RO0506



Rilievi da terra presso le zone umide minori del Polesine occidentale.



Rilievi da terra presso le zone umide minori del Polesine occidentale.



Rilievi nelle Valli del Delta del Po.



Rilievi nelle Valli del Delta del Po.



Rilievi ai roost di Cormorano.


2 - Risultati e discussione

Aspetti generali

Nel gennaio 2026 si è rilevato un aumento del totale di esemplari censiti, con numero più alto dal 2019.


Anno	Individui
1997	60.845
1998	78.363
1999	70.297
2000	72.268
2001	93.446
2002	136.885
2003	135.271
2004	105.059
2005	125.769
2006	141.211
2007	123.653
2008	163.257
2009	134.713
2010	141.733
2011	153.944
2012	127.505
2013	131.768
2014	151.011
2015	146.373
2016	181.932
2017	162.773
2018	193.692
2019	200.147
2020	110.337
2021	140.824
2022	100.484
2023	109.786
2024	140.939
2025	133.931
2026	150.713

ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURALISTICA
SAGITTARIA



Le Valli da pesca e da caccia ospitano la maggior parte del contingente svernante provinciale, con oltre il 90% degli esemplari censiti.

	Valli	Altre aree
2019	92%	8%
2020	83%	17%
2021	86%	14%
2022	82%	18%
2023	80%	20%
2024	89%	11%
2025	91%	9%
2026	90%	10%



I siti con la maggior parte di esemplari censiti sono, come di consueto, le Valli da pesca e da caccia.

Valle Ripiego	RO0229	25.878
Valle Ca' Zuliani	RO0234	20.392
Valle Chiusa	RO0228	17.965
Valle Ca' Pasta	RO0223	12.794
Valle Ca' Pisani	RO0222	8.446
Valle S. Leonardo	RO0221	6.991
Valle Morosina	RO0205	6.731
Valle S. Carlo	RO0230	5.624
Valle Boccavecchia	RO0202	5.522
Valle Bagliona	RO0216a	5.183

N° individui censiti, gennaio 2026.

Per quanto riguarda le peculiarità prettamente ornitologiche, per il gennaio 2026 vanno sottolineati i seguenti aspetti:


- censite specie particolari per il periodo, particolari e rare, fra cui Casarca (14), Casarca del Sudafrica - aufuga (2), Svasso cornuto e Strolaga minore;
- record di presenze dal 1997 per Ibis sacro (725) e Gru (1.164).

Anseriformi



Anatidi nelle Valli di Boccasette (V. Bellettato).

Anatidi - censimenti di metà gennaio - provincia di Rovigo



Decisamente migliorata la situazione per quanto riguarda il totale di Anseriformi censiti, con superamento del limite dei 100.000 individui, cosa che non era stata più rilevata dal 2019. Le specie più numerose, in ordine decrescente, sono risultate: Alzavola, Germano reale, Volpoca e Fischione.


Alzavola nuovamente dominante da un punto di vista numerico, con oltre 37.000 esemplari censiti e con terzo migliore anno di presenza dal 1997; è risultata concentrata nelle Valli di Porto Tolle con 23.000 esemplari. Favorevole anche la situazione del Germano reale, con terzo miglior anno di sempre dal 1997, con eguale presenza tra le Valli di Porto Viro e Porto Tolle. La Volpoca, seppure numerosa, mostra un decremento armonico negli ultimi quattro anni, interpretabile presumibilmente come fluttuazione o stabilizzazione dei contingenti a livello locale. Positiva la situazione per Cigno reale, Canapiglia, Mestolone. Terzo migliore anno anche per Moretta, quasi completamente concentrata all'interno delle Valli di Porto Viro e Porto Tolle. Relativamente stabile il Moriglione. Poco significativa la presenza di Codone e Smergo minore. Oca selvatica poco numerosa.

Tra le specie particolari rilevate ben 14 Casarche, osservate assieme a 2 Casarche del Sudafrica, 4 Oche lombardelle, specie assai scarsa in Polesine.


Si conferma la preponderante presenza di Anseriformi all'interno delle aree cacciabili delle Valli, situazione ben nota e consolidata.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zone cacciabili	73.935	145.343	128.629	64.449	96.998	53.694	62.423	89.224	80.684	98.678
Oasi	43.882	9.605	17.101	9.912	7.421	7.528	10.358	8.419	9.351	9.659


ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURALISTICA
SAGITTARIA




Germano reale - censimenti di metà gennaio - provincia di
Rovigo




Fischione - censimenti di metà gennaio - provincia di Rovigo




Alzavola - censimenti di metà gennaio - provincia di Rovigo




Cigno reale - censimenti di metà gennaio - provincia di Rovigo




Canapiglia - censimenti di metà gennaio - provincia di Rovigo




Mestolone - censimenti di metà gennaio - provincia di Rovigo




Codone - censimenti di metà gennaio - provincia di Rovigo




Volpoca - censimenti di metà gennaio - provincia di Rovigo



Moretta - censimenti di metà gennaio - provincia di Rovigo




Moriglione - censimenti di metà gennaio - provincia di Rovigo



ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURALISTICA
SAGITTARIA

Smergo minore - censimenti di metà gennaio - provincia di
Rovigo



CYGOL	Cigno reale	Oasi	183	ANAPL	Germano reale	Oasi	1279
		non Oasi	865			non Oasi	22826
		Oasi+non Oasi	1048			Oasi+non Oasi	24105
ANSAL	Oca lombardella	Oasi	0	ANAAC	Codone	Oasi	8
		non Oasi	4			non Oasi	334
		Oasi+non Oasi	4			Oasi+non Oasi	342
ANSAN	Oca selvatica	Oasi	2	ANACL	Mestolone	Oasi	58
		non Oasi	32			non Oasi	5245
		Oasi+non Oasi	34			Oasi+non Oasi	5303
TADFE	Casarca	Oasi	0	AYTFE	Moriglione	Oasi	1352
		non Oasi	14			non Oasi	831
		Oasi+non Oasi	14			Oasi+non Oasi	2183
TADTA	Volpoca	Oasi	4511	AYTFU	Moretta	Oasi	680
		non Oasi	16970			non Oasi	60
		Oasi+non Oasi	21481			Oasi+non Oasi	740
ANAPE	Fischione	Oasi	15	MERSE	Smergo minore	Oasi	0
		non Oasi	13568			non Oasi	20
		Oasi+non Oasi	13583			Oasi+non Oasi	20
ANAST	Canapiglia	Oasi	24	TADCA	Casarca del Sudafrica	Oasi	0
		non Oasi	1849			non Oasi	2
		Oasi+non Oasi	1873			Oasi+non Oasi	2
ANACR	Alzavola	Oasi	1547				
		non Oasi	36058				
		Oasi+non Oasi	37605				



Casarche e Casarche del Sudafrica – Valli di Porto Tolle (R. Corvino).

Rallidi e Gru




Folaghe in Valle Bagliona (E. Cecconello).

Folaga stabile con oltre 14.000 individui censiti, praticamente tutti all'interno delle Valli. Porciglione e Gallinella d'acqua vengono censiti, come ben noto, in numeri non attendibili rispetto alla loro reale consistenza numerica.


Anno particolarmente favorevole, invece, per la presenza della Gru, con sia individui censiti durante il giorno in alimentazione nelle Bonifiche poste a margine della Sacca di Scardovari, sia al roost serale formatosi all'interno delle Valli di Porto Viro. Qui, oltre 1.000 individui hanno trascorso la notte durante tutto il periodo invernale, provenienti ogni giorno in larga parte da nord-ovest.

ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURALISTICA
SAGITTARIA




Provenienza dei gruppi di gru in fase di roost serale.

Folaga - censimenti di metà gennaio - provincia di Rovigo



Gru - censimenti di metà gennaio - provincia di Rovigo



RALAQ	Porciglione	Oasi	18
		non Oasi	5
		Oasi+non Oasi	23
GALCH	Gallinella d'acqua	Oasi	315
		non Oasi	135
		Oasi+non Oasi	450
FULAT	Folaga	Oasi	1825
		non Oasi	12382
		Oasi+non Oasi	14207
GRUGR	Gru	Oasi	0
		non Oasi	1164
		Oasi+non Oasi	1164



Gru in alimentazione (V. Bellettato).



Gru in alimentazione (L. Rosa).

Podicipedidi e Strolaghe



Svasso cornuto in Sacca del Canarin (P. Scarpa).

Peggior anno dal 1997 per i Podicipedidi, con numero minimo censito.


Interessante la segnalazione di uno Svasso cornuto in Sacca del Canarin e di una Strolaga minore in mare di fonte a Scanno Boa.

Per quanto riguarda l'utilizzo del territorio, si può notare come le specie abbiano preferenze ben distinte:

- lo Svasso maggiore non ha utilizzato in maniera preferenziale nessuna tipologia di zona umida;
- lo Svasso piccolo, invece, è stato censito per l'81% all'intero dei Sistemi lagunari costieri;
- il Tuffetto, infine, per il 92% all'interno delle Valli.

24

Svassi - censimenti di metà gennaio - provincia di Rovigo



Svasso piccolo



■ Sistemi lagunari costieri ■ Altre zone umide

Tuffetto



■ Valli ■ Altre zone umide

TACRU	Tuffetto	Oasi	58
		non Oasi	14
		Oasi+non Oasi	72
PODCR	Svasso maggiore	Oasi	145
		non Oasi	33
		Oasi+non Oasi	178
PODNI	Svasso piccolo	Oasi	81
		non Oasi	192
		Oasi+non Oasi	273
PODAU	Svasso cornuto	Oasi	0
		non Oasi	1
		Oasi+non Oasi	1
GAVST	Strolaga minore	Oasi	1
		non Oasi	0
		Oasi+non Oasi	1


Falacrocoracidi



Roost di cormorani (F. Guglielmo).


Le specie sono state censite sia in diurna che ai roost serali, con un unico esemplare di Marangone dal ciuffo rilevato.

Quest'anno è stato possibile rilevare un importante roost di Marangone minore (Valle Canocchione), fatto che ha permesso un buon monitoraggio della specie. Nuovamente non vi è una perfetta sovrapposizione tra i dati dei roost e quelli in diurna, a conferma della necessità di censimenti congiunti con le province limitrofe.



I dati in diurna del Cormorano mostrano come, a gennaio, la specie venga censita prevalentemente all'interno delle Valli (59%).

ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURALISTICA
SAGITTARIA



La tabella seguente mostra i roost censiti.

Roost WI 2026 Rovigo		
	Cormorano	Marangone minore
Po di Maistra (Carpano)		
Po di Maistra (Oasi Valpisan)	55	
Po di Maistra (Golena di Ca' Pisani)		
Ca' Cornera (Golena Madonnina)	19	2
Valle Canocchione	50	1718
Valle Ripiego		300
Cavanella Po	312	
Ca' Dolfìn	88	5
Valle Ca' Zuliani	200	250
Bacucco	33	31
S. Maria in Punta	62	40
Isola del Balotin di Corbola		
Rotta di Martino	10	
Isola della Batteria	20	
Canal Novo	140	4
Valle Boccavecchia		40
S. Egidio	25	10
Cave Danà	30	
	1044	2400

ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURALISTICA
SAGITTARIA

PHACA	Cormorano	Oasi	1384
		non Oasi	1649
		Oasi+non Oasi	3033
PHAPY	Marangone minore	Oasi	904
		non Oasi	802
		Oasi+non Oasi	1706
PHAAR	Marangone dal ciuffo	Oasi	1
		non Oasi	0
		Oasi+non Oasi	1

Presenza diurna.



Nuovo roost di Marangone minore ubicato a S. Marina in Punta.

Ibis, Spatola, Ardeidi, Fenicottero





Roost di Ca' Dolfin di Porto Tolle (F. Guglielmo).


29

Sempre di notevole entità la presenza del Fenicottero e buona presenza della Spatola. Anno record di presenze dal 1997 per l'Ibis sacro, specie in evidente incremento numerico. Assenza, invece, di Tarabuso e Mignattaio.


Gli Ardeidi mostrano preferenze ambientali distinte, con Airone guardabuoi quasi completamente presente nelle Bonifiche, mentre Airone bianco maggiore in maniera preponderante all'interno delle Valli.




Fenicottero - censimenti di metà gennaio - provincia di Rovigo




Spatola - censimenti di metà gennaio - provincia di Rovigo




Ibis sacro - censimenti di metà gennaio - provincia di Rovigo



Airone guardabuoi - censimenti di metà gennaio - provincia di
Rovigo



Airone bianco maggiore - provincia di Rovigo



ARDCI	Airone cenerino	Oasi	183	BUBIB	Airone guardabuoi	Oasi	14
		non Oasi	98			non Oasi	117
		Oasi+non Oasi	281			Oasi+non Oasi	131
EGRAL	Airone bianco maggiore	Oasi	161	PLALE	Spatola	Oasi	5
		non Oasi	105			non Oasi	71
		Oasi+non Oasi	266			Oasi+non Oasi	76
EGRGA	Garzetta	Oasi	112	PHORO	Fenicottero	Oasi	851
		non Oasi	157			non Oasi	4227
		Oasi+non Oasi	269			Oasi+non Oasi	5078
NYCNY	Nitticora	Oasi	13	THRAE	Ibis sacro	Oasi	38
		non Oasi	0			non Oasi	687
		Oasi+non Oasi	13			Oasi+non Oasi	725

Caradriformi – Limicoli




Piovanelli pancianera (V. Bellettato).


Generale crisi per quanto riguarda i Limicoli, con secondo peggior anno di presenza dal 1997. Il calo è evidente soprattutto per specie chiave come il Piovanello pancianera, con peggiore anno dal 1997; calata in maniera significativa la Beccaccia di mare; sempre ai minimi termini il Frattino; non rilevati Pittima minore e Voltapietre; piuttosto scarsa l'Avocetta.

Positiva, invece, la presenza della Pavoncella, che mostra la miglior annata dell'ultimo ventennio; decisamente sottostimati Beccaccia, Beccaccino e Piro-piro piccolo, i cui rilievi non risultano mai del tutto attendibili per capillarità di presenza di queste specie anche al di fuori delle zone umide e in fasce boscate e rete scolante delle zone intensamente coltivate.

Limicoli - provincia di Rovigo




Piovanello pancianera - provincia di Rovigo




ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURALISTICA
SAGITTARIA


Avocetta - provincia di Rovigo




Chiurlo maggiore - provincia di Rovigo



Pavoncella - provincia di Rovigo



Beccaccia di mare - provincia di Rovigo



ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURALISTICA
SAGITTARIA

HAEOS	Beccaccia di mare	Oasi non Oasi Oasi+non Oasi	26	TRITO	Pettegola	Oasi non Oasi Oasi+non Oasi	31
RECAV	Avocetta	Oasi non Oasi Oasi+non Oasi	667	TRINE	Pantana	Oasi non Oasi Oasi+non Oasi	35
VANVA	Pavoncella	Oasi non Oasi Oasi+non Oasi	1434	TRIOC	Piro piro culbianco	Oasi non Oasi Oasi+non Oasi	7
PLUSQ	Pivieressa	Oasi non Oasi Oasi+non Oasi	269	ACTHY	Piro piro piccolo	Oasi non Oasi Oasi+non Oasi	17
PLUAP	Piviere dorato	Oasi non Oasi Oasi+non Oasi	355	GALGA	Beccaccino	Oasi non Oasi Oasi+non Oasi	37
CHAAL	Fratino	Oasi non Oasi Oasi+non Oasi	2	CALAL	Piovanello pancianera	Oasi non Oasi Oasi+non Oasi	2189
NUMAR	Chiurlo maggiore	Oasi non Oasi Oasi+non Oasi	199	CALAA	Piovanello tridattilo	Oasi non Oasi Oasi+non Oasi	31
TRIER	Totano moro	Oasi non Oasi Oasi+non Oasi	21				

Caradriformi – Laridi e Sternidi

37




Beccapesci (*E. Cecconello*).



ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURALISTICA
SAGITTARIA

Non rilevate nel 2026 specie quali Gabbiano corallino, Zafferano e Gabbiano reale nordico. Incremento dello svernamento del Gabbiano roseo, con secondo miglior anno registrato. Interessante presenza del Beccapesci.

Il Gabbiano comune mostra preferenze ambientali ben definibili, con Valli e Boniche di eguale importanza.

	Gavina	Gabbiano reale	Gabbiano comune	Altre specie
2015	46	2.336	8.020	73
2016	1.145	2.740	8.362	0
2017	324	3.714	8.321	22
2018	29	1.485	6.757	8
2019	56	2.580	7.069	3
2020	9	1.902	8.942	3
2021	182	3.509	8.653	57
2022	522	2.583	4.424	167
2023	185	4.588	3.010	7
2024	303	3.372	6.933	64
2025	52	2.865	4.998	10
2026	35	3.358	5.587	22





LARCA	Gavina	Oasi	
		non Oasi	
		Oasi+non Oasi	35
LARCM	Gabbiano reale	Oasi	
		non Oasi	
		Oasi+non Oasi	3358
LARRI	Gabbiano comune	Oasi	
		non Oasi	
		Oasi+non Oasi	5587
LARGE	Gabbiano roseo	Oasi	
		non Oasi	
		Oasi+non Oasi	22
STESA	Beccapesci	Oasi	
		non Oasi	
		Oasi+non Oasi	16

Rapaci




Albanella reale (MG. Turella, L. Rosa).


Anno particolarmente interessante per il Falco di plauze (86 indd.), con secondo migliore anno dal 1997. Rilevata la presenza di roost nell'area dei fragmiteti di Pila di Porto Tolle, con 153 individui l'11 gennaio e 87 il 12 gennaio (M. Passarella). Tale aspetto merita un futuro approfondimento, al fine di meglio quantificare la presenza della specie in svernamento.

Purtroppo, sempre estremamente limitata la presenza dell'Albanella reale (4 indd.). Nessun'altra specie è stata rilevata.

Falco di palude - provincia di Rovigo



Albanella reale - provincia di Rovigo



3 - Bibliografia e ringraziamenti

Verza E. (a cura di), 2006. Censimento degli uccelli acquatici svernanti in provincia di Rovigo, gennaio 2006. Associazione Cult. Nat. Sagittaria. Provincia di Rovigo. Relazione tecnica.

Un particolare ringraziamento va all'Ente Produttori Selvaggina e alle Aziende Faunistico-venatorie.

Si ringraziano i fotografi per la fornitura delle immagini e tutti i rilevatori e collaboratori che hanno partecipato ai monitoraggi, ed in particolare:

Associazione Culturale Naturalistica Sagittaria

SEDE LEGALE E OPERATIVA - Galleria Bernardino da Feltre, 9 - 45100 Rovigo - P.IVA 01295300295

ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURALISTICA
SAGITTARIA

Pietro scarpa, Enrico Cecconello, Lorenzo Zanella, Nicola Grigolin, Fabrizio Barbieri, Fabio Piccolo, Emiliano Verza, Alessandro Sartori, Francesco Chiarello, Roberto Corvino, Fabio Guglielmo, Emanuela Piva, Vanni Bellettato, Beatrice Bordignon, Matteo Soldera, Matteo Biasi, Angela Scorzoni, Chiara Tavernini, Adelmo Fontolan, Francesco Bonaldo, Marco Bergamin, Elena Volognese, Lucrezia Viaro, Mattia Rivarolo, Dimitri Bothari, Alvise Ghiraldi, Chiara Fabrello, Francesco Cavion, Francesca Cereser, Riccardo Bordignon.