

Maurizio Sighele, Niccolò Fagotto, Roberto Corvino, Vittorio Fanelli, Gloria Feltrin, Fabio Moretto,
Giacomo Sgorlon, Alessandro Sartori, Emiliano Verza, Emanuele Stival

RAPPORTO ORNITLOGICO PER LA REGIONE VENETO ANNO 2024

Riassunto. Si riportano, in ordine sistematico, le più interessanti osservazioni ornitologiche del 2024 raccolte nella regione Veneto relative a svernamento, nidificazione, migrazione, erratismi, anomalie di piumaggio, fenomeni apparentemente insoliti, ecc. I dati di maggior rilievo, se accettati dalla COI, riguardano la prima segnalazione regionale di gabbiano sghignazzante e della ssp. *phoenicuroides* del codirosson spazzacamino, e la seconda segnalazione regionale di tortora orientale. Inoltre vengono elencate la prima segnalazione degli ultimi 50 anni di zigolo boschereccio e le osservazioni di specie irregolari come cigno minore, oca collorosso, oca granaiola della tundra, edredone, pesciaiola, cuculo dal ciuffo, schiribilla grigia, croccolone, strolaga maggiore, berta maggiore, allocco degli Urali, gipeto, aquila di mare, poiana calzata, lui forestiero, lui di Pallas.

Summary. Ornithological report for the year 2024 in the Veneto region (NE Italy).

Some interesting data concerning vagrants as well as some uncommonly recorded, wintering or breeding bird species in Veneto are given in systematic order. The most interesting data, if accepted, include the first regional occurrence of Laughing Gull and of *phoenicuroides* subspecies of Black Redstart, and the second regional occurrence of Oriental Turtle Dove. First occurrence in the last 50 years of Rustic Bunting, and sightings of irregular species such as Tundra Swan, Red-breasted Goose, Tundra Bean Goose, Common Eider, Smew, Great Spotted Cuckoo, Baillon's Crake, Great Snipe, Common Loon, Scopoli's Shearwater, Ural Owl, Bearded Vulture, White-tailed Eagle, Rough-legged Buzzard, Yellow-browed Warbler, and Pallas's Leaf Warbler are also listed.

Reference: Sighele M., Fagotto N., Corvino R., Fanelli V., Feltrin G., Moretto F., Sgorlon G., Sartori A., Verza E., Stival E., 2025. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2024. *Bollettino del Museo di Storia Naturale di Venezia*, 76: 71-98.

INTRODUZIONE

Sono qui riportate le segnalazioni ritenute più significative del 2024 relative a 193 specie di uccelli selvatici, 4 ibridi e alcune specie introdotte e/o fuggite da cattività. Le osservazioni sono state selezionate sulla base della loro importanza a livello regionale, senza trascurare le peculiarità locali. Dove non è diversamente descritto, per ogni specie citata vengono elencate in ordine cronologico tutte le segnalazioni raccolte o giunte in redazione.

I dati provengono sia da censimenti e progetti organizzati, sia da osservazioni sporadiche e personali, parte delle quali sono già state rese pubbliche nelle ormai numerose mailing list ornitologiche, locali e nazionali o su siti web; per quanto riguarda queste fonti, in calce al dato viene riportata la fonte originale con un numero di nota: [1] Birding Veneto; [2] Venezia BW; [3] Verona BW; [4] ornitho.it; [5] iNaturalist; [6] ebird; [7] EBN-Italia; [8] Observation.

La sequenza e la tassonomia seguono AVILIST CORE TEAM (2025), checklist nata dopo lo sforzo collaborativo per produrre un'unica tassonomia consensuale per gli uccelli del mondo; per i nomi italiani delle specie si è fatto riferimento a MASSA et al. (1993), VIOLANI & BARBAGLI (2006) e BACCETTI et al. (2014, 2021).

ELENCO SISTEMATICO DELLE SPECIE

Anseriformes Anatidae

Cigno reale *Cygnus olor*

Si riporta un conteggio consistente.

- 1.602 ind. nel Delta del Po (RO) l'8 e il 9 gennaio (censimenti Sagittaria).

Cigno nero *Cygnus atratus*

Si elencano segnalazioni in località poco note per la specie.

- 1 ind. alla foce del Po di Maistra (RO) il 16 marzo e il 13 maggio (F. Piccolo, M. Cargasacchi, T. Bisol, N. Fagotto [4] [6]).
- 1 ind. alla foce del Po di Gnocco (RO) il 26 maggio (D. Trombin [4]).
- 1 ind. in Valle Ripiego, Porto Tolle (RO), il 29 ottobre (E. Ceconello [4]).
- 1 ind. in Valle Morosina, Codevigo (PD), il 29 ottobre (L. Sattin [4]).
- 1 ind. in Valle Bagliona, Porto Viro (RO), l'8 dicembre (E. Verza).

Cigno minore *Cygnus columbianus*

- 5 ind. in Valle Morosina, Codevigo (PD), il 14 gennaio (L. Grassi [4]).
- 5 ind. in Valle Cavallino, Jesolo (VE), e poi in Brussa, Caorle (VE), il 12 febbraio (A. Nardotto, F. Salvini [4]) (fig. 1).

Quella di Codevigo rappresenta la quarta segnalazione nota per la provincia di Padova, la terza nello stesso sito (SIGHELE et al., 2012, 2016).

Oca collorosso *Branta ruficollis*

- 1 ind. a Villaviera, Caorle (VE), tra il 19 dicembre 2023 e il 28 gennaio (F. Salvini, P. Vacilotto, M. Darpin, P. Geromel et al. [4] [7] - cfr. SIGHELE et al., 2024).
- 1-2 ind. a Villaviera e Brussa, Caorle (VE), tra il 24 novembre e il 5 marzo 2025 (M. Darpin et al. [4] [6]).

Oca del Canada *Branta canadensis*

Si elencano segnalazioni in località non note per la specie.

- 1 ind. a Nogarole Rocca (VR) il 24 luglio (D. Engelbrecht [6]).
- 1 ind. in volo a Buttapietra (VR) il 7 novembre (G. Fasoli [4]).

Oca facciabianca *Branta leucopsis*

Si elencano segnalazioni di individui dal comportamento non confidente in concomitanza di osservazioni invernali di altre specie di oche, e una osservazione di individuo marcato.

- 1-2 ind. a Sindacale, Concordia Sagittaria (VE), tra il 9 dicembre 2023 e il 7 febbraio (E. Carta, G. Nassi, L. Dalla Libera, A. De Angelis et al. [4] [6] [7] - cfr. SIGHELE et al., 2024).
- 1 ind. in risaia a Vo' Pindemonte, Isola della Scala (VR), il 31 maggio, marcato con collare bianco di progetto britannico iniziato nel 2021 che applica questi collari a individui della popolazione inglese naturalizzata (G. Fasoli [4]).
- 1 ind. tra Villaviera, Caorle (VE), e Sindacale, Concordia Sagittaria (VE), tra il 24 novembre e il 6 gennaio 2025 (M. Darpin, L. Lipparini et al. [4]).

Oca selvatica *Anser anser*

Si elencano un conteggio consistente e individui marcati di un certo interesse.

- 13.388 ind. in provincia di Venezia tra il 9 e il 12 gennaio (BASSO, 2024).
- 1 ind. in Valle Zignago, Caorle (VE), il 4 febbraio, marcato con collare ceco "K/14" (M. Pezzetta, A. Sartori): era stato applicato da pullo a r. Vysatov, Cejkovice, Repubblica Ceca, l'1 giugno 2019, osservato più volte in Rep.Ceca, Ungheria e Germania.
- 1 ind. a Concordia Sagittaria (VE) il 7 febbraio, marcato con collare colorato ceco "H/07" (E. Stival); era stato applicato da adulto a Lhotka, Repubblica Ceca, il 30 maggio 2020, da allora segnalato più volte, ma esclusivamente nel Paese della marcatura (A. Talamelli).
- 1 ind. in Valle Grassabò, Venezia, il 12 novembre, marcato con collare ungherese "HE62" (A. Sartori); era stato applicato da pullo a Sarrod, Gyron-Moson-Sopron, Ungheria, il 23 giugno 2022, osservato più volte in Ungheria e in Svezia.
- 1 ind. in Valle Franchetti, Caorle (VE), il 19 novembre, marcato con collare ungherese "T/46" (A. Sartori); applicato da adulto a Fertorakos, Gyron-Moson-Sopron, Ungheria, il 2 gennaio 2021, osservato più volte in Ungheria, Rep. Ceca, Polonia e Germania.
- 1 ind. in Valle Grassabò, Venezia, il 4 dicembre, marcato con collare finlandese "2/GJ" (A. Sartori); era stato applicato da pullo a Pori, Finlandia, il 28 maggio 2021, osservato più volte in Finlandia, Rep. Ceca, Svezia.

Oca lombardella minore *Anser erythropus*

- 1 ind. a Villaviera, Concordia Sagittaria (VE), tra il 4 gennaio e il 12 febbraio (L. Cairo, P. Geromel, C. Andreuccetti, C. Olobardi et al. [4]).
- 1-3 ind. a Sindacale, Concordia Sagittaria (VE), e Villaviera, Caorle (VE), tra il 18 dicembre e l'8 febbraio 2025 (P. Geromel, F. Piccolo, L. Lanzani et al. [4]).
- 2 ind. in Valle Vecchia, Caorle (VE), il 30 dicembre (D. e P. Speggiорin [4]).

Oca lombardella *Anser albifrons*

Si elencano conteggi consistenti e segnalazioni in località inusuali.

- 27.041 ind. in provincia di Venezia tra il 9 e il 12 gennaio, in particolare 20.995 ind. in Laguna di Venezia, 6.046 ind. in Laguna di Caorle-Bibione (BASSO, 2024).
- 1 ind. alla Busa de Giaretta (PD) il 14 gennaio (F. Moretto).
- 3 ind. alla Busa de Giaretta (PD) il 20 e il 29 novembre, 1 ind. il 14 dicembre (M. Fioretto, M. Stenico, L. Bonato [4] [5] [6]).

Oca granaiola della tundra *Anser serrirostris*

- 7 ind. a Villaviera e Valle Rotelle, Caorle (VE), Marina di Lugagnana, Portogruaro (VE), e Terzo Bacino, San Michele al Tagliamento (VE), tra l'11 dicembre 2023 e il 21 gennaio (F. Piccolo, F. Salvini, P. Vacilotto, S. Stefanetti et al. [4] [6] [7]).

Si ricorda che nella checklist italiana (BACCETTI et al., 2021) *Anser serrirostris* è considerata sottospecie di *Anser fabalis*.

Anatra mandarina *Aix galericulata*

Si elencano segnalazioni di individui non confidenti in località poco note per la specie.

- 1 f. alle Rotte del Guà, Trissino (VI), per tutto il 2024 (M. Bertacco, M. Nicolato et al. [4] [5] [6] - cfr. SIGHELE et al., 2024).
- 2 ind. ad Arquà Petrarca (PD) il 12 gennaio (G. Piras [5]).
- 1 m. e 2 f. a Verona il 21 gennaio (R. Zanella [3]).
- 1 m. a Crocetta del Montello (TV) il 6 maggio (F. Favero).
- 1 ind. a Creazzo (VI) dall'8 agosto al 6 novembre (L. Dalla Libera, S. Rizzi [4]).
- 1 f. alla Busa de Giaretta (PD) il 5 e il 22 novembre (F. Moretto).
- 1 f. a Piove di Sacco (PD) il 22 novembre (E. Cecconello [4] [5]).

Oca egiziana *Alopochen aegyptiaca*

Si elencano segnalazioni di individui non confidenti in località poco note per la specie.

- 1 ind. in un campo allagato a Montegalda (VI) tra il 24 marzo e l'8 aprile (G. Facchin, P. Perazzolo).



Fig. 1. Cigni minori (*Cygnus columbianus*) in Brussa, Caorle (VE), il 12 febbraio 2024. Foto di F. Salvini. **Fig. 2.** Tortora orientale (*Streptopelia orientalis*) a Tessera, Venezia, il 25 ottobre 2024. Foto di E. Stival. **Fig. 3.** Schiribilla grigiata (*Zapornia pusilla*) tra Caldognò e Isola Vicentina (VI) il 25 giugno 2024. Foto di M. Fioretto. **Fig. 4.** Gabbiano sghignazzante (*Larus atricilla*) alla foce del Tagliamento, Lignano (UD), il 24 luglio 2024. Foto di W. Van Gasse.

- 1 cp. con 5 pulli all’Oasi Le Vallette, Cerea (VR), l’1 aprile (G. Rigo [1]).
- 3 ind. in Sacca del Canarin, Porto Tolle (RO), il 28 maggio (E. Verza).
- 3 ind. in Valle San Carlo, Porto Tolle (RO), il 7 agosto (E. Verza).
- 5 ind. in Sacca di Bottonera, Porto Tolle (RO), il 9 settembre (L. Rosa).

Quella di Montegalda dovrebbe essere la quarta segnalazione nota per la provincia di Vicenza (SIGHELE et al., 2012, 2022; G. Fracasso [4]).

Volpoca *Tadorna tadorna*

Si elencano conteggi consistenti e segnalazioni inusuali al di fuori dell’area costiera.

- 58.272 ind. in provincia di Venezia tra il 9 e il 12 gennaio (BASSO, 2024).
- 22 ind. a Lido Campanello, Castelnuovo del Garda (VR), l’11 gennaio (S. Tascio [3] [4]).
- 4.000 ind. in Palude di Cona, Venezia, l’1 febbraio (E. Stival).
- 1 ind. al Lago di Busche (BL) il 18 febbraio (M. Zenatello [4]).
- 7 ind. al Lago di Centro Cadore (BL) il 4 luglio (F. Rigon [4]).
- 1 ind. alla Palude del Busatello (VR/MN), il 23 novembre (F. Sirtoli [4]).

Casarca *Tadorna ferruginea*

Si elencano segnalazioni di individui non confidenti in provincia di Rovigo.

- 1 ind. in Valle Ca’ Pisani, Porto Viro (RO), il 20 gennaio (L. Boscaini, M. Cargasacchi, F. Piccolo, E. Stival).
- 2 ind. in Valle Segà, Rosolina (RO), il 5 marzo (V. Bellettato, M. Valente).
- 1 ind. in Sacca del Canarin, Porto Tolle (RO), il 28 maggio (E. Verza).
- 1 ind. alla foce del Po di Maistra (RO) il 27 luglio (F. Piccolo).
- 2 ind. in Valle Chiusa, Porto Tolle (RO), il 6 e il 10 settembre (N. Fagotto, F. Piccolo).
- 2 ind. in Valle Morosina, Codevigo (PD), il 29 ottobre (F. Barbieri, E. Piva, S. Rambelli).

Alopochen aegyptiaca* x *Tadorna ferruginea

- 1 ind. a Villaviera, Caorle (VE) tra il 24 febbraio e il 23 novembre (M. Stenico, F. Salvini, A. Sutto et al. [4] [6]).

Moretta codona *Clangula hyemalis*

- 8 ind. nel Golfo di Peschiera (VR) tra il 16 febbraio e il 29 marzo, 2 ind. a Bardolino (VR) l’8 marzo (S. Tascio, L. Dalla Libera, E. Catalano, M. Sighele et al. [3] [4] [7]).

Edredone *Somateria mollissima*

- 1 ind. a Punta Sabbioni, Cavallino-Treporti (VE), il

24 gennaio (A. Nardotto [4] [5]).

Orchetto marino *Melanitta nigra*

- 4 ind. a Eraclea (VE) l’8 gennaio (G. Sgorlon).
- 2 ind. a Pacengo (VR) il 14 gennaio (C. Izzo, C. Chiappisi et al. [3]).
- 1-6 ind. alla Busa de Giaretta (PD) tra il 2 e il 17 maggio (F. Moretto, G. Nassi, N. Adestrini et al. [4] [6]).
- 1 ind. alla foce del Tagliamento, San Michele al Tagliamento (VE), il 13 settembre (A. Bertoli, M. Toller [4]).
- 3 ind. a Caorle (VE) tra il 23 e il 29 novembre (P. Geromel, P. Vacilotto, A. Bossi, F. Piccolo [4] [6]).
- 4 ind. nel mare antistante Valle Vecchia, Caorle (VE), tra il 27 dicembre e il 4 gennaio 2025 (T. Bisol, D. Speggiorin, M. Stenico et al. [4] [6]).
- 1 ind. alla foce del Po di Maistra (RO) il 31 dicembre (L. Seltz, V. Raigel [4]).

Quella della Busa de Giaretta rappresenta la prima segnalazione nota per la provincia di Padova.

Orco marino *Melanitta fusca*

- 2-3 ind. a Malcesine (VR) l’8 e il 9 gennaio (R. Boscaini, L. Veronesi [3] [4]).
- 2-6 ind. tra Garda e Lazise (VR) il 13 e il 14 gennaio (A. Pasqua, E. Cavallini, C. Izzo et al. [3] [4]).
- 1 ind. a Cavallino-Treporti (VE) il 24 gennaio (A. Nardotto [4]).
- 1 ind. in Sacca di Scardovari, Porto Tolle (RO), l’11 febbraio (G. Londi, B. Perroud et al. [4] [6]).
- 5 ind. a Cavallino-Treporti (VE) il 2 dicembre (F. Piccolo [4] [6]).
- 5 ind. a Campagna Lupia (VE) il 16 dicembre (A. Nardotto [4]).

Quattrocchi *Bucephala clangula*

Si elencano segnalazioni in località inusuali.

- 1 ind. in Valle Vecchia, Caorle (VE), il 20 gennaio (R. Corvino).
- 3 ind. in Sacca di Scardovari, Porto Tolle (RO), il 16 dicembre, 1 ind. il 21 dicembre (M. Carabella, E. Verza [4]).

Pesciaiola *Mergellus albellus*

- 1 ind. in Valle Boccavecchia, Rosolina (RO), il 9 gennaio (censimenti Sagittaria).

Smergo maggiore *Mergus merganser*

Si elencano segnalazioni in siti inusuali sull’Adige e nel Delta del Po.

- 2-6 ind. nella gola di Ceraino, Dolcè e Rivoli Veronese (VR), tra il 13 e il 28 gennaio, 1 ind. il 28 aprile, 2-3 ff. l’11 e il 13 maggio (S. Grossule, R. Boscaini, M. Azzolini [3]), dove poi 1 cp. ha nidificato per la prima volta su una parete in destra Adige.

- 2-3 ind. nel centro di Verona tra il 20 gennaio e il 21 febbraio (C. Zanini, V. Fanelli, R. Fiorentini et al. [3]).
- 4-14 ind. tra Parona, Verona, e Volargne, Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR), tra il 20 gennaio e il 5 maggio (R. Boscaini, S. Grossule, C. Chiappisi, M. Sighele et al. [3]).
- 2 ind. a San Michele Extra, Verona, il 28 aprile (C. Chiappisi [3]).
- 2 ind. in Sacca di Scardovari, Porto Tolle (RO), il 4 maggio (M. Carnici, L. Lombardo et al. [6]).
- 1 f. in Lessinia al confine tra i comuni di Vestenanova (VR) e Crespadoro (VI) il 6 giugno (G. Nassi [3]).
- 1 ind. in Laguna Vallona, Porto Viro (RO), il 23 novembre (M. Cargasacchi [4]).
- 1 cp. nella gola di Ceraino, Dolcè e Rivoli Veronese (VR), il 6 dicembre (R. Boscaini [4]).

Fistone turco *Netta rufina*

Si elencano conteggi consistenti e segnalazioni nelle province di Belluno, Treviso e Vicenza, dove la specie è poco frequente o poco numerosa.

- 236-700 ind. nel Golfo di Peschiera (VR) tra il 7 gennaio e il 2 marzo (S. Tascio, C. Izzo, G. Speranza et al. [1] [3] [4]).
- 2 m. e 1 f. al Lago di Santa Croce (BL) tra il 25 marzo e il 3 maggio (M. Cassol, G. Feltrin).
- 2-3 ind. a Casier (TV) il 30 marzo e il 26 aprile (R. Storer, A. Montemagno [4]).
- 2 ind. al Lago di Busche (BL) il 28 aprile (P. Grotto [4]).
- 2 ind. a Revelin, Caldognو (VI), il 18 maggio (E. Carta, G. Nassi [4]).
- 6 ind. al Lago di Alleghe (BL) il 13 agosto (J. Shree [6]).
- 1 ind. a Sandrigo (VI) il 24 agosto (G. Nassi [4]).

Moretta tabaccata *Aythya nyroca*

Si elencano le segnalazioni più interessanti come conteggio o periodo e una in provincia di Belluno, dove la specie è poco frequente.

- 1-2 ind. al Laghetto del Frassino, Peschiera del Garda (VR), tra il 10 dicembre 2023 e il 24 marzo (L. Milione, G. Passacantilli, L. Dalla Libera, S. Tascio et al. [3] [4] - cfr. SIGHELE et al., 2024).
- 42 ind. in provincia di Venezia tra il 9 e il 12 gennaio (BASSO, 2024).
- 1 ind. tra Lazise e Bardolino (VR) il 14 gennaio (V. Fanelli et al.).
- 1 ind. a Bacucco, Ariano nel Polesine (RO), il 16 gennaio (M. Passarella [4]).
- 2 ind. al Lago di Santa Croce (BL) il 30 aprile (G. Feltrin).
- 2 ind. a Caldognو (VI) il 28 maggio e in seguito dall'8 al 15 agosto (E. Carta, G. Nassi).
- 1 ad. con 2 juv. in Cassa di Colmata D/E, Mira (VE), il 27 giugno (F. Scarton [4]).

- 28 ind. in Valle Vecchia, Caorle (VE), il 14 ottobre (G. Sgorlon).
- 2 ind. in Valle Ca' Zuliani, Porto Tolle (RO), il 7 dicembre (O. Martini).
- 1 ind. al Laghetto del Frassino, Peschiera del Garda (VR), il 30 dicembre (G. Dalle Vedove, L. Chesini [4]).

Moriglione *Aythya ferina*

Si elencano conteggi consistenti.

- 22.236 ind. in provincia di Venezia tra il 9 e il 12 gennaio (BASSO, 2024).
- 3.130-5.000 ind. al Laghetto del Frassino, Peschiera del Garda (VR), tra il 14 gennaio e il 25 febbraio (Verona Birdwatching et al. [1] [3] [4]).
- 3.000 ind. in Valle Ca' Zuliani, Porto Tolle (RO), il 24 settembre (V. Bellettato, E. Piva).

Moretta *Aythya fuligula*

Si elencano un conteggio consistente e segnalazioni in provincia di Vicenza, dove la specie è poco frequente.

- 2.000-5.000 ind. al Laghetto del Frassino, Peschiera del Garda (VR), tra il 3 gennaio e il 25 febbraio (Verona Birdwatching, A. Pasqua, L. Bonomelli et al. [3] [4]).
- 16 ind. a Sandrigo (VI) dal 23 gennaio al 17 marzo (P. Benedetti et al.).
- 3 ind. a Sandrigo (VI) dal 16 al 29 novembre (P. Benedetti).

Aythya ferina* x *Aythya fuligula

- 1 ind. a Paese (TV) il 15 gennaio (L. Boscain).

Moretta grigia *Aythya marila*

- 2-6 ind. al Laghetto del Frassino, Peschiera del Garda (VR), tra il 10 dicembre 2023 e il 13 gennaio, 23 ind. tra il 14 gennaio e il 13 marzo (L. Milione, G. Passacantilli, Verona Birdwatching et al. [3] [4] - cfr. SIGHELE et al., 2024).
- 2 m. al Lago del Restello, Vittorio Veneto (TV), tra il 14 e il 20 gennaio (G. Feltrin et al.).
- 1 m. al Lago di Santa Croce (BL) il 13 febbraio (G. Feltrin).
- 16-31 ind. a Maraschina, Peschiera del Garda (VR), tra il 18 e il 22 febbraio (M. Sighele, S. Tascio et al. [3] [4]).
- 1 ind. in Valle Vecchia, Caorle (VE), tra il 18 e il 25 febbraio (A. de Faveri, R. Winiger, A. Zappia et al. [4] [6]).
- 2 ind. al Lago di Busche (BL) il 29 ottobre (P. Grotto [4]).
- 1 ind. alla Busa de Giaretta (PD) tra il 23 novembre e il 7 febbraio 2025 (M. Fioretto, F. Moretto et al. [4] [5] [6]).
- 3 ind. al Lago di Fimon, Arcugnano (VI), dall'8 dicembre al 2 marzo 2025 (E. Catalano, M. Dal Zotto et al. [4] [5]).

- 1-3 ind. al Laghetto del Frassino, Peschiera del Garda (VR), tra il 27 dicembre e il 22 febbraio 2025 (R. Magnolini, Verona Birdwatching et al. [3] [4]).
- 1 ind. in Valle Vecchia, Caorle (VE), tra il 30 dicembre e il 4 gennaio 2025 (E. Stival, F. Menegat, A. Sutto et al. [4]).

Quella del Lago di Fimon dovrebbe rappresentare la terza segnalazione recente per la provincia di Vicenza (BON et al., 2004; BONATO & FARRONATO, 2012).

Mestolone *Spatula clypeata*

Si elencano conteggi consistenti.

- 10.746 ind. in provincia di Venezia tra il 9 e il 12 gennaio (BASSO, 2024).
- 1.160 ind. in Valle Ca' Pasta, Porto Viro (RO), il 24 settembre (A. Dal Pozzo, M. Fenati).

Canapiglia *Mareca strepera*

Si elencano conteggi consistenti.

- 2.889 ind. in provincia di Venezia tra il 9 e il 12 gennaio (BASSO, 2024).
- 3.000 ind. in Valle Ca' Pasta, Porto Viro (RO), e 400 ind. in Valle Morosina, Codevigo (PD), il 19 novembre (censimenti Sagittaria).

Fischione *Mareca penelope*

Si riporta un conteggio consistente.

- 42.832 ind. in provincia di Venezia tra il 9 e il 12 gennaio (BASSO, 2024).

Germano reale *Anas platyrhynchos*

Si elencano un conteggio consistente e una nidificazione in periodo inusuale.

- 42.573 ind. in provincia di Venezia tra il 9 e il 12 gennaio (BASSO, 2024).
- Riproduzione accertata a Treviso con 12 pulli il 28 gennaio (L. Boscain [4]).

Netta rufina x *Anas platyrhynchos*

- 1 ind. a Malcesine (VR) il 14 ottobre (M. Azzolini [3]), dove era stato segnalato anche in precedenza (SIGHELE et al., 2020, 2021, 2023, 2024).

Codone *Anas acuta*

Si riportano un conteggio consistente e segnalazioni nelle province di Vicenza e Belluno, dove la specie è poco frequente.

- 31.985 ind. in provincia di Venezia tra il 9 e il 12 gennaio (BASSO, 2024).
- 2 ind. a Stagni di Casale, Vicenza, il 16 febbraio (P. Benedetti [4]).
- 5 ind. ad Arzignano (VI) il 9 marzo (S. Rizzi [4]).
- 4 ind. a Trissino (VI) il 15 marzo (M. Bertacco [4]).
- 1 f. al Lago di Busche (BL) il 7 settembre (P. Grotto [4]).

Alzavola *Anas crecca*

Si riporta un conteggio consistente.

- 291.705 ind. in provincia di Venezia tra il 9 e il 12 gennaio (BASSO, 2024).

Phoenicopteriformes

Phoenicopteridae

Fenicottero *Phoenicopterus roseus*

Si elencano conteggi consistenti, individui marcati di un certo interesse e una segnalazione in situ inusuale.

- 22.381 ind. in provincia di Venezia tra il 9 e il 12 gennaio (BASSO, 2024).
- 1 ind. in Valle Bagliona, Porto Viro (RO), il 13 febbraio, marcato con anello colorato spagnolo "C/AN" (J. Peruzzo, A. Sartori); era stato applicato da pullo a Veta de la Arena, Huelva, Spagna, il 27 luglio 2011. Prima osservazione dal giorno della marcatura.
- 1 ind. in Laguna di Venezia, Venezia, il 3 marzo e il 14 aprile, marcato con anello colorato francese "CBJC" (A. Luchetta, I. Occhipinti, S. Furlanetto, A. Sartori); era stato applicato da pullo a Étang du Fangassier, Buches-du-Rhône, Francia, il 20 luglio 1994. Età 30 anni osservato più volte in Italia, Francia, Grecia e Spagna.
- 1 ind. in Valle Pozzatini Nuovi, Rosolina (RO), il 9 marzo, marcato con anello colorato italiano "ITT" (A. Sartori); era stato applicato da pullo nelle Saline di Comacchio (FE) il 10 luglio 2001. Ultima osservazione in Italia nel 2012 in Toscana mentre nel 2018 è stato segnalato in Francia.
- 1 ind. in Laguna di Venezia, Chioggia (VE), il 3 maggio, marcato con anello colorato turco "T/CNC" (A. Sartori); era stato applicato da pullo a Camaltı Tuzlaşı, Gediz Deltasi, Turchia, il 31 luglio 2005. Osservato in Portogallo e Spagna e Italia, prima osservazione per il Veneto.
- 1 ind. in Valle Bagliona, Porto Viro (RO), il 15 maggio, marcato con anello colorato francese "CSV" (A. Sartori); era stato applicato da pullo a Étang du Fangassier, Bouches-du-Rhône, Francia, il 30 luglio 1997. Età 27 anni, osservato più volte in Italia e Francia, il 5 luglio 2024 era in colonia a Salinas d'Aigues-Mortes in Francia.
- 1 ind. in una pozza piovana lungo il Tartaro nel comune di Giacciano con Baruchella (RO) il 16 maggio (L. Nolan [6]).
- 26 ind. in volo sul Golfo di Peschiera (VR) il 13 luglio, quindi altri 2 ind. alcune ore più tardi (E. Cavallini, M. Sighele, S. Tascio et al. [3] [4]).
- 1 ind. in Laguna di Venezia, Mira (VE), il 15 settembre marcato con anello colorato spagnolo "N/XC" (A. Sartori); era stato applicato da pullo a Marismas del Odiel, Huelva, Spagna, il 20 luglio 2013. Osservato più volte in Francia, prima osservazione in Italia.
- 17.556 ind. in provincia di Venezia e Padova il 3 dicembre, dei quali 9.144 ind. in Valle Dogà, e 8.244 in provincia di Rovigo nella giornata di

censimento nelle zone umide dell'Alto Adriatico (VERZA et al., 2024).

Podicipediformes **Podicipedidae**

Svasso cornuto *Podiceps auritus*

- 1 ind. alla bocca di porto del Lido, Venezia, tra il 20 novembre 2023 e il 20 gennaio (S. Castelli, M.G. Mitri [4] - cfr. SIGHELE et al., 2024).
- 1 ind. in Sacca di Scardovari, Porto Tolle (RO), il 13 febbraio (P. Melandri, G.M. Basso [4]).
- 1 ind. alla bocca di porto del Lido, Venezia, tra il 7 e il 24 novembre (M.G. Mitri, E. Stival [4]).
- 2 ind. alla Busa de Giaretta (PD) l'8 novembre, 1 ind. il 9 dicembre (F. Moretto, G. Nassi [4] [6]).

Quella della Busa de Giaretta rappresenta la quarta segnalazione nota per la provincia di Padova negli ultimi 50 anni (BONATO & FARRONATO, 2012; SIGHELE et al., 2022).

Svasso collorosso *Podiceps grisegena*

- 1 ind. alla bocca di porto di Lido, Venezia, tra il 20 novembre 2023 e il 25 gennaio (M.G. Mitri [4] - cfr. SIGHELE et al., 2024).
- 1 ind. ai laghi di Revine Lago (TV) tra il 15 gennaio e il 7 febbraio (R. Storer, P. Vacilotto et al. [4]).
- 1 ind. a Caorle (VE) il 3 febbraio (A. Sutto [4]).
- 1 ind. al Lago del Mis, Sospirolo (BL), il 13 febbraio (G. Piras [4]).
- 1 ind. a Sant'Erasmo, Venezia, il 6 marzo (F. Scarton [4]).
- 1 ind. al Lago di Santa Croce (BL) il 6 aprile (G. Feltrin).
- 1 ind. alla Busa de Giaretta (PD) tra il 16 aprile e il 4 maggio (F. Moretto, G. Basso et al. [4] [6]).
- 1 ind. a Torri del Benaco (VR) il 28 ottobre (P. Zucca [3] [4]).
- 1 ind. a Punta Sabbioni, Cavallino-Treporti (VE), il 23 e 24 novembre (A. Bossi, E. Stival, P. Geromel [4]).
- 1 ind. in Sacca di Scardovari, Porto Tolle (RO), il 3 dicembre (M. Valente [4]).

Quella del Lago di Revine è la seconda segnalazione nota per la provincia di Treviso (SIGHELE et al., 2020); quelle del Lago del Mis e del Lago di Santa Croce rappresentano la quinta e la sesta segnalazione per la provincia di Belluno negli ultimi 50 anni (CASSOL & NADALET, 1989; ZENATELLO et al., 2008; SIGHELE et al., 2020).

Svasso piccolo *Podiceps nigricollis*

Si riporta una segnalazione in provincia di Belluno, dove la specie è poco frequente.

- 1 ind. al Lago di Santa Caterina ad Auronzo di Cadore (BL) l'1 ottobre (A. Peri [4]).

Cuculiformes **Cuculidae**

Cuculo dal ciuffo *Clamator glandarius*

- 1 ind. a Ca' Tron, Roncade (TV), il 15 marzo (A. Nardotto [4]).
- 1 ind. a Casale di Scodosia e Merlara (PD) tra il 15 luglio e il 7 agosto (F. Gastaldo, S. Rizzi, R. Storer et al. [1] [4] [6]).

Rappresentano la sesta segnalazione nota per la provincia di Treviso e la quarta per quella di Padova (FANTIN, 1979, 1988; SIGHELE et al., 2011, 2012, 2013, 2014, 2015).

Columbiformes **Columbidae**

Tortora orientale *Streptopelia orientalis*

- 1 ind. della ssp. *meena* a Torre Antica, Venezia-Tessera, dal 17 al 26 ottobre (E. Stival et al.) (fig. 2).

Qualora confermata, si tratterebbe della quinta segnalazione italiana, la seconda segnalazione per la regione Veneto dopo l'unica precedente del 1901 (FOSCHI et al., 1996; FULCO & LIUZZI, 2022).

Tortora selvatica *Streptopelia turtur*

Si riporta una segnalazione in periodo inusuale.

- 1 ind. a Papadopoli, Cimadolmo (TV), il 9 dicembre (F. Zanatta).

Colombella *Columba oenas*

Si elencano conteggi consistenti e segnalazioni in località poco note per la specie.

- 20 ind. a Cimadolmo (TV) il 20 gennaio (P. Vacilotto [4]).
- 19 ind. a Borghetto, Valeggio sul Mincio (VR), il 22 gennaio (A. Pavesi [3]).
- 30 ind. a Povegliano Veronese (VR) il 30 gennaio (G. Fasoli [4]).
- 1 ind. a Padova il 16 febbraio (L. Grassi [4]).
- 12 ind. al Laghetto del Frassino, Peschiera del Garda (VR), l'8 aprile (A. Pasqua [4]).
- 1 ind. a Limena (PD) il 20 ottobre (L. Grassi [4]).
- 175 ind. a Villaviera, Caorle (VE), il 23 novembre (F. Salvini [6]).
- 250 ind. a Ca' Dolfin, Porto Tolle (RO), il 21 dicembre (G. Zappaterra).
- 250 ind. al roost in golena di Canalnovo, Villanova Marchesana (RO), il 29 dicembre (A. Barbieri).

Gruiformes **Gruidae**

Gru *Grus grus*

Si elencano stormi consistenti o segnalazioni di individui in sosta in periodo invernale.

- 500 ind. a Cavazzer (VE) il 12 gennaio (A. Tonelli [4]).
- 100-200 ind. nelle risaie di Ca' Mello, Porto Tolle (RO), il 20 e il 21 gennaio (L. Boscain, V. Bellettato [4]).
- 2.500 ind. a Padova e 1.500 ind. a Monselice (PD) il 25 febbraio (L. Grassi, A. Tonelli [4]).
- 800 ind. a Roncade (TV) il 25 febbraio in quattro stormi tra le 11.00 e le 16.00 (P. Gambirasi, C. Bertolin [4]).
- 1.186 ind. a Cendone, Silea (TV), il 25 febbraio in tre stormi tra le 13:20 e le 16:50 (F. Mezzavilla [4]).
- 2.500 ind. a Zero Branco (TV) il 25 febbraio tra le 16:00 e le 17:30 (F. Salvini [4]).
- 1.500 ind. sopra Povegliano Veronese (VR) il 25 febbraio in 5 stormi (E. Cavallini [3]).
- 40 ind. in Valle Segà, Rosolina (RO), il 6 dicembre (V. Bellettato [4]).
- 400 ind. a Mea, Porto Viro (RO), il 10 dicembre (V. Bellettato [4]).
- 20 ind. nei campi a ovest delle risaie di Porto Levante, Porto Viro (RO), il 22 dicembre (S. Leonardi).
- 18 ind. nei campi della Brussa, Caorle (VE), il 23 dicembre (E. Stival).

Rallidae

Voltolino *Porzana porzana*

Si elencano segnalazioni in provincia di Rovigo, dove la specie è poco segnalata.

- 1 ind. a Porto Caleri, Rosolina (RO), il 31 marzo (D. Trombin [4]).
- 1 ind. lungo il Po di Maistra, Porto Tolle (RO), il 2 aprile (D. Trombin [4]).

Folaga *Fulica atra*

Si elencano una segnalazione di individuo marcato e un conteggio consistente.

- 1 ind. in Val di Sogno, Malcesine (VR), tra il 19 ottobre 2023 e il 24 febbraio, marcato con collare polacco "W42" (R. Boscaini, G. Speranza [3] [4]). Il collare era stato applicato da adulto a Sarnów, Polonia, nel giugno 2017, osservato svernare sul Lago di Garda dall'inverno 2017/2018, e tornare in Polonia nel periodo riproduttivo (archivio Polring - SIGHELE et al., 2024).
- 4.000 ind. in Valle Ca' Zuliani, Porto Tolle (RO), il 29 ottobre (V. Bellettato [4]).

Schiribilla *Zapornia parva*

Si elencano segnalazioni in provincia di Padova e di Vicenza, dove la specie è osservata poco frequentemente.

- 1 ind. alla Busa de Giaretta (PD) il 19 aprile (F. Moretto).

- 1 ind. a Caldognone (VI) il 20 agosto (F. Moretto).
- 1 ind. trovata deceduta a Malga Mandrielle, Asiago (VI), in agosto (*fide* R. Corvino).

Schiribilla grigiata *Zapornia pusilla*

- 1 ind. tra Caldognone e Isola Vicentina (VI) il 24 e il 25 giugno (P. Benedetti, I. Chemello, M. Fioretto [4] [5]) (fig. 3).

Le segnalazioni recenti per la regione Veneto sono ora cinque, questa è la prima per la provincia di Vicenza.

Charadriiformes

Burhinidae

Occhione *Burhinus oedicnemus*

Si elencano conteggi interessanti e segnalazioni, anche di riproduzione, da località poco note per la specie.

- 57 ind. a Spresiano (TV) il 7 febbraio (P. Vacilotto [4]).
- 1-2 ind. a Mel, Borgo Valbelluna (BL), tra il 22 e il 24 marzo (R. Deon).
- 1 cp. ha nidificato sul fiume Brenta, presso Carmignano di Brenta (PD), con presenze tra il 4 aprile e il 5 ottobre, osservazione di pulli dal 25 luglio (F. Moretto et al. [4]).
- 1 ind. a Nove (VI) il 21 aprile (F. Moretto).
- 2 ind. a Cartigliano (VI) il 18 agosto (F. Moretto).
- 98 ind. a Spresiano (TV) il 25 ottobre, 58 ind. il 5 dicembre (P. Vacilotto, N. Adestrini [4]).

Le segnalazioni sul Brenta rappresentano la terza segnalazione per la provincia di Padova negli ultimi 50 anni e la prima nidificazione certa (SIGHELE et al., 2023, 2024), quelle in provincia di Vicenza nel XXI sec. sono ora sei (BONATO & FARRONATO, 2012; SIGHELE et al., 2021, 2024; F. Moretto [4]), quella di Mel è la prima segnalazione recente per la provincia di Belluno, dove era segnalato come regolare e nidificante fino all'inizio del XX sec. (NINNI, 1910).

Recurvirostridae

Avocetta *Recurvirostra avosetta*

Si elencano una concentrazione interessante e una segnalazione in località poco nota per la specie.

- 2.850 ind. in Palude di Cona, Venezia, l'1 febbraio (E. Stival).
- 1 ind. in volo sul Golfo di Peschiera (VR) il 29 giugno (C. Chiari [4]).

Cavaliere d'Italia *Himantopus himantopus*

Si riporta una segnalazione in periodo inusuale.

- 1 ind. in Oasi di Ca' Mello, Porto Tolle (RO), il 13 febbraio (M. Valente).

Haematopodidae

Beccaccia di mare *Haematopus ostralegus*

Si elencano una segnalazione al di fuori dell'area costiera e conteggi consistenti.

- 1 ind. al Lido di Venezia, tra il 20 ottobre 2023 e il 6 febbraio marcato con bandierina polacca "JC" (M.G. Mitri, G. Piras); la marcatura era stata applicata nell'aprile 2019 a Wisła, Polonia, ed era stata segnalata in Laguna di Venezia anche nell'inverno 2019/2020 e il 16 gennaio 2023 (A. Talamelli - cfr. SIGHELE et al., 2024).
- 6 ind. in volo sul Golfo di Peschiera (VR) il 6 marzo (L. Milione, G. Passacantilli [4]).
- 300 ind. nel Canale Piovego, Campagna Lupia (VE), il 21 agosto (F. Scarton [4]).
- 350 ind. nel Canale Piovego, Campagna Lupia (VE), il 19 novembre (F. Scarton [4]).

Charadriidae

Pivieressa *Pluvialis squatarola*

Si riporta una segnalazione al di fuori dell'area costiera.

- 4 ind. a Vò Pindemonte, Isola della Scala (VR), il 31 maggio (G. Fasoli [3] [4]).

Piviere dorato *Pluvialis apricaria*

Si elencano i conteggi più consistenti.

- 4.000 ind. a Caorle, Porto Baseleghe e San Michele al Tagliamento (VE), il 3 gennaio (T. Bisol [4] [6]).
- 1.000 ind. in Bonifica Prati Nuovi, San Michele al Tagliamento (VE), il 20 gennaio (A. Sutto [4]).

Corriere grosso *Charadrius hiaticula*

Si riporta un conteggio consistente.

- 200 ind. alla foce del Po di Maistra, Porto Tolle (RO), il 6 settembre (T. Bisol, P. Bisol, N. Fagotto [4] [6]).

Pavoncella *Vanellus vanellus*

Si riporta una segnalazione in provincia di Belluno, dove la specie è poco numerosa.

- 100 ind. a Santa Giustina (BL) il 24 febbraio (G. de Nadai [4]).

Scolopacidae

Chiurlo piccolo *Numenius phaeopus*

Si elencano una segnalazione al di fuori dell'area costiera e un conteggio interessante.

- 15 ind. in volo in Ca' Tron, Roncade (TV), il 5 aprile (A. Nardotto [4]).
- 62 ind. in Sacca di Scardovari, Porto Tolle (RO), il 19 luglio (M. Fenati, A. Sartori, P. Scarpa [4]).

Chiurlo maggiore *Numenius arquata*

Si elencano segnalazioni in provincia di Vicenza, dove la specie è poco frequente.

- 2 ind. a Caldognio (VI) il 29 marzo (D. Speggiorin, P. Speggiorin).
- 2 ind. a Isola Vicentina (VI) il 14 agosto (F. Moretto).

Pittima minore *Limosa lapponica*

Si elencano segnalazioni in periodo invernale e quelle in provincia di Padova, dove la specie è poco frequente.

- 2 ind. in Sacca di Bottonera, Porto Tolle (RO), l'1 gennaio, 4 ind. il 20 gennaio, 17 ind. nel Delta del Po (RO) l'8 gennaio (P. Melandri, M. Tassinari [4], censimenti Sagittaria).
- 1 ind. in Valle San Leonardo, Porto Viro (RO), il 20 gennaio (L. Boscain, M. Cargasacchi, F. Piccolo, E. Stival [4]).
- 15 ind. nel Lago di Ravaggio, Campagna Lupia (VE), il 23 gennaio (F. Scarton [4]).
- 7 ind. in Palude Maggiore, Venezia, il 24 gennaio (A. Nardotto [4]).
- 1 ind. alla Spiaggia della Boschettona, Codevigo (PD), l'1 dicembre (F. Menegat [4]).
- 11 ind. in Palude Maggiore, Venezia, il 9 dicembre (A. Nardotto [4]).

Pittima reale *Limosa limosa*

Si elencano segnalazioni nelle province di Verona e di Vicenza, dove la specie è poco frequente.

- 1 ind. a Vallese, Oppeano (VR), il 20 aprile (S. Grossule [3]).
- 2 ind. a Caldognio (VI) dal 4 al 20 agosto (D. Speggiorin, P. Speggiorin et al.).

Frullino *Lymnocryptes minimus*

Si elencano segnalazioni nelle province di Padova e di Venezia, dove la specie è poco frequente.

- 1 ind. alla Spiaggia della Boschettona, Codevigo (PD), il 13 settembre (W. Müller [4]).
- 2 ind. a Valli di Brenta, Chioggia (VE), il 28 novembre (F. Scarton [4]).

Beccaccia *Scolopax rusticola*

Si elencano conteggi interessanti.

- 10 ind. a Salgareda (TV) il 22 gennaio (M. Cassol [4]).
- 7 ind. a Morgano (TV) il 29 novembre (F. Salvini, S. Morato [4]).

Croccolone *Gallinago media*

- 2 ind. in Sacca di Scardovari, Porto Tolle (RO), il 10 settembre (D. Trombin [4]).

Dovrebbe trattarsi della seconda segnalazione per la provincia di Rovigo nel XXI sec. (VERZA & SIGHELE, 2019).

Piro piro piccolo *Actitis hypoleucus*

Si riporta la segnalazione di una aberrazione di piumaggio.

- 1 ind. melanico a Valli di Brenta, Chioggia (VE), il 6 settembre (F. Piccolo [4] [6]).

Albastrello *Tringa stagnatilis*

Si elencano una segnalazione in periodo inusuale e una in provincia di Vicenza, dove la specie è di comparsa occasionale.

- 2 ind. in Valle Ca' Pisani, Porto Viro (RO), il 5 marzo (N. Adestrini [4]).
- 2 ind. a Isola Vicentina (VI) il 4 agosto (D. Spiggiorin, P. Spiggiorin).

Quella di Isola Vicentina è la prima segnalazione per la provincia di Vicenza negli ultimi 50 anni.

Pettegola *Tringa totanus*

Si riporta una segnalazione in provincia di Vicenza, dove la specie è poco frequente.

- 1 ind. tra Caldognو e Villaverla (VI) il 4 agosto e l'1 settembre (M. Fioretto, G. Nassi [4] [5]).

Totano moro *Tringa erythropus*

Si elencano segnalazioni in provincia di Treviso, dove la specie è piuttosto scarsa, e di Belluno, dove è occasionale.

- 1 ind. a Castelfranco Veneto (TV) il 10 aprile (P. Vacilotto [4]).
- 1 ind. al Lago di Busche (BL) il 28 aprile (P. Grotto [4]).

Si tratta della prima segnalazione recente per la provincia di Belluno, le precedenti alla fine del XX sec. (CASSOL, 1987; ZENATELLO et al., 1998).

Pantana *Tringa nebularia*

Si riporta una segnalazione di individuo marcato.

- 1 ind. in Paliaga, Venezia-Tessera, il 23 aprile, marcata con anello colorato italiano "KL" (A. Sartori); era stato applicato da adulto a Comacchio (FE) il 6 luglio 2020 (P. Micheloni/archivio ISPRA).

Piovanello maggiore *Calidris canutus*

Si elencano segnalazioni invernali, quando la specie è poco numerosa, e conteggi interessanti.

- 7 ind. nel Delta del Po (RO) l'8 e il 9 gennaio (censimenti Sagittaria).
- 30 ind. in Valle San Leonardo, Porto Viro (RO), il 20 gennaio (L. Boscain, M. Cargasacchi, F. Piccolo, E. Stival [4]).
- 1 ind. in Palude Maggiore, Venezia, il 24 gennaio (A. Nardotto [4]).
- 15 ind. alla foce del Po di Maistra (RO) il 6 marzo (F. Piccolo [4]).

Combattente *Calidris pugnax*

Si elencano segnalazioni in località inusuali in provincia di Treviso, dove la specie è poco frequentemente segnalata, e segnalazioni invernali.

- 75 ind. nei pressi di Cavasgra, Vedelago (TV), il 29 marzo (F. Salvini [4]).
- 21 ind. alle Grave di Papadopoli, presso Cimadolmo (TV), l'1 aprile (P. Vacilotto [4]).
- 5-25 ind. nei pressi di Salvatronda, Castelfranco Veneto (TV), tra il 10 e il 14 aprile (R. Store, P. Vacilotto E. Pavan [4]).
- 1-3 ind. in Valle Vecchia, Caorle (VE), tra il 24 dicembre e il 25 gennaio 2025 (G. Piras, N. Fagotto, D. e P. Spiggiorin et al. [4] [6]).

Gambecchio frullino *Calidris falcinellus*

- 4 ind. in Sacca di Bottonera, Porto Tolle (RO), il 17 maggio (A. Farioli, M. Fenati [4]).

Piovanello comune *Calidris ferruginea*

Si elencano segnalazioni in provincia di Padova, dove la specie è poco frequente.

- 2 ind. in Valle Millecampi, Codevigo (PD), l'1 maggio (E. Cecconello [4] [5]).
- 1 ind. alla Busa de Giaretta (PD) il 18 luglio (F. Moretto).

Gambecchio nano *Calidris temminckii*

Si elencano segnalazioni in località poco note per la specie.

- 1-2 ind. alla Busa de Giaretta (PD) il 22 e 25 aprile (F. Moretto).
- 1 ind. a Caldognو (VI) il 24 aprile (E. Carta et al.).
- 1 ind. a Villaverla (VI) l'1 settembre (G. Nassi).

Piovanello tridatillo *Calidris alba*

Si elencano le maggiori concentrazioni.

- 210 ind. a Chioggia (VE) il 25 gennaio (P. Scarpa [4]).
- 250-275 ind. a Chioggia (VE) il 17 e il 21 dicembre (M. Carabella, E. Stival [1] [4]).

Piovanello pancianera *Calidris alpina*

Si elencano una segnalazione in provincia di Vicenza, dove la specie è poco frequente, e individui marcati di un certo interesse.

- 1 ind. tra Caldognо e Isola Vicentina (VI) tra il 4 e il 7 agosto (D. Spiggiorin, P. Spiggiorin, F. Moretto [4]).
- 1 ind. in Laguna di Venezia, Chioggia (VE), il 10 agosto, marcato con bandierina polacca "8Z6" (A. Sartori); era stata applicata da adulto a Ujscie Wilshy, Pomorskie, Polonia, il 7 agosto 2021.
- 1 ind. in Laguna di Venezia, Chioggia (VE), il 13 agosto, marcato con anello colorato ucraino "A56" (J. Peruzzo, A. Sartori); era stato applicato da adulto a Tiligulskiy liman, Mikolayiv, Ucraina, il 17 maggio 2020.
- 1 ind. in Laguna di Venezia, Chioggia (VE), l'1 settembre, marcato con bandierina ungherese "PLE" (A. Sartori); era stata applicata da adulto a Sarrod, Gyron-Moson-Sopron, Ungheria il 5 settembre 2021.

Gambecchio comune *Calidris minuta*

Si elencano segnalazioni in provincia di Vicenza, dove la specie è poco frequente, e una segnalazione invernale.

- 2 ind. a Capovilla, Caldognو (VI), il 6 aprile e 1 ind. il 7 aprile (G. Nassi, M. Fioretto [4] [5]).
- 1 ind. a Novoledo, Villaverla (VI), il 22 agosto (R. Corvino).
- 10 ind. in Palude Maggiore, Venezia, il 27 dicembre (A. Nardotto [4]).

Glareolidae**Pernice di mare *Glareola pratincola***

Si elencano segnalazioni nelle province di Padova e Venezia, dove la specie è poco frequente, e un conteggio interessante.

- 2 ind. a Correzzola (PD) il 19 e il 26 aprile (A. Tonelli [4]).
- 1-2 ind. nel Canale dei Lovi, Caorle (VE), il 4 maggio (V. Polo, E. Stival [4]).
- 2 ind. a Caorle (VE) il 23 maggio (A. Nardotto [4]).
- 1 cp. nidificante in Valle Morosina, Codevigo (PD), con un pullo presente il 26 giugno (L. Sattin [5]).
- 50 ind. in attività trofica su Valle Spolverina, Rosolina (RO), il 21 settembre (F. Barbieri).

Quella di Valle Morosina rappresenta la prima nidificazione accertata per il Padovano.

Laridae**Sterna maggiore *Hydroprogne caspia***

Si elencano segnalazioni nelle province di Treviso e Verona, dove la specie è irregolare, e conteggi interessanti.

- 1 ind. a Morgano (TV) il 25 aprile (S. Morato, F. Salvini [4]).
- 1 ind. alle cave di Casale sul Sile (TV) l'11 maggio (E. Pavan [4]).
- 1 ind. al Laghetto del Frassino, Peschiera del Garda (VR), e poco dopo nel Golfo di Peschiera (VR) il 4 agosto, 1 ind. al Laghetto del Frassino il 7 agosto (E. Jantke [3] [4] [5]).
- 1 ind. in volo nel Porto di Brenzone (VR) l'11 agosto (E. Catalano [3] [4]).
- 1-2 ind. alle cave di Casale sul Sile (TV) il 12 e il 13 agosto, 3-4 ind. dal 26 agosto all'8 settembre (R. Storer, F. Scarton [4]).
- 20 ind. in Valle Ca' Pisani, Porto Viro (RO), il 6 settembre (T. Bisol, N. Fagotto [4] [6]).
- 17-20 ind. alla Palude di Cona, Venezia, l'1, il 6 e il 28 settembre (M. Cappelletto, E. Stival, F. Menegat [1] [4] [6]).

Sterna zampenere *Gelochelidon nilotica*

Si elencano segnalazioni in località poco note per la specie e una conteggio interessante in provincia di Venezia.

- 2 ind. a Monastier di Treviso (TV) il 2 giugno (L. Boscain [4]).
- 2 ind. a Vo' Pindemonte, Isola della Scala (VR), il 6 giugno (A. Zoccatelli [3]).
- 1 ind. a Resana (TV) il 22 giugno (G. Piras [4]).
- 2 ind. a Santa Teresa in Valle, Cerea (VR), il 2 luglio (L. Dalla Libera [3] [4]).
- 27 ind. a Campagna Lupia (VE) il 26 luglio (P. Scarpa [4]).
- 1-4 ind. a Casale di Scodosia e Piacenza d'Adige (PD) tra il 4 e il 10 agosto (A. Sala, M. Sighele, G. Sighele, T. Bisol et al. [4] [6]).

Mignattino piombato *Chlidonias hybrida*

Si elencano le segnalazioni più interessanti per località o periodo.

- 1 ind. in Valle Vecchia, Caorle (VE), il 24 aprile, 9 e 14 maggio (P. Vacilotto, G. Sgorlon [4]).
- 1-10 ind. a Correzzola (PD) tra il 25 aprile e il 31 maggio (A. Tonelli, F. Piccolo, G. Nassi, G. Piras, L. Grassi [4]).
- 3 ind. alla Busa de Giaretta (PD) il 6 maggio (F. Moretto).
- 1 ind. a Caldognو (VI) il 6 maggio (M. Fioretto [5]).
- 1 ind. all'Oasi Cave di Gaggio, Marcon (VE), il 7 maggio (L. Busatto [4]).
- 1 ind. a Caldognо (VI) il 19 luglio (D. Speggiorin, P. Speggiorin [4]).
- 1 ind. alla Busa de Giaretta (PD) il 13 e 14 settembre (F. Moretto, G. Piras [4] [6]).

Mignattino al bianche *Chlidonias leucopterus*

Si riporta una segnalazione in località poco nota per la specie.

- 1 ind. a Correzzola (PD) il 5 maggio (T. Bisol [6]).

Mignattino comune *Chlidonias niger*

Si elencano un conteggio interessante e segnalazioni in provincia di Belluno, dove la specie è irregolare.

- 250 ind. alla Busa de Giaretta (PD) il 26 aprile (L. Boscain et al. [4] [6]).
- 10 ind. al Lago di Santa Croce (BL) il 3 maggio (G. Feltrin).
- 1 ind. al Lago di Busche (BL) il 19 luglio (E. Carta [4]).

Gabbianello *Hydrocoloeus minutus*

Si elencano segnalazioni inusuali per periodo o località.

- 1-2 ind. alla Busa de Giaretta (PD) il 19 e 25 aprile e il 6-10 maggio (E. Carta, S. Rizzi, L. Dalla Libera, T. Bisol et al. [4] [6]).
- 1 ind. al Lago di Santa Croce (BL) il 3 maggio

- (G. Feltrin).
- 31-38 ind. a Marcon (VE) tra l'1 e il 3 giugno (E. Stival, R. Storer, F. Salvini [4]).
 - 1-9 ind. in Valle Millecampi e Spiaggia della Boschettona, Codevigo (PD), tra il 26 giugno e il 13 settembre (G. Piras, T. Bisol, N. Fagotto, D. de Marchi, P. Scarpa et al. [4] [6]).

Gabbiano tridattilo *Rissa tridactyla*

- 1 ind. in Valle Vecchia, Caorle (VE), il 26 aprile (L. Boscain, P. Vacilotto, M. Cargasacchi, F. Piccolo [4]).

Gabbiano roseo *Chroicocephalus genei*

Si elencano conteggi interessanti e una segnalazione in località poco nota per la specie.

- 47 ind. nel Delta del Po nord (RO) l'8 gennaio (censimenti Sagittaria).
- 500 ind. in Sacca di Scardovari, Porto Tolle (RO), il 4 maggio (M. Camici, L. Lombardo et al. [6]).
- 4 ind. in Valle Millecampi, Codevigo (PD), il 14 agosto (R. Alba [6]).

Quella di Valle Millecampi rappresenta la quarta segnalazione nota per la provincia di Padova (SIGHELE et al., 2020, 2022, 2023).

Gabbiano comune *Chroicocephalus ridibundus*

Si elencano segnalazioni di individui marcati di un certo interesse.

- 1 ind. a Chioggia (VE) tra il 17 gennaio e il 24 febbraio, marcato con anello colorato ceco "WA74" (P. Scarpa, A. Sartori, E. Stival, F.C. Boscolo); era stato applicato da adulto a Ostrava, Repubblica Ceca, il 23 aprile 2016, da allora segnalato quasi annualmente a Chioggia (A. Talamelli).
- 1 ind. nelle Valli Treportine, Cavallino-Treporti (VE), il 10 maggio, marcato con anello sloveno "B379" (A. Sartori); era stato applicato da pullo a Ptujsko jezero, Ptjui, Slovenia, il 19 luglio 2023.
- 1 ind. a Treviso il 24 luglio, marcato con anello colorato croato "SY87" (P. Vacilotto); era stato inserito come individuo del 2° calendario a Jakusevec, Croazia, il 29 gennaio 2012 (A. Talamelli).
- 1 ind. a Valli di Brenta, Chioggia (VE), il 30 luglio, marcato con anello colorato polacco "TN2V" (A. Nardotto); era stato applicato da pullo a Opolskie, Polonia, il 29 maggio 2013, segnalato quasi annualmente a Chioggia dal 2014 (A. Talamelli).
- 1 ind. in Laguna di Venezia, Venezia, il 4 agosto, marcato con anello colorato croato "S3U2" (A. Sartori); era stato applicato da adulto a Jacusevec, Croazia, il 26 gennaio 2014.
- 1 ind. in Laguna di Venezia, Venezia, il 15 agosto, marcato con anello colorato ceco "WY05" (A. Sartori); era stato applicato da pullo a Kreman, Olomoucky kraj, Repubblica Ceca, il 10 giugno. Osservato precedentemente a Caldognone (VI) il 5 novembre 2023 (M. Fioretto).

- 1 ind. in Laguna di Venezia, Mira (VE), il 7 settembre, marcato con anello colorato ucraino "U982" (A. Sartori); era stato applicato da adulto a Barmaki, Rivne O., Ucraina, il 3 luglio 2021.
- 1 ind. in Valle Veniera, Rosolina (RO), il 3 novembre, marcato con anello colorato bielorusso "K657" (A. Sartori); era stato applicato da pullo a Petrinov, Bielorussia, il 17 giugno 2024.
- 1 ind. a Silea (TV) il 23 novembre, marcato con anello colorato polacco "TXYP" (P. Vacilotto); era stato applicato da adulto a Zbiornik, Polonia, il 7 giugno 2018.
- 1 ind. in Laguna di Venezia, Venezia, il 5 dicembre, marcato con anello colorato serbo "YCXX" (A. Sartori); era stato applicato da adulto a Novi Sad, Serbia, il 30 dicembre 2025.

Gabbiano sghignazzante *Leucophaeus atricilla*

- 1 ind. alla foce del Tagliamento, prima a Lignano Sabbiadoro (UD) e poi a Bibione, San Michele al Tagliamento (VE), il 24 luglio (W. Van Gasse [6]) (fig. 4).

Qualora confermata, si trattrebbe della sesta segnalazione italiana, la prima per la regione Veneto (FRACASSO et al., 2018).

Gabbiano corallino *Ichthyaetus melanocephalus*

Si elencano conteggi consistenti, segnalazioni in provincia di Verona e Belluno, dove la specie è poco frequente, in particolare in quota, e individui marcati di un certo interesse.

- 5.083 ind. in provincia di Venezia tra il 9 e il 12 gennaio (BASSO, 2024).
- 1 ind. in volo al Pigarolo, Roverè Veronese (VR), 1500 m s.l.m., il 17 marzo (M. Azzolini [3]).
- 1 ind. in Valle Pozzatini, Rosolina (RO), l'11 aprile, marcato con anello colorato francese "RN4T" (A. Sartori); era stato applicato da pullo a Polder de Sebastopol, Pays de la Loire, Francia, l'1 luglio 2017.
- 140-160 ind. a Villaverla (VI) il 24 aprile (M. Fioretto [5]).
- 1 ind. nella lunata esterna alla diga di Chioggia (VE), il 17 luglio, marcato con anello colorato ungherese "HU91" (A. Sartori); era stato applicato da adulto a Szeged, Csongrad-Csanad, Ungheria, il 12 giugno 2011. Osservato in Ungheria, Spagna, Portogallo, Francia e con regolarità in Laguna di Venezia dal 2011 (M. Basso, R. Faè, A. Sartori, L. Sattin et al.).
- 1 ind. a Forcella Aurine, Gosaldo (BL), 1300 m s.l.m., il 26 luglio (B. Bressan [6]).
- 1.286 ind. in Laguna Sud di Venezia il 17 agosto (A. Sartori).
- 1 ind. in Laguna di Venezia, Mira (VE), il 17 agosto, marcato con anello colorato ceco "ZFL1" (A. Sartori); era stato applicato da pullo a Ryehvald, Moravskoslezsky, Repubblica Ceca, il 30 maggio 2024.

- 1 ind. in Laguna di Venezia, Venezia, il 24 agosto, marcato con anello colorato belga “3V8H” (A. Sartori); era stato applicato da adulto a Beveren, Oost Vlaanderen, Belgio, il 20 maggio 2024.
- 7 ind. al Lago di Busche (BL) il 20 settembre (P. Grotto [4]).

Chroicocephalus ridibundus* x *Ichthyaetus melanocephalus

- 1 ind. al Parco di San Giuliano, Venezia, il 29 marzo (E. Stival).

Gavina *Larus canus*

Si elencano segnalazioni in periodo inusuale.

- 1 ind. a Villaviera, Caorle (VE), il 4 maggio (E. Stival, V. Polo).
- 1 ind. nei pressi di Torri di Quartesolo (VI) il 9 maggio (S. Rizzi [4]).
- 1 ind. a Valli Treportine, Cavallino-Treporti (VE), il 10 maggio (A. Sartori).

Gabbiano reale pontico *Larus cachinnans*

Si elencano segnalazioni in località poco note per la specie, individui marcati e la segnalazione col conteggio maggiore.

- 1 ind. in Sacca di Bottonera, Porto Tolle (RO), il 6 gennaio (A. Amaretti [4]).
- 1 ind. a Cava Le Bandie, Villorba (TV), l'11 gennaio (L. Boscaïn [4]).
- 1 ind. a Porto Marghera, Venezia, il 28 gennaio, marcato con anello colorato ceco “775:U” (A. Sartori); era stato applicato da pullo a Pasohlavky, jihomoravski, Repubblica Ceca, il 25 maggio 2022.
- 1 ind. a Porto Marghera, Venezia, il 28 gennaio, marcato con anello colorato ungherese “E770” (A. Sartori); era stato applicato da pullo a Bakonszeg, Hajdù-Bihar, Ungheria, il 29 maggio 2023.
- 1 ind. a Stienta (RO) il 22 febbraio (P. Melandri [4]).
- 4 ind. all'ecocentro di Chioggia (VE) il 9 dicembre (P. Scarpa [4]).

Zafferano *Larus fuscus*

Si elencano segnalazioni in località poco note per la specie.

- 1 ind. in Sacca di Bottonera, Porto Tolle (RO), tra il 5 gennaio e il 4 maggio, 3 ind. il 9 gennaio (E. Castellucci, M. Castellucci, G. Nassi, P. Melandri et al. [4]).
- 1 ind. a Grisignano di Zocco (VI) il 15 gennaio (G. Piras).
- 1 ind. a Torri di Quartesolo (VI) l'11 febbraio (M. Dal Zotto).
- 1 ind. a Villaverla (VI) il 24 aprile (G. Nassi).
- 1 ind. a Grisignano di Zocco (VI) il 17 maggio (G. Piras).

- 1-2 ind. in Sacca di Bottonera, Porto Tolle (RO), tra il 6 settembre e il 27 febbraio 2025 (censimenti Sagittaria, P. Melandri, V. Bellettato et al. [4]).
- 1 ind. a Limena (PD) il 7 dicembre (L. Grassi [4]).

Gaviiformes

Gaviidae

Strolaga minore *Gavia stellata*

Si elencano le segnalazioni al di fuori della provincia di Venezia, dove la specie è stata segnalata più volte dapprima fino al 13 aprile, quindi a partire dall'11 novembre.

- 1 ind. in Sacca di Scardovari, Porto Tolle (RO), l'11 e il 12 gennaio (F. Salvini, G. Bencivenga, S. Tito).
- 1 ind. in Sacca di Scardovari, Porto Tolle (RO), il 5 e il 6 marzo (M. Passarella, F. Piccolo [4]).
- 1 ind. alla Busa de Giaretta (PD) tra il 16 giugno e il 3 agosto (F. Moretto, G. Basso et al. [4] [6]).
- 1 ind. in Sacca di Scardovari, Porto Tolle (RO), tra il 16 novembre e il 29 dicembre (M. Cargasacchi, F. Piccolo et al. [4]).
- 1 ind. in Laguna di Barbamarco, Porto Tolle (RO), il 2 dicembre (M. Fenati [4]).
- 1 ind. recuperato in difficoltà a Legnago (VR) il 2 dicembre (CRAS Progetto Natura Verona Lago).

Strolaga maggiore *Gavia immer*

- 1 ind. a Pellestrina, Venezia, il 3 e il 4 gennaio (P. Scarpa [4]).
- 1 ind. in Sacca di Scardovari, Porto Tolle (RO), tra il 4 gennaio e il 16 marzo (F. Bonucci et al. [4]).
- 1 ind. nel Golfo di Peschiera (VR) il 9 marzo (L. Dalla Libera, A. De Angelis [3] [4]).

Quella di Scardovari è la quinta segnalazione nota per la provincia di Rovigo negli ultimi 50 anni, quella di Peschiera la terza in assoluto per la provincia di Verona (FOSCHI et al., 1996; BON & SEMENZATO, 2002; BON et al., 2004; SIGHELE et al., 2011; VERZA & SIGHELE, 2019).

Strolaga mezzana *Gavia arctica*

Si riporta una segnalazione in periodo inusuale.

- 2 ind. a Navene, Malcesine (VR), l'11 giugno (R. Boscaïni [3]).

Procellariiformes

Procellariidae

Berta maggiore *Calonectris diomedea*

- 1 ind. alla foce del Tagliamento, San Michele al Tagliamento (VE), il 15 maggio (M. Toller [4]).
- 1 ind. trovato deceduto agli Alberoni, Venezia, il 17 maggio (P. Scarpa [4] [5]).

Berta minore *Puffinus yelkouan*

- 150 ind. alla foce del Tagliamento, San Michele al Tagliamento (VE), il 15 maggio (M. Toller [4]).
- 2 ind. a Ca' Roman, Venezia, l'11 giugno (R. Storer et al. [4]).
- 2 ind. a Chioggia (VE) il 5 novembre (P. Scarpa [4]).
- 650 ind. a Chioggia (VE) il 21 novembre (F. Boscolo Camiletto, P. Scarpa [4] [5] [6]).

Ciconiiformes**Ciconiidae****Cicogna nera *Ciconia nigra***

Si elencano le segnalazioni di individui in sosta migratoria.

- 1 ind. in un fossato a Favaro Veneto, Venezia, l'1 marzo (E. Stival).
- 1 ind. che aveva appena preso il volo a Ceggia (VE) il 16 marzo (G. Sgorlon).
- 1 ind. in volo basso a Ca' Piasenti, Cavarzere (VE), il 24 maggio (R. Alba, V. Dutto [6]).
- 1 juv. in difficoltà recuperato a Pederobba (TV) il 21 settembre (P. Vacilotto [4]).
- 1 juv. in sosta a Tolle, Porto Tolle (RO), l'1 ottobre (Polizia Provinciale di Rovigo).

Cicogna bianca *Ciconia ciconia*

Si elencano segnalazioni in provincia di Rovigo, dove la specie è poco frequente, e il conteggio più importante.

- 8 ind. a Mazzorno Destro, Taglio di Po (RO), l'8 e il 9 marzo (V. Bellettato, D. Callegari, N. Donà [4]).
- 1 ind. a Ca' Tiepolo, Porto Tolle (RO), il 26 aprile (censimenti Sagittaria).
- 12 ind. a Cologna Veneta (VR) il 3 agosto (G. Venturini [1]).

Suliformes**Sulidae****Sula *Morus bassanus***

- 1 ind. alla foce del Tagliamento, San Michele al Tagliamento (VE), il 15 maggio (M. Toller [4]).

Phalacrocoracidae**Marangone minore *Microcarbo pygmaeus***

Si elencano segnalazioni in provincia di Belluno, dove la specie è poco frequente.

- 1 ind. al Lago di Santa Croce (BL) tra il 9 dicembre 2023 e il 2 gennaio (G. Feltrin - cfr. SIGHELE et al., 2024).
- 1 ind. a Quero Vas, Setteville (BL), il 12 gennaio (G. Silveri [4]).

- 1 ind. al Lago di Busche (BL) il 5 marzo (P. Grotto [4]).

Le segnalazioni per la provincia di Belluno sono ora dieci (SIGHELE et al., 2016, 2018, 2021, 2022, 2023, 2024).

Marangone dal ciuffo *Gulosus aristotelis*

Si elencano conteggi consistenti, segnalazioni al di fuori dell'area costiera e un individuo marcato.

- 213 ind. in provincia di Venezia tra il 9 e il 12 gennaio (BASSO, 2024).
- 1 ind. alle Rotte del Guà, Trissino (VI), il 5 giugno (P. Rasina).
- 3 ind. a Sandrigo (VI) il 18 giugno (F. Moretto).
- 1 juv. a Spresiano (TV) il 20 giugno, recuperato in un campo di mais in difficoltà e portato al centro di recupero di Treviso (A. Nardotto, L. Panzarlin [4]).
- 1 juv. a Verona il 21 giugno, recuperato in zona industriale in difficoltà e in seguito rilasciato il 5 luglio a Peschiera del Garda (VR), dove è stato segnalato fino al 17 ottobre, osservato anche a Torri del Benaco (VR) il 4 agosto (M. Padovani, S. Tascio, E. Jantke et al. [2] [6]).
- 1 ind. in Laguna di Venezia il 16 luglio, marcato con anello colorato croato "60B" (A. Sartori); era stato applicato da pullo a Bijuni-o.Grunj, Croazia, il 12 aprile 2023.
- 60 ind. in Sacca di Scardovari, Porto Tolle (RO), il 19 luglio (M. Fenati, A. Sartori, P. Scarpa [4]).
- 140 ind. a Ca' Roman, Venezia, il 6 agosto (P. Scarpa [4]).

Quelle delle Rotte del Guà e di Sandrigo rappresentano le prime due segnalazioni per la provincia di Vicenza, quella di Spresiano la prima per la provincia di Treviso e quella di Verona la terza per la provincia di Verona (BON et al., 2005; SIGHELE et al., 2019).

Cormorano *Phalacrocorax carbo*

Si elencano nuove informazioni sulla nidificazione.

- 1 cp. ha nidificato al Lago di Busche (BL) con prime avvisaglie a partire da metà febbraio (P. Grotto [4]).
- 2 cp. hanno nidificato al Lago del Corlo, Arsiè (BL), a partire da metà febbraio (P. Grotto [4]).

Pelecaniformes**Threskiornithidae****Mignattaio *Plegadis falcinellus***

Si elencano segnalazioni al di fuori dell'area costiera, informazioni sulla nidificazione e concentrazioni consistenti.

- 1 ind. al Laghetto del Frassino, Peschiera del Garda (VR), il 23 marzo (L. Deflorian [6]).
- 4-8 cp. a Ca' di Mezzo, Codevigo (PD), tra aprile e giugno (T. Bisol, N. Fagotto, S. Nembrini, S. Rizzi et al. [4] [6]).
- 8-10 cp. in Chiavichino-Altanea, Caorle (VE), 2 cp.

a Villa Favorita, Eraclea (VE), 6-8 cp. in Valle Figheri, Campagna Lupia (VE), e 4-6 cp. in Ca' Pasqua, Chioggia (VE), tra maggio e giugno (SCARTON et al., 2025).

- 14 ind. a Caldognio (VI) l'1 maggio (P. Benedetti, F. Marsilli, F. Rigodanza, G. Nassi).
- 1-2 ind. all'Oasi Brusà, Cerea (VR), tra il 4 e il 17 maggio (L. Dalla Libera, S. Rizzi et al. [3] [5]).
- 6 ind. all'Oasi Pellegrina, Isola della Scala ed Erbè (VR), il 5 maggio (L. Deflorian [6]).
- 4 ind. a Vedelago (TV) il 9 maggio (F. Salvini [1] [2]).
- 16 ind. nei pressi di Ariano nel Polesine (RO) il 12 maggio (R. Storer [4]).
- 2-9 ind. alla Palude del Busatello (VR/MN), tra il 19 maggio e il 15 giugno, 2-3 cp. hanno nidificato (S. Bellintani, E. Cavallini, N. Grattini et al. [3] [4]).
- 3 ind. a Isola Vicentina (VI) il 23 e il 24 luglio (G. Nassi, M. Fioretto, F. Moretto [4] [5]).
- 49 ind. a Tessera, Venezia, il 30 luglio (E. Stival).
- 4 ind. a Villaverla (VI) dal 5 al 14 agosto (M. Dal Zotto et al.).
- 2 ind. tra Sorgà ed Erbè (VR) il 18 agosto (G. Fasoli [4]).
- 8 ind. in Valle Segà, Rosolina (RO), il 6 dicembre (V. Bellettato [4]).

Spatola *Platalea leucorodia*

Si elencano informazioni sulla nidificazione, segnalazioni in siti inusuali, individui marcati di un certo interesse e conteggi consistenti.

- 2 cp. a Ca' di Mezzo, Codevigo (PD), tra aprile e giugno (A. Bazzi, T. Bisol, N. Fagotto, S. Nembrini, M. Sampaoli, P. Scarpa et al. [4] [6]).
- 1 ind. nei pressi della Busa de Giaretta (PD) tra il 19 e il 23 aprile (E. Carta, S. Rizzi, L. Dalla Libera, F. Moretto et al. [4] [5] [6]).
- 1 ind. nei pressi di Mogliano Veneto (TV) il 21 aprile (G. Piras [4]).
- 1 ind. a Ca' di Mezzo, Codevigo (PD), il 26 aprile, marcato con anello colorato italiano "B29" (T. Bisol [6]); era stato applicato da pullo a Comacchio (FE) il 17 maggio 2017 (archivio ISPRA).
- 1 ind. alla Palude del Busatello (VR/MN), l'1 maggio, il 2 e il 19 giugno (N. Grattini, S. Grossule, S. Tascio, F. Novelli, E. Terrabuio et al. [3]).
- 1 ind. in Valle Bagliona, Porto Viro (RO), il 15 maggio, marcato con anello colorato italiano "N70" (A. Sartori); era stato applicato da pullo al Bacino di Bando (FE) il 14 aprile 2023.
- 1 ind. nella garzaia del Bacucco, Ariano nel Polesine (RO), il 16 giugno, marcato con anello colorato italiano "D65" (L. Zanella); era stato applicato da pullo all'Oasi di Bando (FE) l'8 aprile 2017 (A. Talamelli).
- 1 ind. a Tessera, Venezia, il 23 giugno, marcato con anello colorato danese "V260" (E. Stival); era stato

applicato da pullo a Høje Sande, Danimarca, il 23 giugno 2019, esattamente 5 anni prima (Copenaghen Bird Ring Centre).

- 1 ind. in golena di Canalnovo, Villanova Marchesana (RO), il 14 agosto (A. Barbieri).
- 1 ind. in Valle Vecchia, Caorle (VE), il 19 agosto, marcato con anello colorato "J15P" (M. Bozza, N. Fagotto [4] [6]); era stato applicato da pullo a Kapuvar, Ungheria, il 26 maggio 2024 (archivio ISPRA).
- 100 ind. in Valle Ca' Pasta, Porto Viro (RO), il 24 agosto (G. Zappaterra).
- 1 ind. in Valle San Leonardo, Porto Viro (RO), il 6 settembre, marcato con anello colorato italiano "K18" (T. Bisol, P. Bisol, N. Fagotto); era stato applicato da pullo in Valle Santa (FE) nel maggio 2024.
- 100 ind. in Valle Veniera, Rosolina (RO), e 82 ind. in Valle Ca' Pasta (RO) il 24 settembre (A. Dal Pozzo, F. Ghererdini, M. Fenati).
- 93 ind. in Valle Figheri, Campagna Lupia (VE), il 29 ottobre (L. Sattin [4]).
- 75 ind. in Valle Ca' Zuliani, Porto Tolle (RO), il 29 ottobre (V. Bellettato [4]).
- 60 ind. in Valle Ca' Pasta, Porto Viro (RO), il 19 novembre (censimenti Sagittaria).

Ibis sacro *Threskiornis aethiopicus*

Si elencano conteggi consistenti, un individuo marcato di un certo interesse e segnalazioni in provincia di Belluno, dove la specie è occasionale.

- Fino a 108 ind. a Verona e 98 ind. a San Martino Buon Albergo (VR) tra il 20 gennaio e il 2 febbraio (M. Sighele, R. Zanella, C. Chiappisi et al. [3]).
- 1 ind. lungo il fiume Sile, Jesolo (VE), il 3 febbraio, marcato con anello colorato italiano "BBB" (A. Sartori); era stato applicato da pullo nelle Valli di Comacchio (FE) il 25 giugno 2022.
- 1 ind. al Lago di Busche (BL) tra l'8 febbraio e il 5 marzo (G. Feltrin, P. Grotto [4]).
- 150 cp. nidificanti alla Giudecca, Venezia, il 5 aprile (F. Scarton [4]).
- 1 ind. al Lago di Busche (BL) tra il 19 luglio e il 18 settembre (E. Carta et al. [4]).
- 300 ind. in alimentazione a sud di Santa Giulia, Porto Tolle (RO), il 6 ottobre (F. Scarton [4]).
- 650 ind. all'ecocentro di Chioggia (VE) il 23 novembre, 520 ind. il 3 dicembre (P. Scarpa, F. Piccolo [4]).

Quelle del Lago di Busche rappresentano la quarta e la quinta segnalazione per la provincia di Belluno (SIGHELE et al., 2020, 2023, 2024).

Ardeidae

Airone schistaceo *Egretta gularis*

- 1 ind. in Busa del Bastimento, Porto Tolle (RO), il

- 13 giugno (E. Cacciatori [4]).
- 1 ind. nei pressi di Pacengo, Lazise (VR), tra il 23 settembre e il 6 ottobre (E. Grippo et al. [3]).

Sgarza ciuffetto *Ardeola ralloides*

Si elencano una segnalazione in periodo invernale e una in provincia di Belluno, dove la specie è piuttosto sporadica.

- 1 ind. a Codevigo (PD) tra il 23 novembre 2023 e l'1 gennaio (T. Bisol, M. Busato, E. Ceccanello et al. [4] [5] [6] - cfr. SIGHELE et al., 2024).
- 1 ind. a Mel, Borgo Valbelluna (BL), l'11 giugno (M. Varaschin [4]).

Airon bianco maggiore *Ardea alba*

Si elencano nuove informazioni relative alla nidificazione.

- 1 cp. ha nidificato a Solesino (PD), osservata il 9 maggio (A. Tonelli [4]).
- 1 cp. ha nidificato a Correzzola (PD), osservata il 25 maggio (G. Piras [4]).

Rappresentano le prime riproduzioni per la provincia di Padova.

Airon guardabuoi *Ardea ibis*

Si elencano segnalazioni, anche di riproduzione, in provincia di Belluno, dove la specie è poco frequente, e un conteggio consistente.

- 1 ind. al Lago di Busche (BL) il 5 marzo, 2 ind. il 20 maggio, 1 ind. 17 agosto (P. Grotto, E. Carta, G. Piras [4]).
- 4 cp. nidificanti a Feltre (BL) a partire almeno dal 25 marzo (P. Grotto, A. Agostinetto [4]).
- 1.830 ind. alla Busa de Giaretta (PD) il 3 novembre (F. Moretto).

Apodiformes

Apodidae

Rondone maggiore *Tachymarptis melba*

Si elencano segnalazioni nelle province di Rovigo e Venezia, dove la specie è poco frequente, e un conteggio consistente.

- 1 ind. ad Albarella, Rosolina (RO), il 27 marzo (D. Trombin [4]).
- 1 ind. a Carpenedo, Venezia, il 6 settembre (A. Zaninoto [4]).
- almeno 4 ind. tra Caorle, Eraclea, San Donà di Piave e Santo Stino di Livenza (VE) il 15 settembre (D. de Marchi, G. Sgorlon [4]).
- 900 ind. ad Arquà Petrarca (PD) il 26 settembre (A. Tonelli [4]).

Rondone pallido *Apus pallidus*

- 1 ind. al Parco di San Giuliano, Venezia, il 27 aprile (E. Stival).
- 1-40 ind. a Venezia tra il 25 giugno e il 17 settembre (E. Stival, H. Boorman, N. Fagotto et al.

[4] [6]).

- 5 ind. a Ca' Savio, Cavallino-Treporti (VE), il 16 agosto (P. Zonta [4]).

Strigiformes

Strigidae

Gufo reale *Bubo bubo*

Si riporta una segnalazione in località poco nota per la specie.

- 1 ind. trovato deceduto per elettrocuzione ad Ogliano, Conegliano (TV), il 18 dicembre, segnalato in zona dalla prima decade di novembre (R. Guglielmi).

Allocco *Strix aluco*

Si riporta una segnalazione in provincia di Rovigo, dove la specie è poco segnalata.

- 1 ind. in canto a Badia Polesine (RO) il 9 gennaio (G. Susanna [4]).

Allocco degli Urali *Strix uralensis*

- 1 ind. al Pian del Cansiglio, Tambre (BL), il 22 ottobre (T. Vianello [4]).

Accipitriformes

Pandionidae

Falco pescatore *Pandion haliaetus*

Si elencano segnalazioni riferite a individui marcati.

- 1 ind. alla Busa de Giaretta (PD), tra il 26 febbraio e il 19 marzo, marcato con anello colorato tedesco "CJ38" (M. Fioretto, F. Moretto [4] [5] [6]); era stato applicato da pullo a Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburgo, Germania, il 4 luglio 2023 (archivio ISPRA).
- 1 ind. in Terzo Bacino, San Michele al Tagliamento (VE), il 25 settembre, marcato con anello colorato finlandese "YYP" (P. Geromel [4]); era stato applicato da pullo a Kannonkoski, Finlandia, il 19 luglio 2021 (archivio ISPRA).

Accipitridae

Gipeto *Gypaetus barbatus*

- 2 ind. a Cornedo Vicentino (VI) il 25 agosto (M. Vicariotto).

Si tratta della seconda segnalazione per la provincia di Vicenza (FRACASSO & FARRONATO, 1998).

Falco pecchiaiolo *Pernis apivorus*

Si elencano conteggi durante la migrazione pre- e post- riproduttiva.

- 262 ind. a Badoere, Morgano (TV), il 28 aprile (F. Salvini [1] [2]).
- 6.002 ind. sopra Colle San Giorgio, Maser (TV), e

il fiume Piave a Spresiano (TV), tra il 15 agosto e il 4 settembre, con picco di 1.159 ind. il 26 agosto (MEZZAVILLA et al., 2024).

Grifone *Gyps fulvus*

Si elencano segnalazioni al di fuori dell'area del Comelico, a parte quelle con conteggi interessanti.

- 1 ind. sul Corno d'Aquilio, Sant'Anna d'Alfaedo (VR), il 9 aprile (L. Mazzola [3]).
- 1 ind. sul Monte Belpo, San Zeno di Montagna (VR), il 19 maggio (D. Rottichieri, E. Catalano [3]).
- 2-3 ind. a San Giorgio, Bosco Chiesanuova (VR), il 5 e il 6 giugno (L. Signori, F. Valbusa [3]).
- 1 ind. sul Pigarolo, Roverè Veronese (VR), il 12 giugno (A. Stevanoni, L. Signori [3]).
- 1 ind. sul Monte Baldo a Prà Alpesina, Malcesine (VR), il 13 giugno (F. Rigon [4]).
- 3 ind. a Forcella Giau, San Vito di Cadore (BL), il 29 giugno (A. Zappia [4]).
- 11 ind. sul Monte Zovo, San Nicolò di Comelico (BL), il 30 luglio (A. Bossi [4]).
- 2 ind. al Rifugio Nuvolau, Cortina d'Ampezzo (BL), il 24 agosto (A. Birondi [4] [8]).
- 15 ind. in alta Val Visdende, Santo Stefano di Cadore (BL), il 25 agosto (L. Bassetto [4]).
- 1 ind. a Fregona (TV) il 10 settembre (P. Vacilotto [4]).
- 1 ind. a Vittorio Veneto (TV) il 19 settembre (C. Lima [6]).
- 1 ind. ad Arquà Petrarca (PD) il 25 settembre (A. Tonelli [4]).
- 3 ind. sul Monte Colombera, Tambre (BL), l'11 ottobre (P. Vacilotto [4]).
- 2 ind. sul Monte Pasubio (VI) l'11 ottobre (F. Guglielmo).
- 5 ind. sul Monte Pizzoc (TV) il 12 ottobre (F. Salvini, S. Morato [4] [6]).
- 20 ind. sul Sasso Nero, San Tomaso Agordino (BL), l'1 novembre (L. Gregnanin [4]).
- 1 ind. nei pressi di Bussolengo (VR) l'8 e il 9 novembre, posato in giardino privato su *Cedrus* cfr. *deodara* (F. Luise, C. Zanini, C. Chiappisi et al. [3]).
- 1 ind. a Roncol di Fuori, San Gregorio nelle Alpi (BL), il 26 dicembre, posato su *Cedrus* cfr. *deodara* (G. de Nadal [4]).

Quella di Arquà Petrarca è la terza osservazione per la provincia di Padova negli ultimi 50 anni (BOTTAZZO et al., 1999; SIGHELE et al., 2009).

Biancone *Circaetus gallicus*

Si elencano segnalazioni nelle province di Rovigo e Venezia, dove la specie è poco frequente, e nuove informazioni sulla riproduzione.

- 1 ind. a Santa Maria Maddalena, Occhiobello (RO), il 19 aprile (P. Melandri [4]).
- 1 ind. nei pressi di Concordia Sagittaria (VE) il 25

e il 28 aprile (M. Bozza [4]).

- Dormitorio sui Colli Euganei (PD) tra il 26 aprile e l'11 ottobre con un massimo di 33 ind. il 6 luglio (A. Tonelli, E. Rizzo). Nel rapporto ornitologico precedente (SIGHELE et al., 2024) sono stati inseriti questi stessi dati che sono da riferire al 2024, mentre nel 2023 le osservazioni del dormitorio sono state registrate dal 7 maggio al 15 settembre con un massimo di 27 ind. il 31 luglio (A. Tonelli).
- 1 ind. a Brussa, Caorle (VE), il 28 giugno (L. Boscain, E. Pavan, P. Vacilotto, N. Cendron [4] [5] [6]).
- 1 cp. nel comune di Borgo Valbelluna (BL) si è riprodotta con successo (Gruppo Ricerca Biancone Belluno).
- 1 ind. nei pressi di Concordia Sagittaria (VE) il 13 luglio, il 2 e il 25 agosto (M. Bozza [4]).
- 1 ind. a Costa di Rovigo (RO) il 5 agosto (C. Gabbani [4]).

Aquila anatraia maggiore *Clanga clanga*

- 1-2 ind. tra Villaviera, Valle Perera e Valle Zignago, Caorle (VE), tra il 5 gennaio e il 17 marzo (M. Sampaoli, T. Bisol, M. Viganò, A. Sutto et al. [4] [6]).
- 1 ind. in Valle Averto, Campagna Lupia (VE), il 10 gennaio (P. Ugo, A. de Faveri [4]).
- 1 ind. a Tessera, Venezia, il 27 ottobre (L. Bergamaschi, M. Ricci, F. Salvini, G. Cicinelli [4] [6]).
- 1 ind. nell'area di Valle Perera, Caorle (VE), tra il 7 dicembre e il 6 marzo 2025 (M. Darpin et al. [4]).

Aquila minore *Hieraetus pennatus*

- 1 ind. a San Michele Extra, Verona, tra il 15 e il 17 gennaio (P. Panarotto, C. Izzo, C. Chiappisi et al. [3]).
- 1 ind. sul Monte Belpo, San Zeno di Montagna (VR), il 21 gennaio e il 3 febbraio (M. Guardini [3] [4]).
- 1 ind. nelle bonifiche dell'Isola della Donzella, Porto Tolle (RO), il 13 febbraio, 1 ind. a Ca' Mello, Porto Tolle (RO), il 9 marzo (P. Melandri, E. Stival, O. Trebbi, T. Bisol et al. [4] [6]).
- 1 ind. a Cava Cicogna, Belfiore (VR), il 5 aprile (C. Chiappisi [3]).
- 1 ind. a Branchetto, Bosco Chiesanuova (VR), il 19 giugno (G. Zago [3]).
- 1 ind. della forma chiara ad Arquà Petrarca (PD) tra il 12 luglio e l'8 settembre, 1 ind. della forma scura il 14 settembre (A. Tonelli, E. Rizzo [4]).

Aquila reale *Aquila chrysaetos*

Si riporta una segnalazione in località inusuale per la specie.

- 1 ind. ad Avesa, Verona, il 24 febbraio (A. Mosele [3] [4]).

Astore *Accipiter gentilis*

Si elencano segnalazioni in località di pianura.

- 1 imm. alla Busa de Giaretta (PD) il 13 gennaio (F. Moretto).
- 1 ind. in Valle Vecchia, Caorle (VE), il 4 febbraio (N. Ciarla [4]).
- 1 ad. a Galzignano Terme (PD) il 4 aprile (A. Tonelli [4]).
- 1 ind. a Vedelago, Istrana (TV), il 30 settembre (F. Salvini [6]).
- 1 ind. a Tessera, Venezia, il 22 ottobre (L. Nigro, G. Papale [4] [6]).
- 1 ind. in Val Grande, San Michele al Tagliamento (VE), il 23 novembre (A. Bertoli, L. Rossi et al. [4]).
- 1 ind. a Goro Veneto, Ariano nel Polesine (RO), il 24 novembre (P. Melandri, S. Lee [4] [6]).
- 1 imm. a Villaviera, Caorle (VE), il 24 dicembre (M. Bozza [4]).

Albanella pallida *Circus macrourus*

- 1 ind. a Cavazzere (VE) il 29 marzo (R. Alba, V. Dutto [4] [6]).
- 1 ind. al Parco di San Giuliano, Venezia, il 30 marzo (S. Faggian [4]).
- 1 ind. a Corbola (RO) il 2 aprile (D. Trombin [4]).

Albanella minore *Circus pygargus*

Si riporta una segnalazione in provincia di Belluno, dove la specie è poco frequente.

- 1 ind. ad Alpago (BL) l'11 aprile (M. Pozzato).

Falco di palude *Circus aeruginosus*

Si riporta un conteggio consistente.

- 177 ind. in provincia di Venezia tra il 9 e il 12 gennaio (BASSO, 2024).

Nibbio reale *Milvus milvus*

Si elencano segnalazioni in periodo invernale e conteggi interessanti.

- 1-3 ind. alla Palude del Busatello (VR/MN) tra il 9 dicembre 2023 e il 21 gennaio (F. Novelli, A. Berlusconi, N. Grattini et al. [3]).
- 1 ind. a Piombino Dese (PD) tra il 14 dicembre 2023 e il 10 gennaio (S. Morato, P. Salvador, F. Salvini [4] [6] – cfr. SIGHELE et al., 2024).
- 1 ind. a Concordia Sagittaria (VE) il 3 gennaio (S. Faggian [4]).
- 1 ind. a Velo Veronese (VR) il 3 gennaio (A. Zoccatelli [3]).
- 1 ind. a Istrana (TV) il 5 e il 26 gennaio (F. Salvini, S. Morato [4]).
- 3 ind. a Chioggia (VE) il 23 settembre (F. Boscolo Camiletto, P. Scarpa [4]).
- 3 ind. in Valle Vecchia, Caorle (VE), il 13 ottobre (M. Darpin [4]).
- 5 ind. a Padova il 15 ottobre (L. Grassi [4]).

- 1 ind. in Val di Zoldo (BL) il 3 novembre (G. Feltrin).
- 1 ind. a Verona l'1 dicembre (L. Milione, G. Passacantilli [4]).

Nibbio bruno *Milvus migrans*

Si riporta una concentrazione interessante.

- 12 ind. in attività trofica sul Monte Castelletto, Verona, il 27 luglio (C. Izzo [3]).

Aquila di mare *Haliaeetus albicilla*

- 1 ad. a Passo San Boldo, Cison di Valmarino (TV), il 13 febbraio (R. Guglielmi).

Poiana calzata *Buteo lagopus*

- 1 ind. a Semonzo, Borsò del Grappa (TV), tra il 12 e il 14 febbraio (R. Levert [4]).

Dovrebbe trattarsi della quarta segnalazione nota per la provincia di Treviso (FANTIN, 1988; BON et al., 2004, 2007).

Poiana *Buteo buteo*

Si riporta una segnalazione riferita alla ssp. *vulpinus* (poiana delle steppe).

- 1 ind. in loc. Oca Marina, Taglio di Po (RO), il 19 maggio (M. Passarella).

Coraciiformes**Coraciidae****Ghiandaia marina *Coracias garrulus***

Si elencano segnalazioni in periodo inusuale.

- 1 ind. a Terrassa Padovana (PD) il 12 ottobre (D. Bacchin [4]).
- 1 ind. a Caposal, in territorio di Musile di Piave (VE), il 22 ottobre (M. Cappelletto [1]).
- 1 ind. a Codevigo (PD) il 27 ottobre (F. Boscolo Camiletto [4]).

Piciformes**Picidae****Picchio cenerino *Picus canus***

Si elencano segnalazioni al di fuori delle province di Belluno e dell'area montana del Vicentino.

- 1 ind. in canto al Bosco di Cavalier, Gorgo al Monticano (TV), il 15 gennaio (G. Sgorlon [4]).
- 2 ind. al Bosco delle Lame, Concordia Sagittaria (VE), il 18 febbraio e il 6 aprile (M. Bozza, A. Sutto [4]).
- 1 ind. in Valle Zignago, Caorle (VE), il 17 marzo (A. Sutto [4]).
- 1 ind. a Castel Gaibana, Bosco Chiesanuova (VR), il 19 marzo (M. Azzolini [3]).

- 1 ind. a Moriago della Battaglia (TV) l'8 aprile (G. Silveri [4]).
- 1 ind. sul Monte Baldo a Prà Alpesina, Malcesine (VR), il 14 maggio (T. Uelen [8]).
- 1 ind. a Selva di Progno (VR) il 7 agosto, ripreso da fototrappola (G. Perlato [3]).
- 1 ind. all'Oasi Cave di Gaggio, Marcon (VE), il 14 settembre (M. Chillon [4]).
- 1 ind. a Fregona (TV) il 26 settembre (N. Fagotto, I. Bailot [4]).
- 1 ind. a Selvana, Treviso, il 2 ottobre (L. Dalla Torre [4]).
- 1 ind. in canto sul Monte Pizzoc (TV) il 26 ottobre, 1 ind. catturato durante una sessione di inanellamento il 28 ottobre (A. Favaretto).

Picchio nero *Dryocopus martius*

Si elencano segnalazioni in località di pianura poco note per la specie.

- 1-2 ind. al Bosco di Lison, Portogruaro (VE) il 27 gennaio, il 3 febbraio e il 21 aprile (R. Corvino, M. Bozza [4] [6]).
- 1-2 ind. a Limena (PD) tra il 16 e il 25 marzo (T. Bisol, L. Grassi, C. Martini, A. Stefanini [4] [6]).
- 1 ind. a Fossalta di Piave (VE) il 17 marzo (M. Cappelletto [4]).
- involo di 3 juv. alle cave di Noale (VE) il 5 giugno (R. Pellizzon [4]).
- 1 ind. a San Stino di Livenza (VE) il 6 ottobre (L. Dalla Torre, P. Vacilotto [4] [6]).
- 1 ind. a Cavallino-Treporti (VE) il 21 ottobre (F. Scarton [4]).
- 1 ind. a Cinto Caomaggiore (VE) il 7 dicembre (M. Bozza [4]).

Quella di Noale rappresenta la prima riproduzione certa per la provincia di Venezia.

Picchio rosso minore *Dryobates minor*

Si elencano segnalazioni al di fuori della Val Belluna (BL), dove la specie è di presenza regolare.

- 1 ind. a Vodo di Cadore (BL) il 23 gennaio (C. Ferrario [4]).
- 1 ind. a Portogruaro (VE) l'1 febbraio (A. Sutto [4]).
- 1 ind. all'Oasi Fontane Bianche, Sernaglia della Battaglia (TV), il 14 e il 15 febbraio (A. Zappia, C. Vigo [4] [6]).
- 1 ind. a Bibione, San Michele al Tagliamento (VE), il 18 febbraio (A. Sutto [4]).
- 1 ind. alle Grave di Ciano (TV) il 15 marzo, l'11 maggio, l'1 e il 18 giugno e il 29 novembre (G. Silveri [4]).
- 1 ind. a Moriago della Battaglia (TV) l'8 aprile (G. Silveri [4]).
- 1 ind. a Nervesa della Battaglia (TV) il 3 settembre (L. Boscain [4]).

- 1 ind. a Pian Falcina, Sospirolo (BL), il 22 settembre (G. de Nadai [4]).

Falconiformes

Falconidae

Grillaio *Falco naumanni*

- 2 ind. a Tezze, Roverè Veronese (VR), il 12 aprile (L. Milione, G. Passacantilli [4]).
- 1 ind. a Ca' Pisani, Porto Viro (RO), il 4 maggio (M. Cargasacchi, F. Piccolo, A. Bossi [1] [7]).
- 1 m. a Bacucco, Ariano nel Polesine (RO), il 4 maggio (M. Camici, L. Lombardo et al. [6]).
- 2 ind. a Santa Maria in Stelle, Verona, il 5 giugno (S. Gaetani, G. Sighele [3]).
- 2 ind. sul Monte Castelletto, Verona, il 14 agosto (C. Izzo [3]).
- 8 ind. a Villaviera, Caorle (VE), il 29 settembre (A. Sutto [4]).

Falco cuculo *Falco vespertinus*

Si riporta un conteggio interessante.

- 18 ind. al Pian del Cansiglio, Tambre (BL), il 20 maggio (J. Wassermann [4]).

Smeriglio *Falco columbarius*

Si elencano una osservazione in sito inusuale e segnalazioni nelle province di Belluno e Padova, dove la specie è poco frequente in periodo invernale.

- 1 ind. in Laguna di Venezia, Campagna Lupia (VE), il 6 novembre (A. Sartori), in caccia sulla barena.
- 1 ind. al Pian del Cansiglio, Tambre (BL), il 10 novembre (P. Vacilotto [4]).
- 1 ind. a Bagnoli di Sopra (PD) l'8 dicembre (B. Riboni [4]).
- 1 ind. a Ren, Gosaldo (BL), il 30 dicembre (G. Piras, C. Fassina [4]).

Falco della regina *Falco eleonorae*

- 1 ind. a Cavallino-Treporti (VE) il 13 luglio (S. Römhild [4]).
- 1 ind. ad Arquà Petrarca (PD) tra il 18 e il 30 luglio (A. Tonelli [4]).

Falco pellegrino *Falco peregrinus*

Si elencano segnalazioni attribuite alla ssp. *calidus* (falco pellegrino siberiano).

- 1 ind. a Isola della Scala (VR) il 3 marzo (L. Milione, G. Passacantilli [4]).
- 1 ind. in Laguna di Venezia, Campagna Lupia (VE), il 6 novembre (A. Sartori).
- 1 ind. in Valle Chiusa, Porto Tolle (RO), il 3 dicembre (M. Fenati [4]).
- 1 ind. a Masi (PD) il 28 dicembre (G. Susanna [4]).

Passeriformes
Laniidae

Averla capirossa *Lanius senator*

- 1 ind. in Via delle Valli, Rosolina (RO), il 4 maggio (V. Polo, F. Piccolo, M. Cargasacchi [4]).
- 1 ind. nel Parco di San Giuliano, Venezia, il 13 maggio (E. Stival).
- 1 ind. a Cimadolmo (TV) il 4 giugno (G. Cellini [4]).

Corvidae

Gracchio alpino *Pyrrhocorax graculus*

Si riporta un conteggio consistente.

- 1.000 ca. ind. a Farra d'Alpago, Alpago (BL), il 7 gennaio (S. Morato [4]).

Taccola *Coloeus monedula*

Si riporta un conteggio consistente.

- 286 ind. nella gola di Ceraino, Dolcè e Rivoli Veronese (VR), l'8 febbraio (R. Boscaini [3] [4]).

Corvo comune *Corvus frugilegus*

Si riporta la segnalazione di maggiore consistenza numerica.

- 60 ind. a Pramaggiore (VE) il 6 dicembre (N. Fagotto, G. Nassi [4] [6]).

Corvo imperiale *Corvus corax*

Si riporta una segnalazione in località poco nota per la specie.

- 1-2 ind. tra Valle Vecchia, Caorle (VE), e Bibione, San Michele al Tagliamento (VE), per tutto l'anno (F. Piccolo et al. [4]), presenti almeno dal 2022 (SIGHELE et al., 2023, 2024).

Cornacchia *Corvus corone*

Si riporta una segnalazione riferita alla ssp. nominale *corone* (cornacchia nera) in provincia di Rovigo, dove è di presenza irregolare.

- 1 ind. nelle bonifiche della Mea, Porto Viro (RO), il 27 luglio (M. Stenico [5]).

Paridae

Cinciallegra *Parus major*

Si riporta una nidificazione in periodo inusuale.

- 7 pulli in cassetta nido a Portogruaro (VE) il 25 ottobre (M. Bozza [4]).

Cincia mora *Periparus ater*

- Si elencano segnalazioni in provincia di Rovigo, dove la specie è irregolare.
- 2 ind. a Grignano Polesine, Rovigo, il 4 marzo (L. Zennaro [4]).
- 3 ind. alla foce dell'Adige (RO) il 23 marzo (E.

Cecconello [4]).

- 2 ind. ad Adria (RO) il 3 dicembre (D. Trombin [4]).

Panuridae

Basettino *Panurus biarmicus*

- 4 ind. in Valle Perera, Caorle (VE), il 13 gennaio (A. Sutto [4]).
- 1 ind. in Valle Millecampi, Codevigo (PD), il 26 giugno, 12 luglio e 7 settembre (G. Piras, P. Scarpa [4]).

Alaudidae

Tottavilla *Lullula arborea*

Si elencano segnalazioni in periodo invernale e quelle in località poco note per la specie.

- 1 ind. a Malo (VI) tra il 26 dicembre 2023 e il 3 febbraio (G. Nassi [4] – cfr. SIGHELE et al., 2024).
- 22 ind. a Maserada sul Piave (TV) il 10 gennaio (P. Vacilotto [4]).
- 1-5 ind. a Baone (PD) tra il 13 gennaio e il 21 febbraio, poi di nuovo il 12 ottobre (G. Piras, G. Toniolo, P. Vacilotto [4] [6]).
- 16 ind. a Vedelago (TV) il 26 gennaio (S. Morato [4]).
- 1 ind. al Lido di Venezia il 10 marzo (S. Castelli [4]).
- 1-4 ind. a Tessera, Venezia, tra il 20 e il 23 ottobre (J. Bianchi, T. Bisol, L. Bonomelli, L. Pini [4] [6]).
- 6 ind. nei pressi della Sacca di Scardovari, Porto Tolle (RO), il 21 novembre (C. Vigo [4]).
- 1 ind. a Onara, Tombolo (PD), l'1 dicembre (G. Bassi [4] [6]).
- 25 ind. a Crocetta del Montello (TV) il 7 dicembre (F. Menegat [4]).
- 2 ind. a Sottomarina, Chioggia (VE), il 15 dicembre (L. Grassi [4]).
- 15 ind. a Spresiano (TV) il 21 dicembre (P. Scarpa [4]).
- 12 ind. a Costabissara (VI) il 24 dicembre (M. Dal Zotto).

Calandrella *Calandrella brachydactyla*

Si riporta una segnalazione in provincia di Rovigo, dove la specie è poco nota.

- 1 ind. a Bacucco, Ariano nel Polesine (RO) il 25 aprile (B. Biscuolo).

Acrocephalidae

Forapaglie comune *Acrocephalus schoenobaenus*

Si riporta una segnalazione in provincia di Belluno, dove la specie è poco frequente.

- 1 ind. a Cortina d'Ampezzo (BL) il 30 agosto (A. Bernardi).

Forapaglie castagnolo *Acrocephalus melanopogon*

Si elencano segnalazioni in periodo invernale e quelle in località inusuale.

- 1 ind. nella Palude del Busatello (VR/MN), il 16 e il 21 gennaio (F. Novelli et al. [3]).
- 1-2 ind. in Valle Vecchia, Caorle (VE), il 3 febbraio (M. Cargasacchi, F. Piccolo [4]).
- 1 ind. in Valle Millecampi, Codevigo (PD), il 4 e 6 febbraio (D. de Marchi, N. Adestrini [4]).
- 1 ind. nei pressi di Cavasagra, Vedelago (TV), il 26 aprile (S. Morato [4]).

Cannareccione *Acrocephalus arundinaceus*

Si elencano segnalazioni in periodo inusuale.

- 1 ind. a Onara, Tombolo (PD), il 6 ottobre (G. Basso [4] [6]).
- 1 ind. alla Busa de Giaretta (PD) il 29 ottobre (F. Moretto).

Locustellidae**Salciaiola *Locustella lusciniooides***

- 1 ind. all'Oasi del Busatello (VR/MN) l'1 maggio (N. Grattini [4]).
- 1 ind. catturato durante una sessione di inanellamento in Valle Ghebo Storto, Codevigo (PD), l'8 agosto (L. Sattin [5]).
- 1 ind. catturato durante una sessione di inanellamento all'Oasi Stagni di Casale, Vicenza, il 20 agosto (T. Montenegro, D. Speggiorin, P. Speggiorin).

Quella degli Stagni di Casale è la terza segnalazione nota per la provincia di Vicenza nel XXI sec. (P. Speggiorin [4]. M. Fioretto [5]).

Forapaglie macchiettato *Locustella naevia*

- 1 ind. ad Affi (VR) il 24 aprile (M. Banterla [3]).
- 1 ind. a Jesolo (VE) il 5 agosto (E. Menegon, M. Piotto).

Hirundinidae**Topino *Riparia riparia***

Si riporta una segnalazione in provincia di Belluno, dove la specie è poco frequente.

- 1 ind. al Lago di Busche (BL) il 27 luglio (M. Zenatello [4]).

Balestruccio *Delichon urbicum*

Si riporta una concentrazione consistente.

- 8.500 ind. ad Arquà Petrarca (PD) il 26 settembre (A. Tonelli [4]).

Rondine rossiccia *Cecropis rufula*

- 2 ind. al Lido di Venezia il 30 marzo (S. Castelli [4]).
- 1 ind. alla Busa de Giaretta (PD) il 25 aprile

(F. Moretto).

- 1 ind. a Oderzo (TV) l'11 maggio (G. Sgorlon [4]). Quella della Busa de Giaretta rappresenta la quarta segnalazione nota per la provincia di Padova (SIGHELE et al., 2011, 2018, 2023).

Aegithalidae**Codibugnolo *Aegithalos caudatus***

Si elencano segnalazioni attribuite alla ssp. *caudatus* (codibugnolo testabianca).

- 1 ind. a Ottava Presa, San Stino di Livenza (VE), il 3 gennaio (A. Mian [4]).
- 1 ind. a Mestre, Venezia, il 29 gennaio (A. Zaninoto [4]).
- 3 ind. a Padova l'1 febbraio (E. Ceconello [4]).
- 8 ind. a Miane (TV) il 4 febbraio (P. Geromel [4]).
- 1 ind. a Verona il 27 ottobre (R. Fiorentini [3]).
- 1 ind. a Verona il 15 dicembre (G. Passacantilli [4]).
- 1 ind. a Verona il 27 dicembre (S. Scandolara [3]).

Phylloscopidae**Lù bianco *Phylloscopus bonelli***

Si elencano segnalazioni nelle province di Rovigo e Padova, dove la specie è poco frequente.

- 1 ind. a Porto Caleri, Rosolina (RO), il 12 maggio (J. Peruzzo [4]).
- 1 ind. catturato durante una sessione di inanellamento a Saletto, Borgo Veneto (PD), il 23 agosto (A. Frigo).

Lù forestiero *Phylloscopus inornatus*

- 1 ind. a Tessera, Venezia, tra il 20 e il 24 ottobre (L. Bonomelli, J. Bianchi, L. Pini et al. [4] [6]).
- 1 ind. a Bassano del Grappa (VI) il 26 e il 27 ottobre, sito dove era stato osservato anche l'anno precedente (F. Moretto, G. Nassi).
- 1 ind. a Campalto, Venezia, tra il 27 e il 29 ottobre (S. Faggian, F. Salvini, M. Ricci et al. [4] [6]).
- 1 ind. a San Donà di Piave (VE) il 3 novembre (G. Sgorlon).

Le segnalazioni sono ora quattro per la provincia di Venezia e cinque per la provincia di Vicenza.

Lù di Pallas *Phylloscopus proregulus*

- 1 ind. a Borsò del Grappa (TV) il 23 e il 24 aprile (S. Tasca, L. Visentin et al. [4]) (fig. 5).

Rappresenta la sesta segnalazione nota per la regione Veneto, la seconda per la provincia di Treviso (SIGHELE et al., 2013, 2019, 2021, 2024).

Lù piccolo *Phylloscopus collybita*

Si elencano le informazioni relative a un individuo marcato e quelle della ssp. *tristis* (lù siberiano) in provincia di Padova, dove la specie è poco frequente.



5



6



7

Fig. 5. Lui di Pallas (*Phylloscopus proregulus*) a Borsò del Grappa (TV) il 23 aprile 2024. Foto di F. Moretto. **Fig. 6.** Codiroso spazzacamino del Turkestan (*Phoenicurus ochruros phoenicuroides*) sul Monte Pizzoc (TV) il 5 novembre. Foto di F. Salvini. **Fig. 7.** Zigolo boschereccio (*Emberiza rustica*) nei pressi di Nove (VI) il 23 febbraio 2025. Foto di F. Moretto.

- 1 ind. marcato con anello della Repubblica Ceca è stato ricatturato a Saletto, Borgo Veneto (PD), il 13 marzo (A. Frigo).
- 1 ind. della ssp. *tristis* catturato durante una sessione di inanellamento in Valle Ghebo Storto, Codevigo (PD), il 18 novembre (L. Sattin [5]).
- 1 ind. della ssp. *tristis* alla Busa de Giaretta (PD) il 13 dicembre (F. Moretto).

Sylviidae

Bigia padovana *Curruca nisoria*

- 1 ind. a Campofontana, Selva di Progno (VR), l'1 giugno (M. Bertacco [4]).

Sterpazzolina comune *Curruca cantillans*

- 1-2 ind. in Valle Vecchia, Caorle (VE), tra il 29 marzo e il 6 aprile (J. Holzer, F. Salvini, N. Ciarla [4]).
- 1 ind. al Parco di San Giuliano, Venezia, il 6 aprile (R. Fiorentini, E. Pavan, E. Squizzato, E. Stival, R. Storer [4]).
- 1 ind. a Malo (VI) l'8 aprile (G. Nassi [4]).
- 1 ind. a Porto Caleri, Rosolina (RO), l'1 maggio (D. Trombin [4]).

Leiothrichidae

Usignolo del Giappone *Leiothrix lutea*

Si riporta una segnalazione in sito non noto per la specie.

- 1 ind. ad Affi (VR) il 18 novembre (M. Banterla [3]).

Tichodromidae

Picchio muraiolo *Tichodroma muraria*

Si elencano una segnalazione in provincia di Treviso, dove la specie è di presenza irregolare, e una in ambito urbano.

- 1 ind. nella Valle del Diavolo, Cison di Valmarino (TV), il 24 gennaio (F. Mezzavilla [4]).
- 1 ind. in centro a Padova il 14 ottobre (K. Winters [6]).

Picchio muratore *Sitta europaea*

Si riporta una segnalazione in provincia di Rovigo, dove la specie è poco frequente.

- 1 ind. a Villa d'Adige, Badia Polesine (RO) il 29 aprile (G. Millot [6]).

Certhiidae

Rampichino alpestre *Certhia familiaris*

Si riporta una segnalazione in provincia di Venezia, dove la specie è poco frequente.

- 1 ind. a Portogruaro (VE) il 3 gennaio (M. Peripolli [4]).

Rampichino comune *Certhia brachydactyla*

Si riporta una segnalazione in provincia di Venezia, dove la specie è di presenza irregolare.

- 1 ind. all'Oasi Cave di Gaggio, Marcon (VE), il 22 settembre (L. Petrizzelli [4]).

Turdidae

Tordo sassello *Turdus iliacus*

Si elencano segnalazioni in provincia di Rovigo, dove la specie è poco frequente.

- 1 ind. a Porto Caleri, Rosolina (RO), il 19 marzo (T. Bisol, N. Fagotto [4] [6]).
- 1 ind. ad Adria (RO) l'11 novembre (D. Trombin [4]).

Tordela *Turdus pilaris*

Si elencano segnalazioni nelle province di Rovigo e Venezia, dove la specie è poco frequente.

- 1 ind. lungo il Po di Maistra (RO) il 9 gennaio (E. Verza).
- 1 ind. ad Adria (RO) il 18 gennaio (D. Trombin [4]).
- 1 ind. a Concordia Sagittaria (VE) il 18 febbraio (A. de Faveri [4]).
- 1 ind. alla foce del Po di Maistra (RO) il 19 febbraio (E. Verza).
- 2 ind. a Ca' Roman, Venezia, il 3 marzo (P. Scarpa [4]).
- 1 ind. a San Donà di Piave (VE) l'8 marzo (G. Sgorlon).
- 5 ind. al Lido di Venezia il 10 marzo (S. Castelli [4]).
- 1 ind. a Tessera, Venezia, il 26 ottobre (S. Morato, F. Salvini, P. Zonta [4] [6]).
- 2 ind. a Santa Giulia, Porto Tolle (RO), il 30 dicembre (F. Piccolo [4]).

Muscicapidae

Pettazzurro *Luscinia svecica*

Si elencano segnalazioni in località inusuali.

- 1 ind. alle Rotte del Guà, Trissino (VI), il 26 febbraio (G. Nassi [4] [6]).
- 1 ind. a Malga Castilverio, Sant'Anna d'Alfaedo (VR), 1420 m s.l.m. il 25 agosto (E. Grippo, V. Fanelli).

- 1 ind. a Bacucco, Ariano nel Polesine (RO), il 2 settembre (M. Valente).
- 1-5 ind. a Vedelago (TV) tra il 7 settembre e il 12 ottobre (F. Salvini, R. Storer, A. Zappia, G. Cellini [4]).
- 1 ind. a Caldognو (VI) il 27 settembre (M. Fioretto [5]).

Balia dal collare *Ficedula albicollis*

- 1 ind. a Moriago della Battaglia (TV) il 19 aprile (G. Silveri [4]).
- 1 ind. ad Adria (RO) il 25 aprile (D. Trombin [4]).
- 1 ind. all’Oasi Stagni di Casale, Vicenza, il 25 aprile (D. Speggiorin, P. Speggiorin [4]).
- 1 ind. a Jesolo, Venezia, dal 29 al 30 aprile (M. Enzo).
- 1 ind. a Padova l’1 maggio (L. Grassi [4]).
- 1 ind. femmina con placca di incubazione durante una sessione di inanellamento all’Oasi Cave di Gaggio, Marcon (VE), l’8 giugno (NARDOTTO et al., 2024).

Quella di Marcon è la prima nidificazione probabile per la regione Veneto. Quella di Adria è la seconda segnalazione nota per la provincia di Rovigo negli ultimi 50 anni (VERZA & SIGHELE, 2019).

Codirosso spazzacamino *Phoenicurus ochruros*

Si riporta una segnalazione attribuita alla ssp. *phoenicuroides* (codirosso spazzacamino del Turkestan).

- 1 m. della ssp. *phoenicuroides* sul Monte Pizzoc (TV) tra il 2 e il 5 novembre, quando è stato catturato durante una sessione di inanellamento (A. Favaretto, F. Salvini, M. Campostrini, D. Trombin) (fig. 6).

Codirossone *Monticola saxatilis*

Si riporta una segnalazione in provincia di Rovigo, dove la specie è occasionale.

- 1 ind. a Cavanella Po, Adria (RO), il 5 maggio (E. Fregnan).

Si tratta della quarta segnalazione nota per la provincia di Rovigo negli ultimi 50 anni (SIGHELE et al. 2009, 2019; N. Donà [4]).

Passero solitario *Monticola solitarius*

- 1 ind. a Canale e 1 ind. a Gaium, Rivoli Veronese (VR), il 3 febbraio (C. Chiappisi [3] [4]).
- 1 ind. a Rocca Pendice, Teolo (PD), il 12 dicembre (G. Tocchetto [4]).

Prunellidae

Sordone *Prunella collaris*

Si riporta un conteggio interessante.

- 20 ind. ca. a Belluno il 31 dicembre (M. Perinotto [4]).

Passeridae

Fringuello alpino *Montifringilla nivalis*

Si elencano concentrazioni interessanti e segnalazioni in provincia di Vicenza, dove la specie è poco frequente.

- fino a 168 ind. a Bocca di Selva, Bosco Chiesanuova (VR), tra il 6 e il 23 gennaio (M. Azzolini, L. Dalla Libera, S. Rima, A. Corso, G. Sighele, S. Gaetani et al. [3] [4]).
- 2 ind. al Rifugio Valbona, Arsiero (VI), l’11 gennaio, uno marcato con anello italiano “AAT” (G. Zago [3]); era stato applicato sullo Stelvio (BZ) nell’estate 2023 (C. Bettega).
- 1 ind. a Cima Verena, Roana (VI), il 20 gennaio (C. Ronchi [5]).
- fino a 100 ind. a Malga Bellocca, Velo Veronese (VR), il 4 e il 5 marzo (P. Parricelli [3]).
- 70 ind. sopra Rifugio Lavaredo, Auronzo di Cadore (BL), il 28 settembre (S. Gomes [8]).
- 2 ind. a Cima Portule, Asiago (VI), il 23 dicembre (A. Forti [4]).

Passera sarda *Passer hispanoliensis*

Si elencano conteggi interessanti.

- 230 ind. nelle risaie di Ca’ Mello, Porto Tolle (RO), il 20 gennaio (N. Fagotto).
- 100 ind. presso l’Oasi di Ca’ Mello, Porto Tolle (RO), il 30 dicembre (F. Piccolo [4]).

Passera oltremontana *Passer domesticus*

Si riporta una segnalazione in località poco nota per la specie.

- 1 ind. a Bibione, San Michele al Tagliamento (VE), il 4 aprile (E. Stival).

Motacillidae

Calandro *Anthus campestris*

Si riporta una segnalazione in località poco nota per la specie.

- 2-4 ind. al Lido di Venezia, il 4 e 5 maggio (S. Castelli, M.G. Mitri [4]).

Pispola golarossa *Anthus cervinus*

- 1-2 ind. sul Monte Castelletto, Verona, il 29 settembre (C. Izzo [3]).

Fringillidae

Peppola *Fringilla montifringilla*

Si riporta una segnalazione in periodo inusuale.

- alcuni ind. nei pressi di Renon, Gosaldo (BL), il 14 agosto (R. Sacchet [4]).

Organetto *Acanthis flammea*

Si elencano il conteggio più importante e le segnalazioni al di fuori delle note aree riproduttive nelle province di Belluno e Vicenza, tutte relative alla ssp. *cabaret* (organetto minore).

- 10 ind. in Valle Vecchia, Caorle (VE), tra il 24 dicembre 2023 e il 19 febbraio (A. Zappia, P. Bisol, T. Bisol, N. Fagotto [4] [6] - cfr. SIGHELE et al., 2024).
- 7 ind. nei pressi della Sacca degli Scardovari, Porto Tolle (RO), il 5 gennaio (L. Sorrentino [6]).
- 1 ind. a Carpenedo, Venezia, il 27 gennaio (M. Bon [4]).
- 1 ind. a Oderzo (TV) il 7 febbraio (G. Sgorlon).
- 1-2 ind. a San Nicolò del Lido, Venezia, tra il 7 e il 26 febbraio (M.G. Mitri, M. Burlin [4]).
- 2 ind. a Novezzina, Ferrara di Monte Baldo (VR), il 16 luglio (L. Bonanno [4]).

Quella degli Scardovari è la seconda segnalazione nota per la provincia di Rovigo nel XXI sec. (C. Fiorini, L. Ilahiane [4]).

Venturone alpino *Carduelis citrinella*

- 2 ind. al Passo Falzarego (BL) il 27 maggio (M. Castellucci [4]).
- 3 ind. a Misurina, Auronzo di Cadore (BL), il 6 luglio (E. Stival et al. [4]).
- 3-5 ind. al Rifugio Città di Carpi, Auronzo di Cadore (BL), il 23 agosto (L. Bassetto et al. [4]).
- 1 ind. in Valfredda, Ferrara di Monte Baldo (VR), tra metà ottobre e il 13 novembre (G. Bonini, M. Busato, L. Lipparini [4]).
- 1 ind. catturato durante una sessione di inanellamento sul Monte Pizzoc (TV) il 31 ottobre (A. Favaretto).

Verzellino *Serinus serinus*

Si riporta un conteggio interessante.

- 120 ind. a Brugine (PD) il 28 dicembre (E. Ceccanello [4]).

Calcaridae**Zigolo delle nevi *Plectrophenax nivalis***

- 1 ind. a Dosso Alto, Roverè Veronese (VR), tra il 28 novembre 2023 e il 10 febbraio, 2-8 ind. tra il 4 e il 16 marzo, uno marcato con anello metallico sloveno (M. Azzolini, L. Dalla Libera, P. Parricelli, G. Dalle Vedove et al. [3] [4]).
- 1 ind. a Punta Sabbioni, Cavallino-Treporti (VE), il 30 novembre (A. Zappia [4]).
- 1 ind. lungo l'argine meridionale della Sacca degli Scardovari, Porto Tolle (RO), tra il 2 e il 15 dicembre (B. Biscuolo, M. Stenico, V. Bellettato [4]).
- 2 ind. ai Parpari, Roverè Veronese (VR), il 14

dicembre, 1 ind. a Bocca di Selva il 23 dicembre (M. Azzolini [3] [6]).

Emberizidae**Zigolo boschereccio *Emberiza rustica***

- 1 ind. nei pressi di Nove (VI) tra il 21 dicembre e l'1 marzo 2025 (F. Moretto, G.M. Basso, L. Basso et al.) (fig. 7).

Si tratta della prima segnalazione recente per la regione Veneto, la precedente risale al 30 dicembre 1954 (FAVERO, 1955).

Zigolo capinero *Emberiza melanocephala*

- 1 ind. a Cavallino-Treporti (VE) il 14 giugno (F. Scarton [4]).

Strillozzo *Emberiza calandra*

Si riportano informazioni sulla riproduzione in provincia di Venezia.

- 1 ind. con imbeccata a Concordia Sagittaria (VE) il 14 luglio (M. Bozza [4]).

Zigolo muciatto *Emberiza cia*

Si riporta una segnalazione in provincia di Venezia, dove la specie è poco frequente.

- 2 ind. in Valle Vecchia, Caorle (VE), l'1 gennaio (R. Nussbaumer [6]).

Ortolano *Emberiza hortulana*

Si elencano segnalazioni in siti inusuali.

- 1 ind. verso Monte Malera, Bosco Chiesanuova (VR), 1600 m s.l.m., il 16 giugno (S. Grossule [4]).
- 1 ind. a Torri di Quartesolo (VI) il 29 giugno (S. Rizzi [4]).

Zigolo golarossa *Emberiza leucocephalos*

- 1-3 ind. a Maserada sul Piave (TV) dal 10 novembre 2023 al 13 febbraio (G. Fontanesi, F. Salvini, G. Sgorlon, P. Vacilotto, F. Zanatta et al. [4] - cfr. SIGHELE et al., 2024).
- 1 ind. catturato durante una sessione di inanellamento sul Monte Pizzoc (TV) il 26 ottobre (A. Favaretto).
- 1 ind. a Palazzon, Spresiano (TV), il 29 novembre (F. Zanatta).
- 1-2 ind. nei pressi di Nove (VI) tra il 6 dicembre e il 7 marzo 2025 (F. Moretto, C. Vigo, F. Piccolo et al.).

Zigolo giallo *Emberiza citrinella*

Si elencano segnalazioni in provincia di Padova, dove la specie è poco frequente.

- 1-3 ind. a Carmignano di Brenta (PD) tra il 13 gennaio e il 22 febbraio (F. Moretto).

SPECIE INTRODOTTE O PRESUMIBILMENTE SFUGGITE DALLA CATTIVITÀ

Dendrocigna beccorosso *Dendrocygna autumnalis*

- 1 ind. a Malcesine (VR) l'8 e il 14 gennaio, segnalata qui dal 2016, ma non più osservata successivamente (R. Boscaini, M. Azzolini – SIGHELE et al., 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024).

Anatra orecchie rosa *Malacorhynchus membranaceus*

- 1 ind. a Casier (TV) il 12 agosto (M. Scalabrin).

Oca indiana *Anser indicus*

- 1 ind. in Valle Cornio Alto, Campagna Lupia (VE), il 10 gennaio (P. Scarpa [4]).
- 1 ind. a Brussa, Caorle (VE), il 10 febbraio e 1 ind. a Valle Vecchia, Caorle (VE), il 18 febbraio (S. Furlanetto A. Sartori, A. Ladurner [4]).

Alzavola spallerosse *Callonetta leucophrys*

- 1 ind. al Lago di Fimon, Arcugnano (VI), tra il 9 e il 17 marzo (M. Vicariotto, G. Zago, C. Oliboni et al. [3] [5]).

Casarca sudafricana *Tadorna cana*

- 1 ind. in Valle San Leonardo, Porto Viro (RO), il 17 marzo (M. Vicariotto).

Casarca australiana *Tadorna tadornoides*

- 1 ind. in Laguna del Basson, Porto Tolle (RO), il 16 marzo (L. Zanella).

Fistione beccorosa *Netta peposaca*

- 1 ind. al Lago di Fimon, Arcugnano (VI), almeno tra il 19 e il 21 febbraio (P. Brunello, G. Nassi et al. [4]).

Alzavola dell'Amazzonia *Amazonetta brasiliensis*

- 1 ind. al Lago di Fimon, Arcugnano (VI), almeno tra il 19 e il 21 febbraio (P. Brunello, G. Nassi et al. [4]).

Phoenicopterus chilensis* x *Phoenicopterus ruber

- 1 ind. in Valle Ca' Pisani, Porto Viro (RO), l'1 giugno, già segnalato in quest'area adriatica dal 2016 (F. Barberini [6] – SIGHELE et al., 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024).

Turaco verde *Tauraco persa*

- 1 ind. a Padova il 18 novembre (F. Guglielmo [1]).

Damigella della Numidia *Grus virgo*

- 1 ind. a Ca' Tron, Roncade (TV), l'11 febbraio (P. Vacilotto [6]).

Ibis eremita *Geronticus eremita*

Si elencano segnalazioni in periodo invernale.

- 1 ind. a Verona tra il 12 dicembre e il 4 gennaio 2025 (V. Carta, C. Zanini, M. Sighele et al.).
- 3 ind. a Cologna Veneta (VR) il 18 e il 19 dicembre (G. Zago, G. Venturini [1] [3]).
- 1 ind. a nord di Valle Boccavecchia, Rosolina (RO), tra il 21 dicembre e l'1 gennaio 2025 (E. Verza et al.).

Poiana di Harris *Parabuteo unicinctus*

- 1 ind. alla Palude del Busatello (VR/MN) tra il 13 gennaio e il 3 febbraio (E. Catalano, S. Bellintani, A. Berlusconi et al. [4]).

Alcione sghignazzante *Dacelo novaeguineae*

- 1 ind. a Rosà (VI) tra ottobre e dicembre (M. Zonta).

Calopsitta *Nymphicus hollandicus*

- 1 ind. a Montorio, Verona, il 7 settembre (N. Fagotto, E. Stival).
- 1 ind. a Ficarolo (RO) il 10 settembre (L. Bernasconi [4]).
- 1 ind. a Favaro Veneto, Venezia, l'11 settembre (E. Stival).
- 1 ind. a Padova il 13 ottobre (L. Grassi [4]).

Conuro di Molina *Pyrrhura molinae*

- 1 ind. a Malcesine (VR) l'11 settembre (L. Höppner [4]).

Ararauna *Ara ararauna*

- 1 ind. tra Nogara, Asparetto di Cerea, Bovolone e Isola Rizza (VR) tra luglio e il 7 dicembre (CC Forestali).
- 1 ind. a Cartigliano (VI) il 15 dicembre (R. Corvino).

Parrocchetto dal collare *Psittacula krameri*

- 1 ind. a Montebelluna (TV) il 5 e il 19 aprile (C. Parlante [4]).
- 4 ind. in volo a Malo (VI) l'11 novembre (G. Nassi [4]).

Parrocchetto pettorosa *Psittacula alexandri*

- 1 ind. a Giussago, Portogruaro (VE), dal 28 ottobre al 4 novembre (G. Cuccurullo [4]).

Inseparabile facciarosa *Agapornis roseicollis*

- 1 ind. a Burano, Venezia, il 21 settembre (A. Kenny [6]).

Pappagallino ondulato *Melopsittacus undulatus*

- 1 ind. a Tessera, Venezia, il 13 maggio (P. Zampieri).
- 1 ind. a Silea (TV) il 15 agosto (E. Stival).

- 1 ind. a Schio (VI) il 15 novembre (J. Peruzzo [4]).

Bengalino comune *Amandava amandava*

- 1 ind. a Martellago (VE) il 2 dicembre (C. Miotti [4]).

BIBLIOGRAFIA

- AVILIST CORE TEAM, 2025. AviList: The Global Avian Checklist, v2025. <https://doi.org/10.2173/avilist.v2025>
- BACCETTI N., FRACASSO G., GOTTI C., 2014. La lista CISCO-COI degli uccelli italiani - Parte seconda: le specie naturalizzate (cat. C) e le categorie "di servizio" (cat. D, E, X). *Avocetta*, 38: 1-21.
- BACCETTI N., FRACASSO G., COMMISSIONE ORNITOGRAICA ITALIANA (COI), 2021. CISCO-COI Check-list of Italian birds – 2020. *Avocetta*, 45: 21-82.
- BASSO M., 2024. Censimenti degli uccelli acquatici svernanti in provincia di Venezia (gennaio 2024). *Associazione Faunisti Veneti*, 25 pp. - www.faunistiveneti.it/wp-content/uploads/2024/03/IWC_Venezia_2024_relazione.pdf
- BON M., SEMENZATO M., 2002. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anni 1999, 2000, 2001. *Boll. Mus. Civ. St. Nat. Venezia*, 53: 231-258.
- BON M., SIGHELE M., VERZA E. (eds.), 2004. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2003. *Boll. Mus. St. Nat. Venezia*, 55: 171-200.
- BON M., SIGHELE M., VERZA E. (eds.), 2005. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2004. *Boll. Mus. St. Nat. Venezia*, 56: 187-211.
- BON M., SIGHELE M., VERZA E. (eds.), 2007. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2006. *Boll. Mus. St. Nat. Venezia*, 58: 269-192.
- BONATO R., FARRONATO I., 2012. Uccelli del medio corso del fiume Brenta. Una fenologia. Parte I. *Nisoria*, 164 pp.
- BOTTAZZO S., PIRAS G., TONELLI A., 1999. Uccelli rapaci diurni dei Colli Euganei. *Lavori Soc. Ven. Sc. Nat.*, 24: 41-50.
- CASSOL M., 1987. L'avifauna del Piave nella Val Belluna. *Dolomiti*, 10(2): 33-39.
- CASSOL M., NADALET G., 1989. Interessanti avvistamenti in provincia di Belluno. *Riv. Ital. Orn.*, 59 (1-2): 112-113.
- FANTIN G., 1979. Veneto 1978: annata intensa e difficile. *Uccelli d'Italia*, 4: 99-119.
- FANTIN G., 1988. Notizie dal Veneto degli anni 1982 e 1983. *Uccelli d'Italia*, 13: 62-66.
- FAVERO L., 1955. Note di ornitologia. *Riv. Ital. Orn.*, 25 (4): 204-206.
- FOSCHI U.F., BULGARINI F., CIGNINI B., LIPPERI M., MELLETTI M., PIZZARI T., VISENTIN M., 1996. Catalogo della collezione ornitologica "Arrigoni degli Oddi" del Museo Civico di Zoologia di Roma. *Ric. Biol. Selvaggina*, 97: 176 pp.
- FULCO E., LIUZZI C., 2022. Italian Ornithological Commission (COI) - Report 30. *Avocetta*, 46: 123-133.
- FRACASSO G., FARRONATO I., 1998. Elenco sistematico dei Vertebrati segnalati in provincia di Vicenza. *Natura Vicentina*, 2: 47-100.
- FRACASSO G., JANNI O., FULCO E., LIUZZI C., 2018. Commissione Ornitológica Italiana. Report 27. *Avocetta* 42: 45-54.
- MASSA R., BOTTONI L., VIOLANI C., 1993. Lista in lingua italiana degli uccelli di tutto il mondo. *Università degli Studi di Milano*, 158 pp.
- MEZZAVILLA F., SALVINI F., PICCOLO F., SILVERI G., VISENTIN L., FOLTRAN D., MORATO S., 2024. Migrazione post riproduttiva dei rapaci sopra i Colli Asolani (Maser, TV) e fiume Piave (Spresiano, TV). Anno 2024. *Infomigrans*, 54: 16-19.
- NARDOTTO A., LUCHETTA A., PANZARIN L.F., PASTRES M., TAIARIOL P.L., 2024. Interessanti recenti evidenze riproduttive di balia dal collare (*Ficedula albicollis*) in due aree planiziali dell'Italia nord-orientale. *Riv. Ital. Orn.*, 94(2): 61-63.
- NINNI E., 1910. Saggio di un'avifauna bellunese (continuazione e fine). *Avicula*, 14: 142-147.
- SCARTON F., VALLE R., CAPPELLETTO M., NARDOTTO A., SATTIN L., SCARPA P., SGORLON G., 2025. Il mignattaio *Plegadis falcinellus* (Linnaeus, 1776) nidificante in provincia di Venezia: sintesi delle informazioni per il periodo 1999-2024. *Lavori Soc. Ven. Sc. Nat.*, 50: 23-30.
- SIGHELE M., BON M., VERZA E. (eds.), 2009. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2008. *Boll. Mus. St. Nat. Venezia*, 60: 143-168.
- SIGHELE M., BON M., VERZA E. (eds.), 2011. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2010. *Boll. Mus. St. Nat. Venezia*, 62: 181-218.
- SIGHELE M., BON M., VERZA E. (eds.), 2012. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2011. *Boll. Mus. St. Nat. Venezia*, 63: 135-171.
- SIGHELE M., BON M., VERZA E. (eds.), 2013. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2012. *Boll. Mus. St. Nat. Venezia*, 64: 81-114.
- SIGHELE M., BON M., VERZA E. (eds.), 2014. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2013. *Boll. Mus. St. Nat. Venezia*, 65: 181-213.
- SIGHELE M., BON M., VERZA E. (eds.), 2015. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2014. *Boll. Mus. St. Nat. Venezia*, 66: 79-110.
- SIGHELE M., BON M., VERZA E. (eds.), 2016. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2015. *Boll. Mus. St. Nat. Venezia*, 67: 77-112.
- SIGHELE M., BON M., VERZA E., STIVAL E., CASSOL M. (eds.), 2017. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2016. *Boll. Mus. St. Nat. Venezia*, 68: 71-94.
- SIGHELE M., BON M., VERZA E., STIVAL E., CASSOL M. (eds.), 2018. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2017. *Boll. Mus. St. Nat. Venezia*, 69: 101-127.
- SIGHELE M., VERZA E., STIVAL E., CASSOL M., BON M. (eds.), 2019. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2018. *Boll. Mus. St. Nat. Venezia*, 70: 37-62.
- SIGHELE M., VERZA E., STIVAL E., CASSOL M., BON M. (eds.), 2020. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2019. *Boll. Mus. St. Nat. Venezia*, 71: 89-111.
- SIGHELE M., STIVAL E., VERZA E., CASSOL M., BON M. (eds.), 2021. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2020. *Boll. Mus. St. Nat. Venezia*, 72: 33-58.
- SIGHELE M., STIVAL E., VERZA E., CASSOL M., BON M. (eds.), 2022. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2021. *Boll. Mus. St. Nat. Venezia*, 73: 45-68.
- SIGHELE M., STIVAL E., CORVINO R., FAGOTTO N., FANELLI V., FELTRIN G., MORETTO F., SGORLON G., VISENTIN L., SARTORIA A., VERZA E., BON M., 2023. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2022. *Boll. Mus. St. Nat. Venezia*, 74: 31-53.
- SIGHELE M., FAGOTTO N., CORVINO R., FANELLI V., FELTRIN G., MORETTO F., SGORLON G., BISOL T., SARTORI A., VERZA E., STIVAL E., 2024. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2023. *Bollettino del Museo di Storia Naturale di Venezia*, 75: 59-83.
- VERZA E., SIGHELE M., 2019. Check-list degli uccelli della provincia di Rovigo aggiornata al 31.12.2017. Atti VIII Convegno Faunisti Veneti, *Boll. Mus. St. Nat. Venezia*, 69 suppl.: 88-98.
- VERZA E., SARTORI, A., GRION M., RAVAGNANI A., STIVAL E., 2024. Censimento del fenicottero (*Phoenicopterus roseus*)

RINGRAZIAMENTI

Questo rapporto non sarebbe stato realizzato senza la collaborazione di tutti gli ornitologi e i birdwatcher che hanno condiviso le loro segnalazioni. Un ringraziamento particolare a Tomaso Bisol, Michele Cassol, Pietro Scarpa, Adriano Talamelli.

presso le zone umide della costa alto adriatica (Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna)- inverno 2024. *Astore-FVG, SVSN, Venezia Birdwatching, Sagittaria, ASOER: 7 pp. - birdingveneto.eu/feniday/Report_Cens_Feni-dic2024.pdf.*
 VIOLANI C., BARBAGLI F., 2006. Repertorio italiano dei nomi degli uccelli – parte prima: Struthioniformes-Psittaciformes. *Avocetta*, 30 (n. s.): 5-65.
 ZENATELLO M., TORMEN G., DE FAVERI A., 1998. Check-list degli Uccelli della provincia di Belluno. In: Gruppo Natura

Bellunese (ed.), Atti 2° Convegno Aspetti Naturalistici della provincia di Belluno, Belluno 23.11.2008, *Tipografia Piave*, Belluno: 327-339.

ZENATELLO M., DE FAVERI A., TORMEN G., ANTONIOLLI A., CIBIEN A., MARIN F., CASSOL M., DE COL S., 2008. Il censimento degli Uccelli acquatici svernanti in provincia di Belluno: 1997 - 2007. In: Gruppo Natura Bellunese (ed.), Atti 2° Convegno Aspetti Naturalistici della provincia di Belluno, Belluno 23.11.2008, *Tipografia Piave*, Belluno: 108-116.

SITOGRADIA

Birding Veneto: birdingveneto.eu
 Venezia BW: veneziabirdwatching.eu
 Verona BW: veronabirdwatching.org
 Ornitho: ornitho.it
 iNaturalist: inaturalist.org
 ebird: ebird.org
 EBN Italia: ebnitalia.it
 Observation: observation.org

INDIRIZZI DEGLI AUTORI

Maurizio Sighele - Associazione Verona Birdwatching – Birding Veneto
 Niccolò Fagotto - Associazione Venezia Birdwatching – Birding Veneto
 Roberto Corvino - Associazione Culturale Naturalistica Sagittaria – Birding Veneto
 Vittorio Fanelli - Associazione Verona Birdwatching – Birding Veneto
 Gloria Feltrin - Birding Veneto
 Fabio Moretto - Birding Veneto
 Giacomo Sgorlon - Birding Veneto
 Alessandro Sartori - Società Veneziana di Scienze Naturali
 Emiliano Verza - Associazione Culturale Naturalistica Sagittaria – Birding Veneto
 Emanuele Stival - Associazione Venezia Birdwatching – Birding Veneto