

Dott. GIORGIO COEN

DI UN *SEPION* ANOMALO
DI *SEPIA FILLIOUXI* LAFONT

Un *sepiion* trovato dal Sig. Angelo Maura sulla spiaggia del Lido di Venezia presenta una curiosissima deformità che sembra degna di nota e di comunicazione.

La faccia ventrale non presenta alcuna anomalia, mentre quella dorsale, precisamente a metà della sua lunghezza, si alza in una gobba evidentissima, elevantesi ripidamente dalla superficie circostante, larga un terzo della superficie stessa; la gobba sorge quasi verticalmente dalla parte posteriore, più obliquamente dalla parte anteriore; la sua lunghezza (lungo l'asse maggiore del *sepiion*), è circa eguale alla larghezza, ed in pianta ha forma di un triangolo a lati curvilinei e vertici arrotondati, con la base verso l'estremità posteriore; in corrispondenza a questa base, una depressione che la circonda appare molto più accentuata. La figura 1 rappresenta il *sepiion* dal lato posteriore, la fig. 2 in profilo.

La superficie dura e zigrinata della faccia posteriore del *sepiion* rimane perfettamente eguale anche sopra la gobba, e le sue rughe concentriche si seguono anche su questa.

Sezionato il *sepiion* trasversalmente, onde vedere se appariva qualche nucleo estraneo nell'interno dell'escrescenza, e ciò medianamente a questa, nulla è apparso, e nella fig. 3, che mostra la sezione suddetta, appaiono soltanto gli strati prismatici della struttura calcarea della massa ventrale del *sepiion*, tutti rigorosamente paralleli al contorno della sezione e concentrici rispetto ad un punto dove la sostanza appare perfettamente normale ed eguale al rimanente.

Le parti molli non avendo potuto essere esaminate, per essere il *sepiion*, pure freschissimo, trovato nudo sulla sabbia, nulla si può arguire circa l'origine della descritta deformità.

SPIEGAZIONE DELLE FIGURE

TAV. 7 — 5, il *sepiion* visto dall'alto; 6, visto di profilo; 7, sezione trasversale della gibbosità.

GIACOMO BISACCO - PALAZZI

CONTRIBUTO ALL'AVIFAUNA VENETA

Alcune specie di uccelli, catturate nella Laguna Veneta, nella sua zona di conterminazione e lungo il nostro litorale, offrono speciale interesse per la loro rarità.

Credo utile, perciò, elencare gli esemplari di esse, conservate a Chirignago (Venezia) nella mia collezione, per ciascuno dei quali sono in grado di precisare esattamente l'epoca e la località di cattura: ho infatti escluso dall'elenco gli uccelli per quali non ho certi questi dati.

L'ordine sistematico e la nomenclatura generica e specifica seguono l'opera di Paolo Savi (« Ornitologia Italiana »). Per ogni specie ho aggiunto, ove possibile, il nome italiano e quello volgare locale.

Pandion haliaetus G. Cuv. ex Linn. (Ital. *Falco pescatore* - Volg. *Aquilotto*)

♂ giov. 19 Marzo 1912 — Valle Perini.

Specie piuttosto rara, che compare qualche volta nelle valli dell'Estuario veneto durante gli inverni rigidi. Molto più rari gli individui adulti.

Aquila fulva Savig. ex Linn. (Ital. *Aquila reale* - Volg. *Aquila*)

♂ ad. 1 Aprile 1893 — Caorle

Specie rara, che compare nella laguna veneta durante l'inverno dopo qualche forte perturbazione atmosferica.

Buteo mutans Vieill. (Ital. *Poiana bianca* - Volg. *Pojana*)

♀ ad. 13 Dicembre 1907 — Bosco di Gaggio

Specie poco frequente che diventa sempre più rara dopo la distruzione dei boschi che sorgevano lungo la zona di conterminazione lagunare.

Pernis apivorus Cuv. (Ital. *Falco pecchiaiolo* - Volg. *Pojana*)

♂ ad. Settembre 1897 — Moranzani

♀ ad. Ottobre 1911 — Chirignago

Specie poco frequente, di passo autunnale. Il ♂ corrisponde alla varietà N.° 2 descritta dal Savi nell'opera sopra citata; la ♀ alla varietà N.° 1

Milvus regalis Briss. (Ital. *Nibbio reale* - Volg. *Forfeson.*)

♂ ad. 17 Aprile 1902 — Paludi di Tesserà

Specie molto rara di comparsa accidentale.

Falco sacer Briss. (Ital. *Sacro.*)

♀ ad. 19 Novembre 1927 — Valle Dogà

Specie assai rara di comparsa accidentale.

Falco lithofalco Gmel. (Ital. *Smeriglio* - Volg. *Falchetin*)

♂ ad. Novembre 1890 — Bosco di Chirignago

Specie piuttosto rara, che si faceva vedere qualche volta nei boschi ora distrutti.

Falco vespertinus Linn. (Ital. *Falco cuculo* - Volg. *Falcheto*)

♂ ad. Aprile 1919 — Chirignago

Specie rara di comparsa irregolare.

Circus cineraceus Naum. ex Montagu. (Ital. *Albanella piccola - na bianca de vale*)

♂ ad. 23 Febbraio 1934 — Valle Rivola aperta

I giovani di questa specie si fanno vedere abbastanza frequentemente nelle zone paludose della Laguna, mentre gli adulti sono meno frequenti. Nel gennaio 1918 ne osservai due esemplari alle Saline di San Felice nella laguna Nord, ed un esemplare nel marzo 1930 a Bevazzana nella bonifica del basso Tagliamento.

Circus cineraceus Naum. ex Montagu. (Ital. *Albanello piccolo - Volg. Pojana bianca de vale*)

♂ ad. 10 Aprile 1932 — Valle Dogà

Come la precedente specie, ma più rara.

Circus Swainsonii Smith. (Ital. *Albanella siciliana - Volg. Pojana bianca de vale*)

♂ ad. 10 Aprile 1891 — Valle Boccavecchia

Specie di comparsa accidentale.

Bubo maximus Fleming. (Ital. *Gufo reale* - Volg. *Gufo*)

♂ ad. 4 Novembre 1921 — Chirignago

Specie di comparsa accidentale e molto rara specialmente in pianura.

Otus vulgaris Flemm. (Ital. *Allocco* - Volg. *Civeton*)

♀ ad. 17 Novembre 1891 — Chirignago

♀ ad. 3 Marzo 1892 — Chirignago

Specie non frequente, che si è fatta più rara con la distruzione dei boschi.

Syrnium aluco Savig. (Ital. *Gufo selvatico* - Volg. *Alocon*)

♀ ad. 13 Novembre 1899 — Bosco di Chirignago

♀ ad. 22 Novembre 1928 — Spinea.

Come la precedente specie.

Lanius rufus Briss. (Ital. *Averla capirossa* - Volg. *Redestola rossa*)

♂ ad. 3 Maggio 1893 — Chirignago

ad. Maggio 1894 — Chirignago

Specie rara di passo primaverile.

Coracias garrula Linn. (Ital. *Ghiandaia marina* - Volg. *Gazza marina*)

♂ ad. 3 giugno 1892 — Chirignago

♀ ad. 28 Aprile 1896 — Moranzani

ad. Maggio 1895 — Bosco di Chirignago

Specie rara di passo primaverile irregolare, e che da più anni non si fa vedere.

Cypselus melba Illig. ex Linn. (Ital. *Rondone di mare* - Volg. *Rondon a panza bianca*)

♂ ad. Settembre 1895 — Chirignago

Specie montana che osservai una sola volta in pianura.

Nel settembre del 1895 ne comparve a Chirignago un branco di qualche decina di esemplari, che si trattennero per qualche ora intorno al campanile del paese: uno è il citato.

Merops apiaster Linn. (Ital. *Gruccione* - Volg. *Rondano, Tordò marin*)

♀ ad. 6 Maggio 1893 — Gambarare

♂ ad. 7 Maggio 1896 — Bosco di Chirignago

Specie di passo primaverile molto rara.

Turdus torquatus Linn. (Ital. *Tordo col petto bianco* - Volg. *Merlo de la fassa*)

♂ ad. Ottobre 1894 — Chirignago

Specie propria delle alte montagne: discende molto raramente al piano.

Ruticilla tithys Brehm. (Ital. *Codirosso spazzacamino* - Volg. *Coarossa foresta*)

♂ ad. Marzo 1891 — Mogliano

♀ ad. 1 Settembre 1892 — Zellarino

Specie che abitando i monti si fa vedere raramente in pianura. Sono rari specialmente gli esemplari adulti.

Ruticilla suecica De Selys. (Ital. *Pett'azzurro* - Volg. *Coarossa foresta*)

♂ ad. 14 Aprile 1891 — Chirignago

♀ ad. 11 Settembre 1891 — Gambarare, paludi degli Oneri

Specie di passo irregolare. Più rara durante il passo primaverile.

Panurus biarmicus Kock. ex Linn. (Ital. *Basettino* - Volg. *Mustachin*)

♂ ad. Novembre 1891 — Mestre, Bova Foscarina

♀ ad. 3 Gennaio 1892 — Paludi della Rana

Specie di passo molto irregolare, passando molti anni senza farsi vedere, mentre in alcuni anni ne comparvero numerosi esemplari sui canneti lungo i canali.

Aegythalus pendulinus Boie ex Linn. (Ital. *Fiaschettone* - Volg. *Pendolin*)

♂ ad. 13 Dicembre 1902 — Moranzani

Specie molto rara nella laguna di Venezia.

Anthus cervinus Keys. et Blas. ex Pallas. (Ital. *Prispola a gola rossa* - Volg. *Fista foresta*)

♂ ad. 25 Settembre 1891 — Mestre, Marghera

Specie molto rara.

Agrodroma campestris Swains. ex Briss. (Ital. *Calandro* - Volg. *Fiston foresto*)

♀ ad. 11 Settembre 1892 — Chirignago

♂ ad. Ottobre 1894 — Chirignago

Specie rara anche nel passo autunnale.

Corydalla Richardi Vig. ex Vieill. (Ital. *Calandro forestiero* - Volg. *Tordina Grossa*)

♀ ad. 19 Settembre 1892 — Chirignago

Come la precedente specie ma molto più rara.

Melanocorypha calandra Boie. ex Linn. (Ital. *Calandra* - Volg. *Calandron*)

♀ ad. 11 Settembre 1913 — Malcontenta

Non frequente: se ne vede qualche individuo durante il passo autunnale della comune allodola.

Calandrella brachydactyla Kaup. (Ital. *Calandrino* - Volg. *Lodolin*)

♀ ad. 10 Settembre 1894 — Chirignago

♂ ad. 12 Settembre 1894 — Chirignago

Specie molto rara di passo autunnale.

Plectrophane nivalis Mey. (Ital. *Zigoto della neve* - Volg. *Ortolan de la neve*)

♂ giov. 18 Gennaio 1893 — Valle Rivola aperta

♀ giov. Gennaio 1894 — Valle Rivola aperta

giov. Novembre 1896 — Paludi presso Mestre

Specie rara che si fa vedere irregolarmente negli inverni freddi trattenendosi nelle isole della Laguna e nei paludi.

Emberiza cia Linn. (Ital. *Zigolo muciatto* - Volg. *Cip*)

♂ ad. 18 Luglio 1891 — Chirignago

Specie non frequente che predilige i canneti lungo i canali.

Pyrrhula vulgaris Temm. (Ital. *Ciuffolotto* - Volg. *Finco subbioto*)

♂ ad. 9 Novembre 1913 — Bosco di Chirignago

♀ ad. 5 Novembre 1913 — Bosco di Chirignago

Specie che compare in pianura accidentalmente durante la stagione invernale trattenendosi nei boschi.

Loxia curvirostra Linn. (Ital. *Crociere* - Volg. *Beco in crose*)

♀ giov. 6 Settembre 1893 — Chirignago

Specie rara che si fa vedere accidentalmente in pianura.

Oedicnemus crepitans Temm. (Ital. *Occhione* - Volg. *Pivaron*)

♀ ad. 6 Novembre 1891 — S. Giorgio in Alega

Specie rara che si fa vedere qualche volta durante il passo autunnale delle allodole comuni.

Haematopus ostralegus Linn. (Ital. *Beccaccia di mare* - Volg. *Caenasso*)

♂ ad. 5 Aprile 1893 — Valle Rivola aperta

Specie rara che va scomparendo dalla Laguna veneta.
In primavera nel 1917 ne osservai per più giorni un coppia sui paludi fiancheggianti il canale dei Treporti.

Himantopus candidus Bonnat. (Ital. *Cavalier d'Italia* - Volg. *Sgambirlo*)

♀ ad. 1 Aprile 1893 — Caorle

Specie di comparsa accidentale, molto rara.

Recurvirostra avocetta Linn. (Ital. *Monachina* - Volg. *Scarpoler*)

♂ semi ad. 22 Novembre 1929 — Motte di Volpego

Come la specie precedente, di comparsa accidentale.

Egretta alba Bp. (Ital. *Airone maggiore* - Volg. *Sgarzo bianco*)

♂ ad. 16 Maggio 1919 — Docaletto

♂ ad. 27 Dicembre 1924 — Lio maggiore

Rara specie nell'Estuario veneto: però alcuni anni si mostra in branchi numerosi in valle Dogà (laguna Nord).

Egretta garzetta Bp. (Ital. *Airone minore* - Volg. *Sgarzeta*)

ad. 18 Aprile 1932 — Punta lunga Tessera

Specie rara che compare accidentalmente.

Buphus ralloides Bp. (Ital. *Sgarza ciuffetto* - Volg. *Guà bianco*)

♂ ♀ ad. 4 Maggio 1890 — Valle Rivola aperta

Specie di passo primaverile poco frequente

Ciconia alba Briss. (Ital. *Cicogna bianca* - Volg. *Sigogna*)

♂ ad. 5 Agosto 1893 — Valle Rivola aperta

Specie molto rara. I

Ciconia nigra Bellonio. (Ital. *Cicogna nera* - Volg. *Sigogna nera*)

♂ giov. 7 Settembre 1910 Paludi della Rana

Come la precedente specie.

Platalea leucorodia Linn. (Ital. *Spatola* - Volg. *Spatola*)

♀ ad. 10 Dicembre 1895 — Paludi della Rana

Specie rarissima.

Ibis falcinellus Vieill. (Ital. *Mignattaio* - Volg. *Arcasa verde*)

♂ ♀ ad. 23 Aprile 1894 — Valle del Cornio.

Specie rara di comparsa primaverile, facendosi vedere in piccoli branchi.

Cygnus ferus Rey. (Ital. *Cigno svatico* - Volg. *Cigno salvadego*)

♂ ad. 3 Novembre 1892 — Brondolo

Rara specie di passo invernale molto irregolare.

Anser albifrons Bechst. (Ital. *Oca lombardella* - Volg. *oca salvadega a pausa negra*)

♂ ad. Gennaio 1913 — Concordia (Portogruaro)

Specie rara che si fa vedere irregolarmente negli inverni molto rigidi, preferendo posarsi sui campi coltivati.

Tadorna Belonii Ray. (Ital. *Volpaca* - Volg. *Cherso*)

♂ yad. 22 Gennaio 1893 — presso Chioggia

♂ semi ad. 28 Gennaio 1930 — Valle dei sette morti

♀ ad. 4 Gennaio 1932 — Laguna di Venezia, Resta d'aglio

♀ semi ad. 17 Dicembre 1907 — Burano

Specie poco frequente, di passo irregolare. Nell'inverno del 1919 ne osservai un esemplare in canale Cunetta e due in canale Melison.

Branta rufina Boie. ex Pall. (Ital. *Fischione turco* - Volg. *Ciosso turco*)

♂ ad. 11 Gennaio 1894 — Sottomarina

♂ ad. 18 Dicembre 1910 — Paludi della Rana

♂ giov. 20 Dicembre 1916 — Docaletto

Specie di passo invernale, rara, di comparsa accidentale. Più rare le femmine.

Fuligula marilla Steph. ex Linn. (Ital. *Moretta grigia* - Volg. *Magasso*)

♂ ♀ semi ad. 8 Dicembre 1895 — Paludi della Rana

Specie non abbondante, di cui qualche esemplare compare negli inverni rigidi.

Fuligula nyroca Steph. ex Guldenst. (Ital. *Moretta tabaccata* - Volg. *Magassetto rosso*)

♂ semi ad. 1891 — Valle Rivola aperta

♂ ad. 8 Marzo 1894 — Paludi della Rana

♂ giov. 29 Novembre 1914 — Valle Dogà

Specie piuttosto rara, di passo irregolare. Oltre agli esemplari elencati nell'inverno del 1919 ne osservai un piccolo branco in laguna presso la valle Rivola aperta.

Harelda glacialis Steph. ex Linn. (Ital. *Moretta pezzata* - Volg. *Magosseto foresto*)

♀ giov. 27 Dicembre 1891 — Valle Rivola aperta
Specie molto rara. Rarissimi gli adulti.

Erismatura leucocephala Bp. ex Scop. (Ital. *Gobbo rugginoso*)
♂ ♀ giov. 25 Novembre 1894 — Esemplari comperati sul mercato di Padova, provenienti da Piove di Sacco.

Specie molto rara che compare negli inverni rigidi. Un esemplare fu ucciso nell'inverno del 1920 in canale di Piove.

Somateria mollissima Boie ex Linn. (Ital. *Anatra dal piumino*)

♀ giov. 23 Ottobre 1920 — Tre porti
♀ giov. 5 Ottobre 1925 — Docaletto
♂ semi ad. 9 Ottobre 1930 — Forte Fisol
Specie rarissima e di comparsa accidentale.

Oidemia nigra Flem. ex Linn. (Ital. *Macrosa* - Volg. *Orcheto marin*)

♀ giov. Ottobre 1899 — Valle Rivola aperta
♀ ad. fine Aprile 1932 — Cavazuccherina.
Come la precedente, specie rarissima e di comparsa accidentale.

Oidemia fusca Flem. ex Linn. (Ital. *Germano di mare* - Volg. *Orco marin*)

♂ ♀ giov. 7 Novembre 1894 — Bocca di Piave in mare
♀ ad. 19 Novembre 1928 — Paludi presso Fusina
♂ semi ad. 23 Ottobre 1932 — Valle Dogà
Specie non comune di comparsa invernale. Una volta ne incontrai un branco di una diecina di individui nelle vicinanze delle Motte di Volpego.

Mergus merganser Linn. (Ital. *Smergo maggiore* - Volg. *Serolon del Po*)

♂ ♀ ad. 11 Novembre 1933 — Tosson di sotto
Specie di comparsa accidentale in laguna, molto rara.

Phalacrocorax carbo Leach. (Ital. *Marangone* - Volg. *Marangon - Corvo marin*)

♀ giov. 23 Novembre 1908 — Fondoni di San Pietro in Volta.
♀ giov. 8 Aprile 1929 — Sant'Angelo della Polvere.
♂ semi ad. 15 Aprile — Valle Dogà.

Specie rara, di comparsa irregolare in laguna. Nell'inverno del 1920 osservai un individuo che si trattenne alcune settimane sui canali della Valle Rivola.

Puffinus cinereus Cuv. (Ital. *Berta maggiore*)

♀ ad. 4 Settembre 1900 — Treporti
Specie molto rara nell'Estuario veneto, preferendo il mare.

Stercorarius parasiticus G. R. Gray. ex Linn. (Ital. *Labbo* - Volg. *Coccal negro*)

semi ad. 18 Aprile 1927 Fusina
Specie molto rara.

Larus argentatus Brunnich. (Ital. *Gabbiano candido*)

♂ ad. 15 Gennaio 1923 — Valle del Cornio.
Rarissima cattura accidentale. Il Dr. E. Arrigoni Degli Oddi nella sua opera « Atlante Ornitologico » dà notizia di due esemplari catturati in Italia di questa rarissima specie, e dice: « In Italia conosco un soggetto ucciso nell'estuario « veneto (Coll. Arrigoni Degli Oddi) » e nella nota aggiunte: « Se la memoria non m'inganna, anche nella Collezione Italiana del R. Museo di Firenze si onsererebbe un « *L. argentatus*, femmina ad.; questo individuo sarebbe stato « catturato il 14 settembre 1882 a Pallanza (Lago Maggiore) e sarebbe un dono del sig. Butterfield ».

Larus melanocephalus Natterer. (Ital. *Gabbiano corallino* - Volg. *Cocal a testa negra*)

♂ ad. 13 Ottobre 1894 — Valle Rivola aperta
Specie non molto frequente, non comparando regolarmente nella Laguna veneta. Alcuni anni però, durante il paso primaverile, questa specie si mostrò in branchi numerosi con molti individui in abito primaverile.

Larus minutus Pall. (Ital. *Gabbianello* - Volg. *Cocal piccolo*)

♀ giov. 16 Agosto 1893 — Paludi della Rana
♂ giov. 2 Settembre 1893 — Paludi della Rana
♀ semi ad. 16 Dicembre 1916 — Paludi del Docaletto
Specie di passo irregolare, piuttosto rara, specialmente gli adulti.

Sterna cantiaca Gmel. (Ital. *Beccapesci* - Volg. *Giagà foresto*)

♂ ad. 31 Agosto 1892 — Porto del Lido

♂ semi ad. 4 Novembre 1929 — Sant'Angelo della Polvere.

Specie che una volta si faceva vedere con una certa frequenza, ma che ora si è fatta assai rara.

Podiceps rubicollis Lath. (Ital. *Svasso collo-rosso* - Volg. *Smergheta*)

♀ ad. 1 Aprile 1892 — Valle Rivola aperta

Specie una volta abbastanza frequente ora diventata molto più rara e di passo irregolare.

Colymbus arcticus Linn. (Ital. *Strolaga mezzana* - Volg. *Smergo*)

♀ ad. 10 Novembre 1891 Spignon — Porto di Malamocco

♀ giov. 9 Novembre 1912 — Valle Rivola aperta

semi ad. 8 Dicembre 1915 — Spiaggia del Lido

Specie abbastanza frequente negli inverni rigidi. Rari gli esemplari adulti.