

MAURO BON - PAOLO ROCCAFORTE

SEGNALAZIONE DI COMPORTAMENTO AGGRESSIVO  
DI LEPRE EUROPEA (*LEPUS EUROPAEUS*)  
NEI CONFRONTI DI FALCO DI PALUDE (*CIRCUS AERUGINOUS*)  
E CORNACCHIA GRIGIA (*CORVUS CORONE CORNIX*)

MAURO BON (\*) - PAOLO ROCCAFORTE (\*\*)

SEGNALAZIONE DI COMPORTAMENTO AGGRESSIVO  
DI LEPRE EUROPEA (*LEPUS EUROPAEUS*)  
NEI CONFRONTI DI FALCO DI PALUDE (*CIRCUS AERUGINOSUS*)  
E CORNACCHIA GRIGIA (*CORVUS CORONE CORNIX*)

*Aggressive behaviour of Hare (Lepus europaeus) towards Marsh Harrier (Circus aeruginosus) and Hooded Crow (Corvus corone cornix).*

**Key words:** *Lepus europaeus, Circus aeruginosus, Corvus corone cornix, aggressive behaviour.*

Ci sembra interessante riportare l'osservazione di alcuni casi di comportamento aggressivo di Lepre europea nei confronti di Falco di palude e Cornacchia grigia.

Gli episodi che si riferiscono alle interazioni tra Lepre e Falco di palude sono stati rilevati in provincia di Venezia, rispettivamente in Val Paliaga (22.XI.1990) e a Portegrandi (18.II.1992). In tutti e due i casi il rapace stava effettuando un volo esplorativo lungo un argine, a circa un metro di altezza. Il comportamento del Falco di palude era svincolato dalla possibilità di predare la Lepre, che peraltro rientra occasionalmente nella sua dieta e solo con individui molto giovani (CRAMP, 1980; GLUTZ et al., 1971). In entrambi i casi la Lepre aspettava accovacciata che il rapace la sorvolasse per poi inseguirlo per alcuni metri. Il comportamento si ripeteva più volte fino a che il rapace non si allontanava. Un altro episodio, del tutto simile ai precedenti, ci è stato riferito da A. Nardo per la località Contrada Fossetta (10.VI.1991) in comune di Musile di Piave.

Un analogo comportamento aggressivo, nei confronti di due individui di Cornacchia grigia, ci è stato segnalato in località Le Crete (Quarto d'Altino - Venezia, 14.X.1994) (Bon C. com. pers.). In questo caso la Lepre ha attaccato insistentemente i due corvidi che si erano posati a terra, inseguendoli per brevi tratti. Anche in questo caso non si sono rilevate apparenti motivazioni per giustificare un simile comportamento.

Le date di osservazione non coincidono, almeno in due casi, con il periodo riproduttivo della Lepre (MERIGGI, 1986; SPAGNESI e TROCCHI, 1992) quindi escludiamo che i comportamenti aggressivi fossero in relazione diretta con la difesa della prole.

**Ringraziamenti**

Ringraziamo Claudio Bon e Angelo Nardo per averci comunicato le loro osservazioni.

(\*) Museo civico di Storia Naturale, S. Croce 1730, 30135 Venezia.

(\*\*) C.Or.V.O., Museo di Storia Naturale, 31044 Montebelluna (TV); OIKOS, Ricerca ed Educazione Ambientale, s.c.r.l., c/o via Monte Rua 2 - 30174 Mestre (VE).

## Bibliografia

- CRAMP S. (ed.) (1980) - Handbook of the Birds of Europe the Middle East and North Africa, vol. 2, Hawks to Bustards. *Oxford University Press*.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM U.N., BAUER K.M., BEZZEL E. (1971) - Handbuch der Vögel Mitteleuropas, Band 4, Falconiformes. *Akademische Verlagsgesellschaft, Frankfurt*.
- MERIGGI A. (1986) - La Lepre. *Oasis*, 3 (1986): 32-49.
- SPAGNESI M. e TROCCHI V. (1992) - La Lepre. *Biologia - Allevamento - Patologia - Gestione. Edagricole, Bologna*.

Ci sembra interessante riportare l'osservazione di alcuni casi di comportamento aggressivo di *Corvus cornix* nei confronti di Falco di palude e Comacchia grigia.

Gli episodi che si riferiscono alle interazioni tra Lepre e Falco di palude sono stati rilevati in provincia di Venezia, rispettivamente in Val Pavia (22.XI.1990) e a Portogruaro (18.II.1992). In tutti e due i casi il rapace stava effettuando un volo esplosivo lungo un argine, a circa un metro di altezza. Il comportamento del Falco di palude era svincolato dalla presenza della Lepre, che pertanto veniva occasionalmente nella sua difesa e solo con individui molto giovani (KANEK, 1980; GLUTZ et al., 1971). In entrambi i casi la Lepre aspettava accovacciata che il rapace la sorvolasse per poi inseguirlo per alcuni metri. Il comportamento si ripeteva più volte fino a che il rapace non si allontanava. Un altro episodio, del tutto simile al precedente, si è stato riferito da A. Nardo per la località Contada Foresta (10.VI.1991) in comune di Muelle di Pavia.

Un analogo comportamento aggressivo, nei confronti di due individui di Comacchia grigia, ci è stato segnalato in località Le Crete (Quano d'Adda - Venezia, 14.X.1990) (Bon C. com. pers.). In questo caso la Lepre ha attaccato resistenzialmente i due corvidi che si erano posati a terra, inseguendoli per brevi tratti. Anche in questo caso non si sono rilevate apparenti motivazioni per giustificare un simile comportamento.

Le date di osservazione non coincidono, almeno in due casi, con il periodo riproduttivo della Lepre (MARTINI, 1980; SPAGNESI e TROCCHI, 1992) quindi escludiamo che i comportamenti aggressivi fossero in relazione diretta con la difesa della prole.

Ringraziamo

il signorino Claudio Bon e Angelo Corno per averci comunicato le informazioni.

(\*) Museo civico di Storia Naturale, S. Croce 1503, 30132 Venezia.  
(\*\*) C.O.V.U. Museo di Storia Naturale, 31044 Montebelluna (TV), 04307, Riserva di  
Biosfera Ambientale, s.c.r.l., c/o via Statale Riva 1 - 30174 Montebelluna (TV).