

STERCORARIO MAGGIORE, *Stercorarius skua*, 1 individuo avvistato alla foce del fiume Livenza (Venezia) il 28.9.1980 (F. Mezzavilla). Questa specie è di comparsa accidentale nel Mediterraneo centrosettentrionale.

STERCORARIO MEZZANO, *Stercorarius pomarinus*, 2 individui adulti in fase chiara osservati nel porto di Livorno il 27.4.1981 (P. Bricchetti, P. Fasce).

LABBO, *Stercorarius parasiticus*, 1 individuo in fase chiara avvistato il 4.3.1981 a Capo Murro di Porco (Siracusa) (C. Iapichino), 2 individui il 27.4.1981 sul delta del Po in località Goro (M. Ravasini, F. Zanichelli) e 1 individuo l'1.5.1981 nella stessa località (F. Zanichelli). Queste due ultime specie sono di comparsa rara sebbene abbastanza regolare lungo le nostre coste.

GABBIANO TRIDATTILO, *Rissa tridactyla*, 1 individuo immaturo a Capo Murro di Porco (Siracusa) il 5.12.1980. Sempre un immaturo era già stato osservato nella stessa località il 2.11.1979 (C. Iapichino). La presenza invernale di questo gabbiano lungo le coste della Sicilia orientale è probabilmente meno irregolare di quanto faccia supporre la scarsità degli avvistamenti.

UPUPA, *Upupa epops*, 1 individuo osservato a Vendicari (Siracusa) l'8 e l'11.1.1981 (S. Baglieri, C. Iapichino). Si tratta di nuovi dati invernali per la Sicilia (vedi anche Massa, B., 1978, Avocetta, no. 1).

CUTRETTOLA CAPINERA, *Motacilla flava feldeggii*, 1 individuo osservato il 22.3.1981 alla foce del fiume Tellaro (Siracusa) (C. Iapichino). Per la problematica posta dalla presenza di questa cutrettola in Sicilia si veda Massa, B., 1976, Riv. Ital. Orn. p. 9.

SORDONE, *Prunella collaris*, 1 individuo osservato nei pressi di Avola (Siracusa) l'1.2.1981 (C. Iapichino). Questa specie è regolare d'inverno nei monti della Sicilia settentrionale, irregolare invece in quella meridionale. Sembra ormai accertato che parte delle popolazioni, un tempo considerate esclusivamente residenti, compia migrazioni regolari, a volte anche in grandi stormi.

CULBIANCO ISABELLINO, *Oenanthe isabellina*, 1 individuo visto a Capo Murro di Porco il 27.3. e l'1.4.1981 sempre in compagnia di Culbianchi comuni (C. Iapichino). In questa stessa località è stato osservato, per la prima volta in Italia (Baglieri S. 1974, Riv. Ital. Orn., p. 206); negli anni seguenti è stato sempre segnalato durante il passo primaverile.