

ANGELO NARDO - PAOLO ROCCAFORTE - MICHELE ZANETTI (*)

PRESENZA ESTIVA DI MIGNATTAIO, *PLEGADIS FALCINELLUS*
LINNAEUS, 1766, IN PROVINCIA DI VENEZIA (AVES)

Presence of Glossy ibis, Plegadis falcinellus Linnaeus, 1766, during the breeding season in the province of Venice (Aves).

Key words: *Plegadis falcinellus*, Veneto, Province of Venice, North Lagoon.

Riteniamo interessante riportare alcune osservazioni di Mignattaio, *Plegadis falcinellus*, effettuate durante il periodo riproduttivo ed estivo del 1992 nella Laguna Nord di Venezia.

Il 15 maggio abbiamo osservato tre individui nello stagno che si trova all'interno dell'Azienda Faunistico-Venatoria Val Paliaga, in località Ca' Noghera. I tre individui sono stati osservati per circa trenta minuti, mentre scandagliavano con il becco il fondo fangoso in attività trofica. Ad un certo punto, i tre uccelli si sono involati sorvolando la zona per qualche minuto, dirigendosi quindi verso la vicina Laguna.

Relativamente localizzate sono le osservazioni successive.

Il 19 e il 20 giugno sono stati osservati due individui in pastura lungo la sponda di un fossato a Caposile. Disturbati, si sono alzati in volo e dopo alcuni volteggi si sono diretti verso la vicina Valle Dogà (Steffanel, com. pers.).

Piuttosto interessante appare l'osservazione di un individuo, sempre il 20 giugno, involatosi da una garzaia di Valle Dragojesolo (costituita da un tamariceto ed occupata da *Nycticorax nycticorax*, *Ardeola ralloides* ed *Egretta garzetta*). Dopo l'involò l'individuo si è posato su un campo, nei pressi di un fosso.

Il 21 giugno sono stati osservati tre individui in volo presso la località Codetta, tra Valle Grassabò e Valle Dragojesolo (Zago, com. pers.).

Altre segnalazioni fornite dal fattore di una tenuta in Valle Grassabò, riguardano tre individui durante il mese di luglio in località Torre di Caligo.

Non è da escludere che le segnalazioni riguardino sempre gli stessi individui.

Le osservazioni non hanno offerto indizi significativi di nidificazione; l'estivazione della specie costituisce comunque un fenomeno inconsueto per il Veneto.

(*) C.Or.V.O. Museo di Storia Naturale, via Piave 51.I - 31044 Montebelluna (TV).

In Italia, la specie è considerata estiva e nidificante irregolare in Sardegna, Puglia, Emilia Romagna e Piemonte, mentre in altre zone (Pavese e Bolognese), esistono solo osservazioni estive occasionali (BRICHETTI, 1992). Nel Veneto, il Mignattaio compare irregolarmente durante le migrazioni (AA.VV., 1985; BRICHETTI, 1992); in passato pare, ma non è stato accertato, che la specie abbia nidificato sporadicamente (ARRIGONI DEGLI ODDI, 1929). In provincia di Venezia, conosciamo solo poche segnalazioni riferite alla migrazione primaverile (SCARTON, 1989; STIVAL, 1992).

Bibliografia

- AA.VV. (1985) - Carta delle vocazioni faunistiche del Veneto. *Giunta regionale del Veneto*.
- ARRIGONI DEGLI ODDI E. (1929) - Ornitologia italiana. *Ulrico Hoepli*, Milano.
- BRICHETTI P. (1992) - Il Mignattaio *Plegadis falcinellus*. In: Brichetti P. et al. (eds) - Fauna d'Italia. XXIX. Aves. I. *Edizioni Calderini*, Bologna: 226-233.
- SCARTON F. (1989) - L'avifauna in un ambiente industriale: un esempio nella laguna di Venezia. *Riv. ital. Orn.*, **59**: 316-318, Milano.
- STIVAL E. (1992) - L'avifauna delle cave di argilla senili del comune di Marcon (Venezia). *Boll. Mus. civ. St. nat. Venezia*, **41** (1990): 235-264.