

Cleptoparassitismo di Gabbiano comune, *Larus ridibundus*, nei confronti di Storno, *Sturnus vulgaris*

EMANUELE STIVAL

*Centro Orn. Veneto Or., Museo di Storia Naturale, Via Piave 51. I, 31044 Montebelluna
TV*

Essendo attualmente pochi i casi noti di cleptoparassitismo di Gabbiano comune nei confronti di Storno (cfr. Brockmann & Barnard 1979) ritengo utile comunicare questa osservazione: il giorno 3 gennaio 1995, in località Ca'Fornoni (Favaro - Venezia), uno Storno sostava sul tetto di una abitazione con del cibo trattenuto nel becco. Un individuo di Gabbiano comune che transitava vicino in volo ha attaccato lo Storno facendolo involare e continuando per almeno un centinaio di metri ad inseguirlo senza però apparentemente riuscire a deprederlo.

Bibliografia

BROCKMANN H. J. e BARNARD C. J., 1979 - Kleptoparasitism in birds. *Anim. Behav.* 27: 487-514.

Osservazione di Rondine montana, *Ptyonoprogne rupestris*, in provincia di Venezia

EMANUELE STIVAL

*Centro Orn. Veneto Or., Museo di Storia Naturale, Via Piave 51. I, 31044 Montebelluna
TV*

Il 16/10/95 alle ore 10.10 in una giornata soleggiata e senza vento, mentre mi trovavo in un ufficio su un palazzo a Mestre (VE) ho osservato un ind. di Rondine montana volare dirigendosi ripetutamente, quasi "picchiando", verso le vetrate di un palazzo antistante a quello dove mi trovavo. Ritengo che il comportamento piuttosto "aggressivo" della specie fosse rivolto alla propria immagine riflessa, intesa come un "potenziale" intruso o nemico.