

## **Cleptoparassitismo di Gabbiano comune, *Larus ridibundus*, nei confronti di Storno, *Sturnus vulgaris***

EMANUELE STIVAL

*Centro Orn. Veneto Or., Museo di Storia Naturale, Via Piave 51. I, 31044 Montebelluna  
TV*

Essendo attualmente pochi i casi noti di cleptoparassitismo di Gabbiano comune nei confronti di Storno (cfr. Brockmann & Barnard 1979) ritengo utile comunicare questa osservazione: il giorno 3 gennaio 1995, in località Ca'Fornoni (Favaro - Venezia), uno Storno sostava sul tetto di una abitazione con del cibo trattenuto nel becco. Un individuo di Gabbiano comune che transitava vicino in volo ha attaccato lo Storno facendolo involare e continuando per almeno un centinaio di metri ad inseguirlo senza però apparentemente riuscire a deprederlo.

### **Bibliografia**

BROCKMANN H. J. e BARNARD C. J., 1979 - Kleptoparasitism in birds. *Anim. Behav.* 27: 487-514.

## **Osservazione di Rondine montana, *Ptyonoprogne rupestris*, in provincia di Venezia**

EMANUELE STIVAL

*Centro Orn. Veneto Or., Museo di Storia Naturale, Via Piave 51. I, 31044 Montebelluna  
TV*

Il 16/10/95 alle ore 10.10 in una giornata soleggiata e senza vento, mentre mi trovavo in un ufficio su un palazzo a Mestre (VE) ho osservato un ind. di Rondine montana volare dirigendosi ripetutamente, quasi "picchiando", verso le vetrate di un palazzo antistante a quello dove mi trovavo. Ritengo che il comportamento piuttosto "aggressivo" della specie fosse rivolto alla propria immagine riflessa, intesa come un "potenziale" intruso o nemico.

Questo comportamento mi ha permesso di osservare per qualche istante la Rondine montana, e quindi riuscire ad identificarla.

La segnalazione riportata è, per quanto mi risulta, una delle pochissime note per la specie (se non l'unica) per la provincia di Venezia.

*Boll. Cen. Orn. Veneto Or. 6: 35 (1995)*

## **Rondine, *Hirundo rustica*, che si alimenta di un insetto adulto dell'ordine degli Odonati (Odonata, Anisoptera)**

EMANUELE STIVAL

*Centro Orn. Veneto Or., Museo di Storia Naturale, Via Piave 51. I, 31044 Montebelluna  
TV*

Il giorno 20/08/95 in una zona di campagna alberata a Gaggio di Marcon (VE) ho osservato un adulto di Rondine portare l'imbeccata a dei giovani da poco involati e posati su dei cavi aerei del telefono. Un giovane che aveva afferrato la preda, piuttosto voluminosa, dopo vari tentativi di ingerirla la perdeva e cadeva a terra. Ho potuto così avvicinarmi a controllare l'insolita imbeccata che si è rivelata essere un adulto di Odonato, sottordine Anisoptera.

L'insetto della lunghezza totale di circa 50 mm, e con addome rossastro sembrava all'esame un individuo della specie *Crocothemis erythraea* (cfr. PECILE 1984).

In Europa la Rondine è stata osservata alimentarsi di insetti appartenenti all'ordine degli Odonati, sottordine Zygoptera ("damsel flies") (CRAMP 1988); sembra quindi non siano noti in precedenza casi di predazione di insetti adulti del sottordine Anisoptera.

### **Bibliografia**

CRAMP S. (ed.) 1988 - The Birds of the Western Palearctic. Vol. V. *Oxford University Press, Oxford.*

PECILE I. 1984 - Libellule. *Ed. Lorenzini, Udine.*